

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА  
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ


Г. К. Муравин, О. В. Муравина

# АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА



УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ

10  
к л а с с



МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА  
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ

Г. К. Муравин, О. В. Муравина

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ

10  
к л а с с

# АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Учебник

Рекомендовано  
Министерством  
образования и науки  
Российской Федерации



МОСКВА



2013



**УДК 373.167.1:512**

**ББК 22.14я72**

**М91**

**Учебник получил положительное заключение  
Российской академии наук (№ 10106-5215/265 от 12.10.2012 г.)  
и Российской академии образования (№ 01-5/7д-431 от 11.10.2012 г.)**

**Муравин, Г. К.**

**М91 Математика : алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень. 10 класс. : учебник / Г. К. Муравин, О. В. Муравина. — М. : Дрофа, 2013. — 318, [2] с. : ил.**

**ISBN 978-5-358-10962-9**

Учебник входит в учебно-методический комплекс по математике для 10–11 классов, изучающих предмет на углубленном уровне. Теоретический материал в нем разделен на обязательный и дополнительный. Каждая глава завершается домашней контрольной работой, а каждый пункт главы — контрольными вопросами и заданиями. В учебнике есть ссылки на интернет-ресурсы, раздел «Ответы, Советы и Решения», в котором приведены решения наиболее трудных задач.

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования, имеет триф «Рекомендовано» и включен в Федеральный перечень учебников.

**УДК 373.167.1:512**

**ББК 22.14я72**

**ISBN 978-5-358-10962-9**

**© ООО «Дрофа», 2013**

# Оглавление

## Г л а в а 1. Функции и графики

1. Понятие функции . . . . .	7
2. Прямая, гипербола, парабола и окружность . . . . .	15
3. Непрерывность и монотонность функций . . . . .	24
4. Квадратичная и дробно-линейная функции. Преобразование графиков . . . . .	35

## Г л а в а 2. Степени и корни

5. Степенная функция $y = x^n$ при натуральном $n$ . . . . .	46
6. Понятие корня $n$ -й степени . . . . .	51
7. Свойства арифметических корней . . . . .	61
8. Степень с рациональным показателем . . . . .	67

## Г л а в а 3. Показательная и логарифмическая функции

9. Функция $y = a^x$ . . . . .	76
10. Понятие логарифма . . . . .	86
11. Свойства логарифмов . . . . .	95

## Г л а в а 4. Тригонометрические функции и их свойства

12. Угол поворота . . . . .	106
13. Радианная мера угла . . . . .	110
14. Синус и косинус любого угла . . . . .	115

---

15. Тангенс и котангенс любого угла .....	122
16. Простейшие тригонометрические уравнения ..	128
17. Формулы приведения .....	136
18. Свойства и график функции $y = \sin x$ .....	144
19. Свойства и график функции $y = \cos x$ .....	151
20. Свойства и графики функций $y = \operatorname{tg} x$ и $y = \operatorname{ctg} x$ .....	157
21. Зависимости между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента .....	165
22. Синус и косинус суммы и разности двух углов	171
23. Тангенс суммы и тангенс разности двух углов	177
24. Тригонометрические функции двойного угла	182
25. Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. Обратное преобразование .....	188
26. Решение тригонометрических уравнений .....	194

### **Г л а в а 5. Элементы теории вероятностей и комбинаторики**

27. Понятие о вероятности .....	203
28. Вычисление числа вариантов .....	208

### **Г л а в а 6. Повторение**

29. Функции и графики .....	217
30. Уравнения и неравенства .....	232

### **Домашние контрольные работы .....**

Ответы .....	248
--------------	-----

Советы .....	270
--------------	-----

Решения .....	280
---------------	-----

### **Основные формулы .....**

### **Предметный указатель .....**

### **Список дополнительной литературы и интернет-ресурсов .....**

## **Уважаемые старшеклассники!**

Этот учебник продолжает курс алгебры 7—9 классов. В течение следующих двух лет вы расширите и углубите свои математические знания. И, главное, научитесь их применять.

Знать математику — значит уметь решать задачи. Именно задачи вам предстоит решать на ЕГЭ.

В учебнике задания разной степени сложности. В заданиях, номера которых не имеют специальных обозначений, вы не должны испытывать никаких затруднений.

Значком «○» отмечены задания, в которых путь к ответу связан с некоторыми техническими сложностями.

Задания, над которыми следует подумать, имеют обозначение «●». План решения таких заданий полезно обсудить в классе с учителем.

Номера самых трудных заданий имеют обозначение «\*».

Значком «■» отмечены задания, которые следует выполнять с помощью калькулятора. В учебнике рассматривается калькулятор операционной системы Windows.

При изучении математики вам предстоит строить много графиков. В некоторых случаях работу в тетради полезно совмещать, а иногда и заменять работой на компьютере в одной из компьютерных программ построения и исследования графиков функций и уравнений. Такие программы свободно и бесплатно распространяются в Интернете. Мы рекомендуем две русифицированные программы GeoGebra и WinPlot.

Программу GeoGebra можно скачать с предлагаемого ниже сайта <http://www.geogebra.org>

На этом же сайте вы детально познакомитесь с возможностями программы. Полезно зарегистрироваться на сайте <http://geogebra.ru> Сибирского института GeoGebra и пройти

---

начальный курс обучения. Само название программы, составленное из частей слов *geometry* и *algebra* (геометрия и алгебра), говорит о том, что её можно использовать при изучении и геометрии, и алгебры. Чтобы скачать программу WinPlot, можно зайти на сайт <http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html> и выбрать там русский язык (Russian).

В тексте учебника рекомендация использовать какую-нибудь компьютерную программу обозначается символом .

Выполненные в этих программах решения задач красивы и наглядны. Многие из них размещены школьниками и учителями математики в Интернете, где их можно поискать. Надеемся, что и ваши решения можно будет там найти.

Вместе с основным материалом, изучение которого обязательно, в учебнике есть и дополнительный материал, знакомство с которым желательно. Начало такого материала обозначается значком «▼», а конец — «△».

В конце учебника в разделе «Основные формулы» вы можете найти нужную формулу.

Решив задачу, сравните свой ответ с ответом в учебнике. Если выполнить задание вы не можете, то прочтайте совет к задаче или посмотрите её решение. В этом вам помогут разделы «Ответы», «Советы» и «Решения».

Каждый пункт учебника завершается контрольными вопросами и заданиями, а к главам учебника предлагаются домашние контрольные работы с указанием примерного времени, на которое рассчитано их выполнение.

Задания домашних контрольных работ разбиты на три уровня, которые соответствуют удовлетворительной, хорошей и отличной оценке. Так что вы сами сможете оценить свои математические достижения.

В конце учебника имеется предметный указатель, особенно полезный при повторении.

В учебник не вошли многие важные и интересные математические вопросы, поэтому для тех, кто интересуется математикой, в справочном разделе учебника имеется список дополнительной литературы и интернет-ресурсов.

***Авторы желают вам успехов!***

## Глава 1

# ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ

Вы уже знакомы с понятием функции из курса алгебры. Однако и в различных разделах математики, и в разных школьных учебниках определение функции даётся по-разному. Будем использовать одно из самых простых определений этого важнейшего математического понятия. С этим определением, а также с некоторыми связанными с понятием функции обозначениями и математическими терминами вы познакомитесь в первом пункте главы. Во втором пункте вы встретитесь с некоторыми уже знакомыми функциями и графиками, в третьем речь пойдёт о важных свойствах функций, часто применяемых при решении уравнений и неравенств, а в четвёртом — об основных преобразованиях графиков.

## 1. Понятие функции

В окружающем нас мире многие величины взаимосвязаны, например количество букв на странице этого учебника зависит от номера страницы, время разморозки в СВЧ-печи зависит в основном от массы продукта, а площадь квадрата — от длины его стороны. Во всех трёх случаях каждому *допустимому* (возможному) значению второй из величин соответствует одно значение первой. Понятно, что в первом примере за номер страницы учебника можно взять любое натуральное число, не большее 319, во втором примере масса продукта ограничена рабочим объёмом печи, а длина стороны квадрата из третьего примера, конечно, положительна.

Мы привели здесь простые примеры зависимостей между двумя величинами. Однако на практике всё несколько сложнее. Так, например, время разморозки зависит не только от массы продукта, но и от его формы и от мощности микроволнового излучения.

В математике обычно отвлекаются (абстрагируются) от физической природы величин и рассматривают зависимости между числовыми переменными.

Переменную  $y$  называют **функцией** переменной  $x$ , если каждому допустимому значению  $x$  соответствует единственное значение  $y$ .

Переменную  $x$  называют **аргументом** функции  $y$ .

Правило, по которому для каждого допустимого значения  $x$  находят соответствующее ему значение функции, обозначают какой-либо буквой. Так, например, чтобы указать, что значения  $y$  получают из значений  $x$  по правилу  $f$ , пишут:

$$y = f(x).$$

Множество допустимых значений аргумента называют **областью определения функции**

и обозначают  $D(f)$  или  $D(y)$ .

Множество, которое составляют все значения функции, называют **областью значений функции** и обозначают  $E(f)$  или  $E(y)$ .



**Пример 1.** Найти область определения функции  $y = \frac{4}{x}$

и вычислить значения функции при  $x$ , равном:  $2, \frac{3}{4}, -6$ .

**Решение.** На аргумент  $x$  формула  $y = \frac{4}{x}$  накладывает единственное ограничение:  $x \neq 0$ , поэтому областью определения данной функции является объединение двух числовых промежутков (интервалов):  $D(y) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$ .

Значение функции, которое соответствует, например,  $x = 2$ , обозначают  $y(2)$ :

$$y(2) = \frac{4}{2} = 2, \quad y\left(\frac{3}{4}\right) = 4 : \frac{3}{4} = \frac{4 \cdot 4}{3} = \frac{16}{3}, \quad y(-6) = \frac{4}{-6} = -\frac{2}{3}.$$

**Ответ:**  $D(y) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$ ;  $y(2) = 2$ ,  $y\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{16}{3}$ ,  $y(-6) = -\frac{2}{3}$ .

**Примечание 1.** В этом примере правило, по которому по значению аргумента находят значение функции, было представлено выражением  $\frac{4}{x}$ . Такой способ задания функции называют

**аналитическим.** Этим способом задано большинство функций, которые встречаются на страницах этого учебника.

Другая ситуация с областью определения возникает, если, например, буквами  $x$  и  $y$  обозначены длины сторон в сантиметрах прямоугольника, имеющего площадь  $4 \text{ см}^2$ . Тогда в силу положительности длин область определения функции  $y = \frac{4}{x}$  представляет собой числовой интервал  $(0; +\infty)$ .

Рассматривая функцию  $y = \frac{4}{x}$  на множество натуральных чисел, имеют дело с **бесконечной последовательностью**. Обычно для последовательностей используют специальные обозначения:  $n$  — для аргумента и  $y_n$  — для соответствующего значения функции, которое называют  $n$ -м членом последовательности.

Саму формулу  $y_n = \frac{4}{n}$  называют формулой  $n$ -го члена последовательности.

**Примечание 2.** Знак « $\cup$ », который использовался для **объединения** промежутков, в математике объединяет любые множества, например:  $\{1; 2; 3\} \cup \{3; 4\} = \{1; 2; 3; 4\}$ .

Перевернув знак объединения, получим математический символ для **пересечения** множеств:  $\{1; 2; 3\} \cap \{3; 4\} = \{3\}$ . Если повернуть знак объединения « $\cup$ » на  $90^\circ$ , то получим знак, который показывает, что все элементы одного из множеств являются элементами другого, например:  $\{1; 2; 3\} \subset \{1; 2; 3; 4\}$ . Как говорят в таких случаях, первое множество является **подмножеством** второго, или второе множество **включает в себя** первое.

**✓ Пример 2.** Функция  $y = f(x)$  задана графически (рис. 1). Найти: 1)  $D(f)$ ; 2)  $f(-1) \approx -0,7$ ; 3) значения аргумента, при которых значение функции равно 2; 4) нули функции; 5) наибольшее и наименьшее значения функции.

**Решение.** 1) Область определения этой функции — числовой промежуток  $[-3; 6]$ ; 2)  $f(-1) \approx -0,7$ ; 3)  $f(x) = 2$  при  $x \approx -2,9$ ,  $x \approx 0,4$  и  $x \approx 1,7$ ; 4) нули функции, т. е. значения  $x$ , при которых  $f(x) = 0$ :  $x \approx -2,3$ ,  $x \approx -0,4$  и  $x \approx 2,7$ ; 5) наибольшее значение функции:  $\max f(x) = f(1) = 4,5$ , наименьшее значение функции:

$$\min f(x) = f(6) = -3.$$




Рис. 1



**Пример 3.** На рисунке 2 изображён график функции  $x = f(y)$ , аргументом которой является переменная  $y$ . Является ли это множество точек координатной плоскости графиком функции  $y$ ?

**Решение.** Чтобы некоторое множество точек координатной плоскости представляло собой график функции  $y$ , все эти точки должны иметь разные абсциссы — любая прямая, перпендикулярная оси абсцисс, или имеет единственную точку, или не имеет ни одной общей точки с графиком функции  $y$ . На рисунке видно, что ось ординат (прямая  $x = 0$ ) пересекает данную кривую в двух точках, значит, эта кривая не является графиком функции  $y$ .




Рис. 2

## Упражнения

1. Приведите свои примеры зависимостей между двумя величинами, и в каждом случае укажите множество допустимых значений второй из них.
2. Является ли  $y$  функцией  $x$ , если  $y$  — это:
  - площадь прямоугольника, а  $x$  его: а) диагональ; б) периметр;
  - в) отношение длин сторон;
  - 2) число десятых в десятичной записи  $x$ ;
  - 3) двузначное число, а  $x$  — сумма его цифр;
  - 4) дата, а  $x$  — температура воздуха в конкретном городе в 10 ч;
  - 5) дата, а  $x$  — количество автомобилей, выпущенных за данные сутки заводом АВТОВАЗ;
  - 6) атмосферное давление в данной точке земной поверхности,  $x$  — конкретное время суток?
 В каких случаях  $x$  является функцией  $y$ ?
3. В книге 300 страниц. Петя каждый день прочитывает по 50 страниц этой книги. Обозначив буквой  $y$  количество не прочитанных Петей страниц, а буквой  $x$  — число дней, когда Петя читает данную книгу: 1) задайте аналитическую функцию  $y$ ; 2) укажите её естественную и реальную области определения.

4. Даны функции:

1)  $f(x) = 2x + 3;$

3)  $f(x) = x^2 + 3x + 4;$

2)  $f(x) = -4x + 5;$

4)  $f(x) = x^2 + 7x - 4.$

Найдите: а)  $f(3)$ ; б) значения  $x$ , при которых  $f(x) = 4$ .

5. Правило  $f$ , задающее функцию  $y = f(x)$ , ставит в соответствие каждому двузначному числу сумму его цифр. Найдите: 1)  $D(f)$ ; 2)  $f(17)$ ,  $f(35)$ ,  $f(59)$ ; 3) при каких значениях  $x$  функция  $f(x)$  принимает значение, равное 3; 4) наибольшее и наименьшее значения функции; 5) \* какое значение функции соответствует наибольшему количеству значений аргумента.

6. По каждому из графиков функций, изображённых на рисунках 3—8, найдите: 1)  $D(f)$ ; 2)  $E(f)$ ; 3)  $f(-2)$ ; 4) при каком значении аргумента значение функции равно 3; 5) нули функции; 6) наибольшее и наименьшее значения функции.

7. Подумайте и определите, существуют ли такие значения аргумента, при которых функции, заданные графиками: 1) на рисунках 3 и 5; 2) на рисунках 5 и 8 — принимают одни и те же значения. Найдите их.

8. Найдите область определения функции  $y$ :

1)  $y = 2x^2 - 7x + 9;$

5)  $y = \frac{1}{x^4 - 5x^2 + 4};$

2)  $y = x^3 + \frac{5}{x} - 7;$

6)  $y = \frac{1}{x^4 - 8x^2 - 9};$

3)  $y = \frac{1}{x^2 - 4};$

7)  $y = \frac{1}{x - |x|};$

4)  $y = \frac{1}{x^2 - 3x + 2};$

8)  $y = \frac{1}{x + |x|}.$

9. 1) Найдите область определения функции  $y$ :

а)  $y = \sqrt{x - 2} \cdot \sqrt{x + 2};$

е)  $y = \sqrt{x + 5} \cdot \sqrt{x - 3};$

б)  $y = \sqrt{x - 2} + \sqrt{x + 2};$

ж)  $y = \sqrt{x + 5} + \sqrt{x + 3}$

в)  $y = \sqrt{(x + 2)(x - 2)};$

з)  $y = \sqrt{(x + 5)(3 - x)};$

г)  $y = \frac{\sqrt{x + 2}}{\sqrt{x - 2}};$

и)  $y = \frac{\sqrt{x + 2}}{\sqrt{x - 2} - 3};$

д)  $y = \sqrt{x + 5} \cdot \sqrt{x + 3};$

к)  $y = \frac{\sqrt{x + 5}}{\sqrt{x + 3} - 2}.$




Рис. 3




Рис. 6




Рис. 4




Рис. 7




Рис. 5




Рис. 8

- 2) С помощью калькулятора вычислите с точностью до сотых значения функций при  $x$ , равном  $\sqrt{2}$ , если это возможно.
10. Постройте график какой-нибудь функции  $f(x)$ , для которой выполняются условия:
- 1)  $D(f) = [-1; 5]$ ,  $E(f) = [-3; 3]$ ;
  - 2)  $D(f) = [-3; 2]$ ,  $E(f) = [-2; 4]$ .
11. На графике (рис. 9) показано изменение температуры воздуха на протяжении трёх суток, начиная с 0 часов 11 июля. На оси абсцисс отмечается время суток, на оси ординат — значение температуры в градусах.
- 1) Когда была самая высокая, а когда самая низкая температура?
  - 2) Какая температура воздуха была 12 июля в 18 ч?
  - 3) Сколько раз в течение трёх дней температура достигала  $12^{\circ}\text{C}$ ?
  - 4) Определите по графику, до какой наибольшей температуры прогрелся воздух 13 июля. Ответ дайте в градусах Цельсия.




Рис. 9




Рис. 10

12. На рисунке 10 точками показано суточное количество осадков, выпадавших в Казани с 3 по 15 февраля. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — количество осадков, выпавших в соответствующий день, в миллиметрах.
- 1) Сколько дней из данного периода не выпадало осадков?
  - 2) Сколько миллиметров осадков выпало 10 февраля, 4 февраля?
  - 3) Какого числа выпало 2 мм, 1 мм осадков?
  - 4) Какого числа выпало наибольшее количество осадков?
13. Из квадрата со стороной 10 см вырезаны квадратики со стороной  $x$  см, и из полученной фигуры сделана открытая коробка (рис. 11). Выразите объём  $V$  ( $\text{см}^3$ ) этой коробки через  $x$ . Укажите область определения функции  $y = V(x)$ .
14. В прямоугольный треугольник с катетами 3 см и 4 см вписан прямоугольник (рис. 12). Обозначив буквой  $x$  (см) длину его стороны, параллельной меньшему катету, выразите периметр  $P$  (см) прямоугольника. Укажите область определения и область значений функции  $y = P(x)$ .



Рис. 11





Рис. 12

15. Запишите площадь:

- 1) правильного шестиугольника как функцию от длины его стороны;
- 2) квадрата как функцию радиуса вписанной в него окружности.

16. Задайте формулой функцию  $S(x)$  — наибольшую площадь треугольника  $ABC$ , если известно, что:

- 1)  $AB = 4$ ,  $BC = x$ ;
- 2) две его медианы по  $x$  каждая.

17. Найдите значение функции  $f(3)$ ,  $f(-2)$ ,  $f(0)$ , если

$$f(x) = x + |x|.$$

18. Функция  $y = f(x)$  определена на промежутке:

- 1)  $[0; 1]$ ;
- 2)  $[-1; 0]$ ;
- 3)  $[-1; 2]$ ;
- 4)  $[1; 2]$ .

Найдите область определения функции:

- |                  |                     |                            |
|------------------|---------------------|----------------------------|
| a) $y = f(-x)$ ; | в) $y = f(x - 1)$ ; | д) $\ast y = f(x +  x )$ ; |
| б) $y = f(2x)$ ; | г) $y = f(x^2)$ ;   | е) $\ast y = f(x -  x )$ . |

19. В математике за некоторыми числовыми множествами закреплены стандартные обозначения:  $N$  — множество натуральных чисел,  $Z$  — множество целых чисел,  $Q$  — множество рациональных чисел,  $R$  — множество действительных чисел,  $R_+$  — множество положительных действительных чисел.

Вставьте вместо многоточия один из знаков « $\cap$ », « $\cup$ », « $\subset$ » так, чтобы получилось верное утверждение:

- |                    |                        |                      |
|--------------------|------------------------|----------------------|
| 1) $N \dots Q$ ;   | 3) $N \dots Z = N$ ;   | 5) $R \dots N = R$ ; |
| 2) $N \dots R_+$ ; | 4) $R_+ \dots Z = N$ ; | 6) $N \dots Q = Q$ . |



## Контрольные вопросы и задания

1. В каких случаях одна переменная является функцией другой?
2. Что такое естественная область определения функции?
3. Приведите пример функции, нуль которой больше, чем  $f(0)$ .
4. Найдите  $D(y)$  и  $y(3)$ , если  $y = \frac{\sqrt{x}}{x - 1}$ .



## 2. Прямая, гипербола, парабола и окружность

С линиями, названия которых приведены в заглавии этого пункта, вы не раз встречались. В нашем курсе им также отводится важная роль. Следующие три рисунка напомнят вам о линейной функции.




Рис. 13




Рис. 14




Рис. 15

Прямая на рисунке 13 представляет собой график линейной функции  $y = kx + l$  при  $k > 0, l > 0$ , на рисунке 14 — при  $k < 0, l > 0$ , а линейная функция на рисунке 15 задаётся формулой  $y = l$ , в которой, вообще, как бы нет аргумента. На самом деле угловой коэффициент  $k$  этой прямой равен нулю:  $y = 0 \cdot x + l$ .

**Функция, которая при всех значениях аргумента принимает одно и то же значение, называется константой (или постоянной).**

**Пример 1.** Задать функцию, график которой параллелен прямой  $y = 2x + 3$  и проходит через точку  $(-5; 2)$ .

**Решение.** Искомое уравнение имеет вид  $y = kx + l$ . Угловые коэффициенты параллельных прямых равны, т. е.  $k = 2$ . Остаётся найти начальную ординату  $l$ . Поскольку координаты данной точки должны удовлетворять искомому уравнению, получим:

$$2 = 2 \cdot (-5) + l, \quad l = 2 + 10 = 12.$$

Окончательно имеем:  $y = 2x + 12$ .

Ответ:  $y = 2x + 12$ .

**Пример 2.** Задать линейную функцию, график которой проходит через точки  $(x_1; y_1)$  и  $(x_2; y_2)$ .

**Решение.** Любая линейная функция задаётся уравнением  $y = kx + l$ . Подстановка в это уравнение координат первой точки приводит к уравнению общего вида прямых, проходящих через точку  $(x_1; y_1)$ :  $\begin{cases} y = kx + l, \\ y_1 = kx_1 + l, \end{cases}$   $y - y_1 = k(x - x_1)$ .

Для определения  $k$  подставим в это уравнение координаты второй из данных точек:  $y_2 - y_1 = k(x_2 - x_1)$ ,

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Имеем:  $y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$ . Группируя и греки и иксы в разных частях уравнения, получим уравнение прямой.

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}.$$

Так и записывают обычно *уравнение прямой, проходящей через две данные точки*.

**Примечание.** В полученном уравнении знаменатели дробей должны отличаться от нуля. Однако никто не запрещает двум данным точкам иметь, например, равные ординаты:  $y_2 = y_1$ . В этом случае график линейной функции оказывается параллелен оси абсцисс и следует сразу написать искомое уравнение:  $y = y_1$ .

Если у данных точек совпадут абсциссы:  $x_2 = x_1$ , то уравнение соответствующей прямой  $x = x_1$  не будет задавать функцию  $y$  (одному значению  $x$  в этом случае соответствует более одного значения  $y$ ).  $\Delta$

На рисунке 16, а и б изображены графики функции  $y = \frac{k}{x}$  при  $k > 0$  и при  $k < 0$  — *гиперболы*, каждая из которых состоит из пары симметричных относительно начала координат ветвей.

Функция  $y = \frac{k}{x}$  определена на множестве всех действительных чисел, кроме 0, т. е. на объединении промежутков:  $(-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$ .

Это же множество является и областью значений функции  $y$ .

Гипербола  $y = \frac{k}{x}$  имеет две оси симметрии: прямые  $y = x$  и  $y = -x$ .





Рис. 16

Обратим внимание на важное свойство гиперболы  $y = \frac{k}{x}$ . При движении по графику от оси ординат расстояние от точек графика до оси абсцисс уменьшается, и график как бы сливается с осью абсцисс. Говорят, что  $y$  стремится к нулю, когда  $x$  стремится к бесконечности.

Аналогично, когда  $x$  стремится к нулю,  $y$  стремится к бесконечности или к минус бесконечности (в зависимости от того, с какой стороны точка приближается к оси ординат).

Ось абсцисс и ось ординат называют соответственно горизонтальной и вертикальной **асимптотами** графика функции  $y = \frac{k}{x}$ .

На рисунке 17 изображена парабола — график ещё одной хорошо известной функции  $y = x^2$ . Ветви её направлены вверх, а вершина расположена в начале координат. Функция  $y = x^2$  определена на множестве всех действительных чисел, а областью её значений является множество неотрицательных чисел.

В Древней Греции, где наиболее развитой частью математики была геометрия, прямую, гиперболу и параболу определяли как геометрические места<sup>1</sup> точек плоскости.

**Прямая** — геометрическое место точек, равноудалённых от двух данных точек (рис. 18).

**Гипербола** — геометрическое место точек, разность расстояний от каждой из которых до двух данных точек равна данному числу (рис. 19).




Рис. 18




Рис. 19

<sup>1</sup> Геометрическим местом точек называют множество всех точек плоскости, для каждой из которых выполняется некоторое условие.

**Парабола** — геометрическое место точек, равноудалённых от данной точки и данной прямой (рис. 20).

Во всех трёх описаниях геометрических мест используется понятие расстояния. Полезно уметь выражать расстояние между двумя точками координатной плоскости через координаты этих точек.

Применяя теорему Пифагора к прямоугольному треугольнику  $ABC$  (рис. 21), получим:

$$AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$




Рис. 20

**Пример 3.** Записать уравнение окружности с центром в точке  $K(3; 4)$ , касающейся оси абсцисс.

**Решение.** Изобразим данную окружность (рис. 22). Центр окружности  $K$  отстоит от касательной к окружности на 4, значит, радиус окружности равен 4. Расстояние от произвольной точки окружности  $M(x; y)$  до её центра  $K(3; 4)$  равно 4:

$$\sqrt{(x - 3)^2 + (y - 4)^2} = 4$$

или, после *освобождения от корня*,  $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 16$ .

**Ответ:**  $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 16$ .

**Примечание.** Окружность не является графиком функции, поскольку для неё не выполняется требование однозначности выражения  $y$  через  $x$ , например прямая  $x = 0$  пересекает данную окружность в двух точках, ординаты которых — корни уравнения  $(0 - 3)^2 + (y - 4)^2 = 16$ .




Рис. 21




Рис. 22

## Упражнения

- 20.** 1) Постройте график функции  $y = -\frac{6}{7}x + 3$ . Найдите по графику:
- координаты точек пересечения этого графика с осями координат;
  - значение функции при  $x = -3,5; 10,5$ ;
  - значение аргумента, которому соответствует  $y = 1; 12$ ;
  - есть ли на графике точки, обе координаты которых — целые числа. Если есть, то сколько таких точек?
- 2) Постройте график функции  $y = \frac{3}{4}x - 1$ . Найдите по графику:
- координаты точек пересечения этого графика с осями координат;
  - значение функции при  $x = -4; -6; 2; 8$ ;
  - значение аргумента, которому соответствует  $y = 1; 2; 5$ ;
  - есть ли на графике точки, обе координаты которых — натуральные числа. Если есть, то сколько таких точек?
- 21.** Найдите  $k$  и  $l$ , если известно, что прямая  $y = kx + l$ :
- параллельна прямой  $y = 0,3x$  и проходит через точку: а)  $A(0; 7)$ ; б)  $B(0; 8)$ ; в)  $C(2; 5)$ ; г)  $D(-5; 6)$ ;
  - параллельна прямой  $y = 0,75x + 11$  и проходит через точку: а)  $K(8; 1)$ ; б)  $M(4; 9)$ ;
  - параллельна прямой  $y = -\frac{3}{7}x - 6$  и проходит через точку: а)  $P(7; 4)$ ; б)  $E(3; 0)$ .
- 22.** Каково примерное расположение графика функции  $y = kx + l$ , если:
- |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1) $k > 0, l > 0$ ; | 4) $k < 0, l < 0$ ; | 7) $k = 0, l > 0$ ; |
| 2) $k < 0, l > 0$ ; | 5) $k > 0, l = 0$ ; | 8) $k = 0, l < 0$ ; |
| 3) $k > 0, l < 0$ ; | 6) $k < 0, l = 0$ ; | 9) $k = 0, l = 0$ ? |
- 23.** Опишите примерное расположение прямой  $y = kx + l$  и определите знаки  $k$  и  $l$ , если график расположен в координатных четвертях:
- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1) в I, II и III; | 3) в I, III и IV;   |
| 2) в I, II и IV;  | 4) во II, III и IV. |

- 24.** Может ли график линейной функции  $y = kx + l$  располагаться только:
- в I и II координатных четвертях;
  - во II и IV координатных четвертях;
  - в III и IV координатных четвертях;
  - в I и III координатных четвертях;
  - в I и IV координатных четвертях?
  - во II и III координатных четвертях?
- 25.** Задайте аналитически линейную функцию, график которой проходит через точки:
- A(-1; 2) и B(1; -1);
  - A(-3; -5) и B(2; 4);
  - A(-5; 13,5) и B(17; 13,5).
- 26.** 1)  Не выполняя построения графика функции  $y = \frac{3}{4}x + 9$ , определите:
- координаты точек его пересечения с осями координат;
  - принадлежит ли графику точка: A(100; 84), B(-0,05; -7,9), C(-30; 30,5);
  - есть ли на графике точка, абсцисса которой равна её ординате.
- 2)  Не выполняя построения графика функции  $y = -\frac{2}{5}x - 8$ ,
- определите:
- координаты точек его пересечения с осями координат;
  - принадлежат ли графику точка: A(50; 12), B(-0,05; -7,98), C(52; 28);
  - есть ли на графике точка, абсцисса и ордината которой — противоположные числа.
- 27.** 1) Прямая  $y = 3x + l$  проходит через точку A(17; 30). Найдите  $l$  и определите, проходит ли эта прямая через точку B(25; 54).
- 2) Прямая  $y = -2,5x + l$  проходит через точку M(-20; 66). Найдите  $l$  и определите, проходит ли эта прямая через точку C(20; 36).

- 28.** Заполняя таблицы значений обратно пропорциональных переменных, ученик допустил в нижних строках по одной ошибке. Исправьте их.

4	7,5	50
1,55	0,8	0,12

0,5	0,25	0,125
16	35	70

- 29.** Задайте формулой зависимость между переменными  $z$  и  $x$ . Являются ли переменные  $z$  и  $x$ : 1) пропорциональными; 2) обратно пропорциональными, если:

- а) переменные  $x$  и  $y$  обратно пропорциональны, а переменные  $y$  и  $z$  пропорциональны, причём  $y = \frac{6}{x}$  и  $z = 0,5y$ ;
- б) переменные  $x$  и  $y$  пропорциональны, а переменные  $y$  и  $z$  обратно пропорциональны, причём  $y = 2,5x$  и  $z = \frac{5}{y}$ ?

- 30.** Найдите число  $k$ , если известно, что график функции  $y = \frac{k}{x}$  проходит через точку: 1)  $M(10; 0,4)$ ; 2)  $E(-1,2; 15)$ .

- 31.** График функции  $y = \frac{k}{x}$  проходит через точку  $A(16; 2,5)$ .

Проходит ли он через точку: 1)  $P(-8; -5)$ ; 2)  $M(12,5; 3,2)$ ?

- 32.** Точка  $C(a; b)$  принадлежит графику функции: 1)  $y = kx$ ;  
2)  $y = \frac{k}{x}$ . Принадлежит ли этому графику точка:

- а)  $A(-a; -b)$ ;      б)  $C(0,1a; 10b)$ ;      д)  $D(-b; a)$ ;  
б)  $B\left(2a; \frac{1}{2}b\right)$ ;      г)  $M(3a; 3b)$ ;      е)  $P(b; a)$ ?

- 33.** 1) Постройте в одной системе координат графики функций:

а)  $y = x$  и  $y = \frac{1}{x}$ ;      г)  $y = 0,5x + 1$  и  $y = x^2$ ;

б)  $y = -2x$  и  $y = \frac{-2}{x}$ ;      д)  $y = \frac{1}{x}$  и  $y = x^2$ ;

в)  $y = 2x - 2$  и  $y = \frac{4}{x}$ ;      е)  $y = \frac{-4}{x}$  и  $y = x^2$ . 

2) Укажите координаты точек пересечения графиков.

34. Имеет ли асимптоты график функции:

1)  $y = \frac{3}{2|x|}$ ;

2)  $y = \frac{1}{x^2}$ ?

35. Сколько общих точек могут иметь графики:

1) линейной функции и функции  $y = \frac{k}{x}$ ;

2) параболы  $y = x^2$  и гиперболы  $y = \frac{k}{x}$ ?

Ответы подтвердите схематическими рисунками.

36.\* Могут ли быть равными суммы координат точек пересечения прямой с ветвью гиперболы  $y = \frac{1}{x}$ , расположенной в I четверти? Какой угловой коэффициент должна иметь такая прямая?

37. Чем отличаются функции  $y = kx$  и  $y = \frac{k}{x}$  при  $k = 0$ ?

38.\* На рисунке 23 изображено несколько случаев взаимного расположения на координатной прямой точек  $A(x)$ ,  $B(x^2)$  и  $C\left(\frac{1}{x}\right)$ . При этом допущено несколько ошибок.

В случаях, когда указанное взаимное расположение точек  $A$ ,  $B$  и  $C$  возможно, укажите, где примерно расположены точки  $O(0)$  и  $E(1)$ .

39. Задайте аналитически функцию, график которой представляет собой множество точек координатной плоскости, равноудалённых от точек:

1)  $A(-1; 2)$  и  $B(1; -2)$ ;

3)  $A(13,5; -2)$  и  $B(13,5; 5)$ ;

2)  $A(-3; -5)$  и  $B(1; 3)$ ;

4)  $A(3; -4)$  и  $B(-4; 3)$ .








Рис. 23

- 40.** Задайте аналитически функцию, график которой представляет собой множество точек координатной плоскости, равноудалённых от прямой  $y = -1$  и от точки  $K(0; 1)$ .
- 41.** Запишите уравнение окружности с центром в точке  $K(2; -3)$ , касающейся:
- 1) оси абсцисс;
  - 2) оси ординат. 
- 42.** Запишите уравнение окружности с радиусом, равным 5, центр которой расположен:
- 1) в точке  $K(4; 4)$ ;
  - 2) на прямой  $y = x$ ;
  - 3) на прямой  $y = -x$ ;
  - 4) на оси ординат. 
- 43.** Найдите область определения и задайте формулой функцию  $S(x)$  — наибольшую площадь треугольника со стороной 4, вписанного в окружность радиуса  $x$ .



### Контрольные вопросы и задания

1. Все ли прямые, проходящие через точку  $A(2; 1)$ , можно задать уравнениями вида  $y - 1 = k(x - 2)$ ?
2. Найдите координаты точек пересечения прямой  $y = 12x - 11$  и параболы  $y = x^2$ .
3. Запишите уравнение, задающее геометрическое место точек, равноудалённых от точек  $A(2; 0)$  и  $B(5; 3)$ .



## 3. Непрерывность и монотонность функций

Графики линейной функции и функции  $y = x^2$  представляют собой сплошные непрерывные линии, которые можно изобразить, не отрывая карандаш от бумаги. Поэтому и сами эти функции называют *непрерывными*.

В отличие от них, график функции  $y = \frac{k}{x}$  состоит из двух изолированных непрерывных ветвей. Говорят, что функция  $y = \frac{k}{x}$  непрерывна на промежутках  $(-\infty; 0)$  и  $(0; +\infty)$ , а при  $x = 0$  имеет разрыв.

**Пример 1.** Является ли непрерывной функция

$$y = \begin{cases} x^2, & \text{при } x \geq 1, \\ 3 - x, & \text{при } x < 1? \end{cases}$$

**Решение.** Данная функция на разных промежутках задаётся разными выражениями. Такие функции называют *кусочно-заданными*.

Понятно, что на промежутке  $(1; +\infty)$  данная функция не имеет *точек разрыва*. Непрерывна она и на промежутке  $(-\infty; 1)$ .

Значит, остаётся выяснить, как выглядит её график в непосредственной близости от точки с абсциссой 1, как говорят, *в окрестности точки 1*.

График данной функции (рис. 24) состоит из части прямой  $y = 3 - x$  и части параболы  $y = x^2$ . Когда абсциссы точек левой части графика приближаются к 1, их ординаты приближаются к числу 2. Правая же ветвь графика начинается в точке  $(1; 1)$ . При переходе от левой ветви графика к правой придётся оторвать карандаш от бумаги. Значит, функция

$$y = \begin{cases} x^2, & \text{при } x \geq 1, \\ 3 - x, & \text{при } x < 1 \end{cases}$$

имеет разрыв в точке  $x = 1$ .

Ответ: функция имеет разрыв.




Рис. 24

**Примечание 1.** Мы связали понятие непрерывности функции с возможностью изобразить её график, не отрывая карандаш от бумаги. В большинстве случаев такое представление вполне достаточно для решения задач. С более строгим определением непрерывности вы встретитесь в курсе 11 класса.

**Примечание 2.** Все функции, заданные аналитически (формулами), с которыми вы встречались в курсе математики:  $y = P(x)$ ,  $y = \frac{P(x)}{Q(x)}$ ,  $y = \sqrt{P(x)}$  и т. п., где  $P(x)$  и  $Q(x)$  — многочлены, *непрерывны на любом промежутке, входящем в область их определения*.

Познакомимся с двумя функциями, имеющими бесконечное множество точек разрыва. Уже в 5 классе, при записи неправильных дробей в виде смешанных чисел вы встре-

тились с понятиями целой и дробной частей числа. Например,  $\frac{14}{3} = 4 + \frac{2}{3}$ . Здесь 4 — целая часть, а  $\frac{2}{3}$  — дробная часть числа  $\frac{14}{3}$ .

**Целой частью** числа  $x$  называется наибольшее целое число, не превосходящее  $x$ .

Для обозначения целой части используются квадратные скобки:  $[x]$  — целая часть числа  $x$ . Дробную часть  $\{x\}$  можно определить через само число  $x$  и его целую часть  $[x]$ :  $\{x\} = x - [x]$ .

**Примечание.** Из определения целой и дробной части следует, что:

- 1) целая часть целого числа равна самому числу. В этом случае дробная часть оказывается равной нулю;
- 2) дробная часть числа не обязательно является дробным числом. Мы уже видели, что она может оказаться равной целому числу 0, дробная часть может представлять собой и иррациональное число:  $\{\sqrt{2}\} = \sqrt{2} - 1$ .

Рассмотрим функции  $y = [x]$  и  $y = \{x\}$ . Обе они определены на множестве  $\mathbf{R}$  всех действительных чисел. Значением первой из них может быть любое целое число, а значения второй функции заполняют промежуток  $[0; 1)$ . На графиках этих функций (рис. 25) видно, что все целые числа являются их точками разрыва.

С непрерывностью функций связано полезное при решении различных задач утверждение, которое является теоремой.




Рис. 25

**Теорема о промежуточном значении**

Если непрерывная на отрезке функция принимает на его концах значения разных знаков, то по крайней мере в одной точке этого отрезка она обращается в нуль.

Это утверждение становится очевидным, если обратиться к графической интерпретации: непрерывная линия, соединяющая точки верхней и нижней координатных полуплоскостей, пересекает ось абсцисс (рис. 26).

Заметим, что если непрерывная на промежутке функция не обращается в нуль ни в одной его точке, то на этом промежутке она сохраняет знак. Таким образом, *перемена знака любой функции может происходить только при переходе её через нуль, или точку разрыва*. На этом свойстве функций основан приём решения неравенств, который называется *методом интервалов*.




Рис. 26

**Пример 2.** Решить неравенство  $\frac{10(x^2 + 16x - 26)}{3(x^2 - 5x + 2)} > 0$ .

**Решение.** Найдём промежутки, на которых функция

$$y = \frac{10(x^2 + 16x - 26)}{3(x^2 - 5x + 2)}$$

сохраняет знак. В данном случае границами её промежутков знакопостоянства являются нули числителя и нули знаменателя дроби

$$\frac{10(x^2 + 16x - 26)}{3(x^2 - 5x + 2)}.$$

Нули числителя: 1 и  $-2,6$ , нули знаменателя: 1 и  $\frac{2}{3}$ . Таким образом, точки разрыва функции  $y$  — точки 1 и  $\frac{2}{3}$ , а её нуль — точка  $-2,6$ .

Эти точки разбивают координатную прямую на четыре интервала (рис. 27, a), на каждом из которых функция  $y$  сохраняет знак.







Рис. 27

Остаётся эти знаки определить. Для этого можно вычислить значение функции в какой-нибудь точке каждого интервала. Но можно использовать и другие соображения. Так, например, зная, что каждый из квадратных трёхчленов, стоящих в числителе и знаменателе дроби, справа от своего большего корня принимает положительные значения, можно определить знак функции на самом правом интервале (рис. 27, б).

Каждый из данных квадратных трёхчленов меняет знак при переходе через свой корень. Значит, при переходе через их общий корень 1 знак изменят и числитель, и знаменатель дроби, а сама дробь при этом свой знак сохранит (рис. 27, в).

При переходе через точку  $\frac{2}{3}$  знак изменит только знаменатель, а при переходе через точку  $-2,6$  изменит знак только числитель. Каждый из этих переходов приведёт к изменению знака всей дроби, что можно показать с помощью *кривой знаков* (рис. 27, г).

**Ответ:**  $(-\infty; -2,6) \cup \left(\frac{2}{3}; 1\right) \cup (1; +\infty)$ .

 **Примечание.** Ответ можно записать с помощью простейших неравенств:

$$x < -2,6, \quad \frac{2}{3} < x < 1, \quad x > 1.$$

Теорема о промежуточном значении позволяет установить, что на некотором промежутке имеется нуль функции  $y = f(x)$ , но из неё не следует, что этот нуль единственный. А такая информация была бы очень полезна, например, при решении уравнений, когда нужно найти *все* корни уравнения  $f(x) = 0$ . Здесь на помощь приходят другие свойства, которыми обладают некоторые функции.

Рассмотрим линейную функцию  $y = kx + l$  при  $k > 0$  (см. рис. 13). Легко видеть, что с увеличением значения аргумента увеличивается (возрастает) и значение функции. Функции, обладающие таким свойством, называют *возрастающими*.

При  $k < 0$  (см. рис. 14) с увеличением значения аргумента значение линейной функции уменьшается (убывает). Такие функции называют *убывающими*.

Конечно, не только линейные функции являются *возрастающими* или *убывающими*. Так, например, известная вам




Рис. 28




Рис. 29

функция  $y = x^3$ , графиком которой является кубическая парабола (рис. 28), является возрастающей, она возрастает на всей своей области определения. На всей своей области определения возрастает и функция  $y = \sqrt{x}$  (рис. 29).

Часто, однако, встречаются функции, которые на одних промежутках возрастают, а на других убывают. Так, например, функция  $y = x^2$  (см. рис. 17) на промежутке  $(-\infty; 0]$  убывает, а на промежутке  $[0; +\infty)$  возрастает.

**Функция  $y = f(x)$  называется возрастающей на некотором промежутке, если для любых двух значений  $x_1$  и  $x_2$ , из этого промежутка из неравенства  $x_1 < x_2$  следует неравенство  $f(x_1) < f(x_2)$ .**

**Функция  $y = f(x)$  называется убывающей на некотором промежутке, если для любых двух значений  $x_1$  и  $x_2$ , из этого промежутка из неравенства  $x_1 < x_2$  следует неравенство  $f(x_1) > f(x_2)$ .**

Возрастающие и убывающие функции называют **монотонными**, а промежутки возрастания и убывания называют **промежутками монотонности**.

Вернёмся к вопросу о единственности корня. Пусть некоторая непрерывная функция  $y = f(x)$  монотонна на отрезке  $[a; b]$  и принимает в его концах значения разных знаков. Тогда на этом отрезке она имеет единственный нуль, т. е. уравнение  $f(x) = 0$  имеет единственный корень на отрезке  $[a; b]$ .



**Пример 3.** Решить уравнение  $\sqrt{x^3} + x - 12 = 0$ .

**Решение.** Непрерывная функция  $y = \sqrt{x^3} + x - 12$  является возрастающей (при увеличении  $x$  увеличиваются значения каждого из выражений:  $x^3$ ,  $\sqrt{x^3}$ ,  $\sqrt{x^3} + x$  и  $\sqrt{x^3} + x - 12$ ). Проще всего найти её значение при  $x = 0$ . Это значение отрицательно, а, например, при  $x = 12$  значение функции положительно. Значит, единственный корень данного уравнения принадлежит отрезку  $[0; 12]$ . В данном случае его легко подобрать:

$$\sqrt{4^3} + 4 - 12 = 2^3 + 4 - 12 = 0.$$

**Ответ:** 4.

**Примечание.** Монотонная функция каждое своё значение принимает только один раз (т. е. при одном значении аргумента). Значит, уравнение  $f(x) = a$ , где  $a$  некоторое число, а  $f(x)$  монотонная функция, либо не имеет корней, либо имеет единственный корень.

## Упражнения

**44.** Найдите  $f(-1)$ ,  $f(-0,5)$ ,  $f(0)$ , если:

$$1) f(x) = \begin{cases} 3 + x^2, & -1 \leq x < 0, \\ x(3-x), & 0 \leq x < 3; \end{cases}$$

$$2) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+3}, & -2 \leq x < -1, \\ |1-x|, & -1 \leq x < 2. \end{cases}$$

**45.** Найдите значение функции  $y = |x^2 - 1|$  при  $x = 1$  и  $x = -0,5$ .

**46.** Найдите промежутки, на которых непрерывна функция:

$$1) y = \frac{1}{5x+7};$$

$$3) y = \frac{x^2}{x^2 + 4x + 4};$$

$$2) y = \frac{1}{x^2 - 9};$$

$$4) y = \frac{2x+3}{3x^2 - 7x + 4}.$$

**47.** Найдите точки разрыва функции:

$$1) y = \frac{|x-5|}{x^3 - 8x^2 + 15x};$$

$$2) y = \frac{|x+5|}{x^3 + 9x^2 + 14x}.$$

**48.** 1) Постройте график кусочно-заданной функции:

а)  $y = \begin{cases} x & \text{при } x < 0, \\ x^2 & \text{при } x \geq 0; \end{cases}$  г)  $y = \begin{cases} 2x - 1 & \text{при } x \geq 1, \\ \frac{1}{x} & \text{при } 0 < x < 1; \end{cases}$

б)  $y = \begin{cases} x & \text{при } x \geq 0, \\ x^2 & \text{при } x < 0; \end{cases}$  д)  $y = \begin{cases} x + 2 & \text{при } x < -1, \\ x^2 & \text{при } -1 \leq x < 2, \\ 5 - x & \text{при } x \geq 2; \end{cases}$

в)  $y = \begin{cases} 3x - 1 & \text{при } x \leq 1, \\ x^2 & \text{при } x > 1; \end{cases}$  е)  $y = \begin{cases} \frac{2}{x} & \text{при } x \leq -2, \\ x - 1 & \text{при } -2 < x < 1, \\ 5 - x & \text{при } x \geq 1. \end{cases}$

2) Имеют ли функции разрывы? В каких точках?

**49.** Найдите область определения и задайте кусочно функцию  $S(x)$  — наибольшую площадь треугольника  $KMN$ , у которого  $KM \leq 3$ ,  $MN \leq 4$ ,  $KN \leq x$ .

**50.** Приведите пример функции непрерывной:

1)  $\textcircled{1}$  при всех значениях  $x$ ;

2)  $\textcircled{2}$  при всех значениях  $x$ , кроме  $x = 2$ ;

3)  $\textcircled{3}$  при всех значениях  $x$ , кроме  $x = 2; 5$  и  $9$ .

4)  $\textcircled{4}$  В заданиях 2) и 3) приведите примеры функций, определённых в точках разрыва.

5)  $\textcircled{5}$  В задании 3) приведите пример функции, неопределённой в точках разрыва и имеющей единственную вертикальную асимптоту.

**51.** Докажите, что уравнение  $3x^3 - 4x^2 + 2x - 1 = 0$  на промежутке  $[0; 2]$  имеет корень.

**52.** Решите неравенство:

1)  $x(x - 1)(x + 8) > 0$ ; 4)  $(3x + 5)(x - 3)(x + 1) \leq 0$ ;

2)  $\frac{x + 3}{x(x - 7)} \leq 0$ ; 5)  $\frac{(x - 1)(2x + 5)}{7 - 6x - x^2} < 0$ ;

3)  $\frac{(x + 3)(3x - 2)}{x(x - 7)} > 0$ ; 6)  $x(3x^2 + x - 2)(3x - 2) \leq 0$ .

**53.** Решите неравенство:

1)  $\frac{t - 1}{3t + 2} + \frac{2 - t}{3t + 1} \leq 0$ ; 3)  $\frac{3x - 1}{x - 1} - \frac{2x + 1}{x + 1} < 1$ ;

2)  $\frac{2z + 1}{z + 3} + \frac{6z - 1}{5 - 3z} \geq 0$ ; 4)  $\frac{2y + 1}{y + 2} + \frac{1 - 5y}{y - 3} \geq -3$ .

**54.** Найдите область определения функции:

$$1) y = \sqrt{\frac{2-x}{x^2-4}}; \quad 2) y = \sqrt{(x+2)(x^2-4)}.$$

**55.** Функция  $y = f(x)$  задана своим графиком (см. рис. 3—8, с. 12). Запишите промежутки возрастания и убывания этой функции.

**56.** На графике (рис. 30) показан процесс разогрева двигателя легкового автомобиля при температуре окружающего воздуха  $10^{\circ}\text{C}$ . На оси абсцисс откладывается время в минутах, прошедшее от запуска двигателя, на оси ординат — температура двигателя в градусах Цельсия. Когда температура достигает определённого значения, включается вентилятор, охлаждающий двигатель, и температура начинает понижаться.




Рис. 30

1) Сколько минут прошло от момента запуска двигателя до включения вентилятора?

2) При какой температуре двигателя включился вентилятор?

3) Запишите промежутки возрастания и убывания температуры двигателя.

- 57.** 1) Докажите, что если возрастающие функции  $y = f(x)$  и  $y = g(x)$  определены на промежутке  $L$ , то их сумма  $y = f(x) + g(x)$  на этом промежутке возрастает.
- 2) Можно ли утверждать, что функция, являющаяся суммой двух убывающих функций, определённых на одном и том же промежутке, является убывающей?

**58.** 1) Найдите промежутки возрастания и убывания функции:

а)  $y = (x - 2)^2 + 1$ ;      в)  $y = \frac{-1}{x^2 + 2}$ ;

б)  $y = \frac{1}{x^2 - 4x + 5}$ ;      г)  $y = \frac{2x + 1}{x + 4}$ .

2) Найдите наименьшее или наибольшее значение функции.

**59.** Какие из следующих функций являются возрастающими, убывающими?

1)  $y = 2x + 1$ ;      4)  $y = x^3 + x$ ;      7)  $y = x^2\sqrt{x+2}$ ;

2)  $y = 5 - 0,5x$ ;      5)  $y = x^3 + \sqrt{x}$ ;      8)  $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ;

3)  $y = x^2 + 1$ ;      6)  $y = x(3+x)$ ;      9)  $y = -\frac{1}{\sqrt{x}}$ .

**60.** Докажите, что если  $y = f(x)$  — возрастающая функция, то функция  $y = -f(x)$  — функция убывающая.

**61.** Докажите, что если возрастающая функция  $y = f(x)$  принимает на промежутке  $L$  только положительные значения, то функция  $y = \frac{1}{f(x)}$  на этом промежутке убывает.

**62.** Докажите утверждение: «Если  $f(a) < g(a)$  и  $f(b) > g(b)$ , где функция  $y = f(x)$  непрерывна и возрастает на  $[a; b]$ , а функция  $y = g(x)$  на этом промежутке непрерывна и убывает, то уравнение  $f(x) = g(x)$  имеет на  $(a; b)$  единственный корень».

**63.** Докажите, что уравнение  $f(x) = g(x)$ , где  $y = f(x)$  возрастающая, а  $y = g(x)$  убывающая функции, либо не имеет корней, либо имеет единственный корень.

**64.** Решите уравнение: 

1)  $\sqrt{x} + \sqrt{x+5} = 5$ ;      2)  $\sqrt{x+6} + \sqrt{x-1} = 7$ .

**65.** С помощью доказанного в № 63 утверждения решите уравнение: 

1)  $\sqrt{x-3} + \sqrt{x+2} = 19 - 2x$ ;      2)  $\sqrt{x-9} + \sqrt{x} = 14 - \frac{x}{5}$ .

- 66.** Докажите, что уравнение  $3x^3 + 2x - \frac{1}{x} = 0$  имеет единственный корень на промежутке  $[0,5; 2]$ .
- 67.** Изобразите график какой-нибудь непрерывной функции, зная, что:
- функция определена на промежутке  $[-3; 4]$ ;
  - значения функции составляют промежуток  $[-3; 3]$ ;
  - функция возрастает на промежутке  $[-3; 0]$ , а убывает на промежутке  $[0; 4]$ ;
  - нули функции:  $-1$  и  $2$ ;
- область определения функции есть промежуток  $[-4; 3]$ ;
  - значения функции составляют промежуток  $[-1; 4]$ ;
  - функция возрастает на промежутке  $[-1; 1]$ , а убывает на промежутках  $[-4; -1]$  и  $[1; 3]$ ;
  - нули функции:  $-1$  и  $2$ ;
- область определения функции — промежуток  $[-4; 3]$ ;
  - значения функции составляют промежуток  $[-5; 3]$ ;
  - функция убывает на промежутках  $[-4; 1]$  и  $[2; 3]$ , а возрастает на промежутке  $[1; 2]$ ;
  - нули функции:  $-2$  и  $2$ ;
- функция определена на промежутке  $[-5; 2]$ ;
  - значения функции составляют промежуток  $[-2; 5]$ ;
  - функция убывает на промежутке  $[-3; -1]$ , а возрастает на промежутках  $[-5; -3]$  и  $[-1; 2]$ ;
  - нули функции:  $-4$  и  $-1$ .

**68.**\* Найдите все значения  $k$  такие, что уравнение:

- $kx - 1 = [x]$ ;      2)  $kx - 1 = \{x\}$  имеет ровно:
  - два положительных корня;
  - два отрицательных корня;
  - два корня.



## Контрольные вопросы и задания

- Изобразите график какой-нибудь функции, определённой на отрезке  $[-3; 4]$ , так, чтобы на промежутках  $[-3; 1]$  и  $[1; 4]$  она была непрерывной, а в точке  $x = 1$  имела разрыв.
- Какой смысл имеют «пустой» и чёрный кружки на графике функции, изображённом на рисунке 24 (см. с. 25)? Как следует изменить задание этой функции, чтобы кружки поменялись местами?

3. Изобразите график какой-нибудь функции  $y = f(x)$ , непрерывной на отрезке  $[1; 4]$ , так, чтобы одновременно выполнялись условия: 1)  $x = 3$  — нуль функции; 2) функция убывает на отрезке  $[1; 2]$  и возрастает на отрезке  $[2; 4]$ .

Сколько корней имеет уравнение  $f(x) = 0$  на отрезке  $[1; 4]$ ? В какой точке функция принимает своё наименьшее значение?

## 4. Квадратичная и дробно-линейная функции. Преобразование графиков

Умение строить графики функций, рассмотренных в предыдущем пункте, часто помогает в построении более сложных графиков. Наиболее яркий из знакомых вам примеров преобразования графиков — получение графика квадратичной функции  $y = ax^2 + bx + c$  из графика функции  $y = x^2$ . Вспомним это преобразование.

1. Если  $a$  положительно, то при переходе от графика  $y = x^2$  к графику  $y = ax^2$  первый график как бы растягивается от оси абсцисс в  $a$  раз. На рисунке 31 показаны графики функций  $y = ax^2$  при некоторых значениях  $a$ .

**Примечание.** На русском языке странно звучит «растянуть в 0,5 раза». Естественнее в таких случаях говорить: «сжать в 2 раза». Это, правда, не поможет, когда  $a$  будет равно, например,  $\frac{2}{3}$ .






Рис. 31



a)



б)

Рис. 32

Если  $a$  отрицательно, то сначала нужно перейти от графика  $y = x^2$  к графику  $y = -x^2$ , симметричному относительно оси абсцисс, а затем растянуть полученный график от оси абсцисс в  $-a$  раз (рис. 32, а, б).

▼ Для тех, кто из курса геометрии знаком с понятием гомотетии, заметим, что график функции  $y = ax^2$  получается из графика функции  $y = x^2$  с помощью гомотетии с центром в начале координат и коэффициентом  $\frac{1}{a}$  (рис. 33). Отсюда, в частности, следует, что все параболы подобны. △

2. Переход от графика функции  $y = ax^2$  к графику функции  $y = ax^2 + bx + c$  можно осуществить с помощью двух переносов параллельно осям координат. Сначала выделим квадрат двучлена из выражения  $ax^2 + bx + c$ :

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} = \\ &= a(x - x_0)^2 + y_0, \end{aligned}$$

где  $x_0 = -\frac{b}{2a}$  и  $y_0 = \frac{4ac - b^2}{4a}$ .

Затем с помощью переноса на  $x_0$ , параллельно оси абсцисс, из графика функции  $y = ax^2$  получим график функции  $y = a(x - x_0)^2$ , и, наконец, перенеся получившийся график параллельно оси ординат на  $y_0$ , придём к графику функции




Рис. 33

$y = ax^2 + bx + c$  (рис. 34). Этот график представляет собой параболу с вершиной в точке с координатами

$$\left(-\frac{b}{2a}; \frac{4ac - b^2}{4a}\right).$$

Зафиксируем в таблице преобразования графиков, с которыми мы встретились при построении графика квадратичной функции.




Рис. 34

Исходный график	Преобразование	Новый график
$y = f(x)$	Симметрия относительно оси абсцисс	$y = -f(x)$
$y = f(x)$	Растяжение от оси абсцисс в $k$ раз	$y = kf(x)$
$y = f(x)$	Перенос вдоль оси абсцисс на $a$	$y = f(x - a)$
$y = f(x)$	Перенос вдоль оси ординат на $a$	$y = f(x) + a$

Эти и другие преобразования часто используются при построении различных графиков.

**Пример 1.** Построить график дробно-линейной функции

$$y = \frac{4x+2}{2x-1}.$$

**Решение.** Преобразуем выражение  $\frac{4x+2}{2x-1}$ :

$$\begin{aligned} \frac{4x+2}{2x-1} &= \frac{4x-2+4}{2x-1} = \\ &= \frac{4x-2}{2x-1} + \frac{4}{2x-1} = 2 + \frac{2}{x-0,5}. \end{aligned}$$

$$\text{График функции } y = \frac{2}{x-0,5} + 2$$

можно получить из графика функции  $y = \frac{1}{x}$  с помощью цепочки преобразований (рис. 35):

$$\frac{1}{x} \rightarrow \frac{1}{x-0,5} \rightarrow \frac{2}{x-0,5} \rightarrow \frac{2}{x-0,5} + 2.$$




Рис. 35

Заметим, что при построении графиков в тетради бывает удобно сдвигать не сам график, а оси координат. Так, вместо сдвига графика вправо на 0,5 можно сдвинуть ось ординат на 0,5 влево, а вместо сдвига графика вверх на 2 опустить на 2 ось абсцисс.

Полученный график имеет горизонтальную и вертикальную асимптоты:  $y = 2$ ,  $x = 0,5$ .

Функция  $y = \frac{4x+2}{2x-1}$  определена на объединении интервалов  $(-\infty; 0,5) \cup (0,5; +\infty)$ , непрерывна и убывает на каждом из интервалов  $(-\infty; 0,5)$  и  $(0,5; +\infty)$ .



### Пример 2. Построить график функции $y = |x|$ .

**Решение.** Будем преобразовывать график функции  $y = x$ .

**1** Заметим, что все точки графика  $y = x$  с неотрицательными абсциссами принадлежат графику  $y = |x|$ , т. е. при преобразовании графика остаются на месте.

**2** Поскольку  $|-x| = |x|$ , точки графика  $y = |x|$  в левой полуплоскости симметричны его точкам в правой полуплоскости относительно оси ординат. Этими точками заменяется часть исходного графика  $y = x$ , расположенная в левой координатной полуплоскости (рис. 36).




Рис. 36

**Примечание 1.** Проведённые рассуждения останутся справедливыми при преобразовании любого графика функции  $y = f(x)$  в график функции  $y = f(|x|)$ .

**Примечание 2.** При построении графика функции  $y = |x|$  можно было рассуждать и по-другому. Так, поскольку постановка знака модуля не изменяет положительных чисел и нуля, а отрицательные числа заменяет на им противоположные, мы могли оставить на месте все точки графика  $y = x$  в верхней полуплоскости и заменить на симметричные относительно оси абсцисс все его точки нижней полуплоскости.

Дополним список преобразований графиков.

Исходный график	Преобразование	Новый график
$y = f(x)$	Симметрия относительно оси ординат	$y = f(-x)$
$y = f(x)$	Симметрия относительно начала координат	$y = -f(x)$
$y = f(x)$	Уничтожение части графика слева от оси ординат и дублирование оставшейся части симметрично относительно оси ординат	$y = f( x )$
$y = f(x)$	Симметрия относительно оси абсцисс частей графика, расположенных в нижней полуплоскости	$y =  f(x) $
$y = f(x)$	Уничтожение части графика под осью абсцисс и дублирование оставшейся части симметрично относительно оси абсцисс	$ y  = f(x)$

**П р и м е ч а н и е 3.** Последнее преобразование приводит к графику, который, вообще говоря, не является графиком функции  $y$ .

 **Пример 3.** Построить график уравнения  $|y| = x^2 - 2|x|$ .

**Р е ш е н и е.** Выполним цепочку преобразований графика функции  $y = x^2 - 2x$ :

$$y = x^2 - 2x \rightarrow y = |x|^2 - 2|x| \rightarrow |y| = |x|^2 - 2|x| \text{ (рис. 37).}$$




Рис. 37



**Пример 4.** Изобразить множество точек координатной плоскости, координаты которых удовлетворяют неравенству  $\frac{y^2 - x^2 + 2|x| - 1}{4 - x^2 - y} \geq 0$ .

**Решение.** Будем решать эту задачу способом, напоминающим метод интервалов. Сначала отметим точки, координаты которых обращают в нуль числитель и знаменатель данной дроби:

$$y^2 - x^2 + 2|x| - 1 = 0, \quad y^2 = (|x| - 1)^2, \\ y = |x| - 1$$

или

$$y = -|x| + 1, \quad 4 - x^2 - y = 0, \\ y = 4 - x^2.$$




Рис. 38

Построенные линии разделили координатную плоскость на 10 областей, для координат точек каждой из которых дробь сохраняет знак (рис. 38). Остаётся определить знак дроби в каждой из областей или определить его в одной из областей и учесть, что при пересечении любой из линий дробь изменяет свой знак. Так, например, для точки (0; 5) значение дроби отрицательно, следовательно, соответствующая область в искомое множество не входит, а соседние с ней входят — их следует закрасить.

**Примечание.** Точки, в которых числитель дроби обращается в нуль, входят в искомое множество и изображаются сплошными линиями, а точки, в которых знаменатель обращается в нуль, — штриховыми.

## Упражнения

69. Найдите координаты вершины параболы:

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1) $y = \frac{2}{3}x^2 + 6;$  | 5) $y = -2x^2 + 8x + 3;$ |
| 2) $y = -\frac{3}{4}x^2 - 2;$ | 6) $y = -2x^2 - 8x + 3;$ |
| 3) $y = x^2 - 4x + 1;$        | 7) $y = 2x^2 - 10x;$     |
| 4) $y = -x^2 - 6x + 5;$       | 8) $y = 0,5x^2 + 7x.$    |




Рис. 39

- 70.** Самые красивые мосты — вантовые. Вертикальные пилоны связаны огромной провисающей цепью. Тросы, которые свисают с цепи и поддерживают полотно моста, называются вантами.

На рисунке 39 изображена схема одного вантового моста. Введём систему координат: ось  $Oy$  направим вертикально вдоль одного из пилонов, а ось  $Ox$  направим вдоль полотна моста, как показано на рисунке. В этой системе координат линия, по которой провисает цепь моста, имеет уравнение:

$$y = 0,0061x^2 - 0,692x + 29.$$

- 1) Найдите длину ванты, расположенной в 100 м от пилона. Ответ дайте в метрах.
- 2) Найдите расстояние между пylonами с точностью до 1 м.

- 71.** Задайте уравнением какую-нибудь параболу с вершиной в точке: 1)  $(0; 2)$ ; 2)  $(2; 0)$ ; 3)  $(-2; 3)$ ; 4)  $(3; -2)$  так, чтобы ветви параболы были направлены: а) вверх; б) вниз.

- 72.** Постройте график функции  $y = f(x)$ , если:

$$1) f(x) = 0,5x^2 - 5x + 2; \quad 2) f(x) = -0,5x^2 + 4x + 3.$$

Найдите по графику:

- а)  $f(-1)$ ;
- б)  $f(2)$ ;
- в) все значения  $x$ , при которых  $f(x) = 6$ ;
- г) все значения аргумента, при которых  $f(x) > 6$ ;
- д) промежутки возрастания и убывания функции;
- е) наибольшее и наименьшее значения, которые принимает функция на промежутке  $[-1; 7]$ . 

**73.** 1) Постройте график функции:

- а)  $y = x^2 + 3$ ;
- г)  $y = 5 - 2x - x^2$ ;
- б)  $y = 2x - x^2$ ;
- д)  $y = x^2 - 8x + 20$ ;
- в)  $y = 1 - x - x^2$ ;
- е)  $y = 2x^2 - 6x + 2$ .

2) Для каждой функции найдите: а) область определения; б) область значений; в) координаты вершины параболы; г) значение дискриминанта; д) количество корней; е) наибольшее и наименьшее значение на промежутке  $[-1; 7]$ .

**74.** 1) Изобразите схематически, каким может быть график функции  $y = x^2 + bx + c$ , если уравнение  $x^2 + bx + c = 0$  имеет: 

- а) два положительных корня;
- б) два отрицательных корня;
- в)  единственный положительный корень;
- г)  единственный отрицательный корень;
- д)  оба корня на промежутке  $[-1; 2]$ ;
- е)  ни одного корня на промежутке  $[-1; 2]$ .

2) Что можно сказать в заданиях а)–д) об абсциссе вершины соответствующей параболы?

**75.** При каких значениях  $k$  неравенство:

$$1) 2x^2 - 6x + k > 0; \quad 2) kx^2 - 8x - 20 < 0$$

- а) верно при всех значениях  $x$ ;
- б) верно при всех значениях  $x$ , кроме одного;
- в)  неверно ни при каком значении  $x$ ? 

**76.** Определите знак числа  $a$ , если известно, что квадратное уравнение  $ax^2 + bx + c = 0$  не имеет корней и  $a - b + c > 0$ .

**77.** Найдите все значения  $a$ , при которых:

- 1) один корень уравнения  $x^2 - 2x + a = 0$  больше, а другой меньше, чем  $a$ ;
- 2) уравнение  $x^2 - ax + a - 1 = 0$  имеет единственный положительный корень. 

**78.** Имеет ли корни уравнение:

1)  $957x^2 - 4x - 23 = 0$ ;      3)  $114x^2 - 497x + 379 = 0$ ;  
 2)  $311x^2 - 821x + 431 = 0$ ;      4)  $613x^2 + 812x + 135 = 0$ ?

**79.** Найдите наибольшее и наименьшее значения, которые принимает функция:

1)  $y = \sqrt{2x^2 + 5x + 1}$  на промежутке  $[3; 4]$ ;

2)  $y = \sqrt{\frac{1}{2}(x^2 - 5x + 13)}$  на промежутке  $[3; 6]$ ;

3)  $y = \frac{6}{\sqrt{3 + x - \frac{1}{4}x^2}}$  на промежутке  $[-1; 3]$ ;

4)  $y = \frac{-6}{\sqrt{2x^2 - x - 1}}$  на промежутке  $[2; 3]$ .

**80.** В прямоугольный треугольник с катетами 3 см и 4 см вписан прямоугольник (рис. 40). Обозначив буквой  $x$  длину его стороны в сантиметрах, параллельной меньшему катету, выразите площадь  $S$  ( $\text{см}^2$ ) прямоугольника. Укажите область определения и область значений функции  $y = S(x)$ .




Рис. 40

**81.** 1) Постройте график дробно-линейной функции:

а)  $y = 3 - \frac{2}{x}$ ;      в)  $y = \frac{2x - 1}{x + 1}$ ;  
 б)  $y = \frac{3}{x} - 2$ ;      г)  $y = \frac{2 - 3x}{x - 1}$ .

2) Напишите уравнения асимптот этого графика и укажите промежутки возрастания или убывания данной функции.

**82.** Перерисуйте в тетрадь график функции  $y = f(x)$ :

- 1) рис. 3;      3) рис. 5;  
 2) рис. 4;      4) рис. 6 (с. 12).

Преобразуйте его в график, заданный уравнением:

а) $y = 0,5f(x)$ ;	ж) $y = f(-x)$ ;
б) $y = f(x - 1)$ ;	з) $y = f( x )$ ;
в) $y = f(x + 2)$ ;	и) $y =  f(x) $ ;
г) $y = f(x) - 2$ ;	к) $ y  = f(x)$ ;
д) $y = f(x) + 1$ ;	л) $y = f(- x )$ ;
е) $y = -f(x)$ ;	м) $y =  f( x ) $ .

Запишите цепочку преобразований и назовите преобразования, которые вы использовали. Какие из полученных графиков задают функцию  $y$ ; функцию  $x$ ?

- 83.** 1) С помощью преобразований постройте график уравнения:

a) $y = - x ;$	e) $ y  =  x + 2 ;$
б) $y =  x + 3 ;$	ж) $ y  +  x  = 4;$
в) $y = 2 -  x ;$	з) $ y  = 4 + 3 x  - x^2;$
г) $y =  x + 3  - 1;$	и) $y = \{ x \};$
д) $ y  =  x - 1 ;$	к) $y = [ x ].$

2) Назовите преобразования, которые вы использовали.

3) Какие из построенных графиков задают функцию  $y$ , функцию  $x$ ?

- 84.** Каким уравнением будет задаваться график, полученный из графика функции  $y = f(x)$ :

- 1) симметрией относительно прямой  $x = 3$ ;
- 2) симметрией относительно прямой  $y = -5$ ;
- 3) уничтожением его части, расположенной справа от оси ординат, и дублированием оставшейся части симметрично относительно оси ординат;
- 4) уничтожением его части, расположенной над осью абсцисс, и дублированием оставшейся части симметрично оси абсцисс;
- 5) симметрией относительно точки  $M(-3; 5)$ ;
- 6)\* уничтожением его частей, расположенных в I, II и IV координатных четвертях и дублированием оставшейся части симметрично относительно осей и начала координат?

Возьмите график функции  $y = x^2 + 2x - 3.$

- 85.** Закрасьте множество точек, координаты которых удовлетворяют неравенству:

1) $(y + 2x)(y - x) \geqslant 0;$	4) $\frac{y -  x }{y + x^2 - 4} \leqslant 0;$
2) $(y - x + 3)(2y + x - 4) < 0;$	5) $\frac{x^2 + y^2 - 4}{y - x^2 + 1} < 0;$
3) $\frac{y - x^2 + 2}{y + x} \geqslant 0;$	6) $\frac{y^2 - x^2 - 2x - 1}{y - x^2 - 2x - 1} > 0.$

- 86.** Закрасьте на координатной плоскости фигуру, координаты точек которой удовлетворяют системе неравенств:

$$1) \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 4, \\ y \geq x^2 - 1; \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} y \leq 4 - x^2, \\ y \leq x + 1, \\ 2y + x \geq 2; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x^2 + (y - 2)^2 \leq 4, \\ y \geq |x|; \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} (x - 1)^2 + y^2 \leq 4, \\ y \leq -x - 1. \end{cases}$$

## ! Контрольные вопросы и задания

- Задайте какую-нибудь функцию, графиком которой является парабола с вершиной в точке  $(-3; 4)$ , ветви которой направлены вниз.
- Задайте аналитически дробно-линейную функцию, асимптотами которой являются прямые  $x = -1$  и  $y = 2$ . Сколько существует таких функций?
- Постройте график функции  $y = \frac{1}{2}x^2 + 2x - 4$  и укажите её свойства.
- Запишите уравнение, график которого, изображённый на рисунке 41, получен с помощью преобразований параболы.




Рис. 41

## СТЕПЕНИ И КОРНИ

Со степенными функциями  $y = x^n$ , где  $n$  — натуральное число, вы познакомились в курсе алгебры основной школы. В этой главе вы сначала повторите основные свойства степенных функций (п. 5), затем от квадратных корней перейдёте к корням натуральной степени  $n$  ( $n \neq 1$ ) и научитесь применять их свойства (п. 6, 7). И, наконец, познакомитесь со степенями, показатели которых — дробные числа (п. 8).

### 5. Степенная функция $y = x^n$ при натуральном $n$

Рассмотрим две степенные функции  $y = x^2$  и  $y = x^3$  и сравним их свойства (рис. 42, 43).

1. Обе эти функции определены и непрерывны на всей числовой прямой.

2. График функции  $y = x^2$  симметричен относительно оси ординат, а график функции  $y = x^3$  симметричен относительно начала координат.

Это свойство можно сформулировать иначе.

При перемене знака аргумента значение функции  $y = x^2$  не изменяется, а значение функции  $y = x^3$  меняет знак.




Рис. 42




Рис. 43




Рис. 44

3. Область значений функции  $y = x^2$  — все неотрицательные числа.

Область значений функции  $y = x^3$  — все действительные числа.

4. Функция  $y = x^2$  убывает на промежутке  $(-\infty; 0]$  и возрастает на промежутке  $[0; +\infty)$ .

Функция  $y = x^3$  возрастает на всей числовой прямой.

На следующем рисунке изображены графики функций  $y = x^n$  при чётном (рис. 44, а) и нечётном (рис. 44, б)  $n$ .

Можно заметить, что при чётных  $n$  свойства степенных функций аналогичны свойствам функции  $y = x^2$ , а при нечётных — функции  $y = x^3$ .

### Свойства функции $y = x^n$

1. Функция  $y = x^n$  определена и непрерывна на всей числовой прямой.

2. График функции  $y = x^n$  при чётном  $n$  симметричен относительно оси ординат, а при нечётном  $n$  симметричен относительно начала координат.

3. Область значений функции  $y = x^n$  при чётном  $n$  — все неотрицательные числа, а при нечётном  $n$  — все действительные числа.

4. Функция  $y = x^n$  при чётном  $n$  убывает на промежутке  $(-\infty; 0]$  и возрастает на промежутке  $[0; +\infty)$ .

Функция  $y = x^n$  при нечётном  $n$  возрастает на всей числовой прямой.

Свойством 2 обладают не только степенные функции, но названия этому свойству дали по степенным функциям.

Функция  $y = f(x)$  называется **чётной**,  
если выполняются два условия:

- 1) для любого значения  $x$  из  $D(f)$   
 $-x$  тоже входит в  $D(f)$ ;
- 2)  $f(-x) = f(x)$ .

Функция  $y = f(x)$  называется **нечётной**,  
если выполняются два условия:

- 1) для любого значения  $x$  из  $D(f)$   
 $-x$  тоже входит в  $D(f)$ ;
- 2)  $f(-x) = -f(x)$ .



**Пример 1.** Доказать, что функция  $y = \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^3-x}$  является нечётной.

Для доказательства нужно проверить выполнение двух условий из определения нечётной функции.

**Доказательство.** 1) Найдём  $D(y)$ . Числитель дроби показывает, что  $-2 \leq x \leq 2$ , а знаменатель, — что  $x \neq 0; \pm 1$ .

Значит,  $D(y) = [-2; -1) \cup (-1; 0) \cup (0; 1) \cup (1; 2]$ . Найденное множество точек числовой прямой *симметрично относительно нуля*, следовательно, вместе с любым числом из этого множества в него входит и противоположное число.

$$2) y(-x) = \frac{\sqrt{4 - (-x)^2}}{(-x)^3 - (-x)} = \frac{\sqrt{4 - x^2}}{-x^3 + x} = -\frac{\sqrt{4 - x^2}}{x^3 - x} = -y(x).$$

Оба условия выполняются, а значит, функция  $y = \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^3-x}$  — нечётная, что и требовалось доказать.



**Пример 2.** Может ли при каком-нибудь значении  $a$  уравнение  $x^8 - 4x^4 - 3ax^2 = 2$  иметь ровно 7 корней?

**Решение.**

1) Многочлен, стоящий в левой части уравнения, при любом значении  $a$  задаёт функцию  $y = x^8 - 4x^4 - 3ax^2$ , определённую на всей числовой прямой. При перемене знака у аргу-

мента значение функции не меняется, значит, эта функция чётная.

**2** Если некоторое, отличное от нуля, значение  $x$  является корнем данного уравнения, т. е. при этом значении  $y(x) = 2$ , то и противоположное ему число также корень этого уравнения:  $y(-x) = 2$ . Следовательно, число *ненулевых* корней уравнения не может быть нечётным.

**3**  $x = 0$  не является корнем данного уравнения, значит, число *всех* его корней не может быть нечётным.

Ответ: число корней данного уравнения ни при каком значении  $a$  не равно 7.

## Упражнения

**87.** Существует ли натуральное  $n$ , при котором график функции  $y = x^n$  проходит через точку:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1) $F(-2; -32)$ ;  | 4) $C\left(-\frac{2}{3}; -\frac{32}{243}\right)$ ; |
| 2) $A(7; 343)$ ;   | 5) $D(-0,2; -0,0000001024)$ ;                      |
| 3) $B(-6; 1296)$ ; | 6) $E(-3; -6561)$ ?                                |

**88.** Каким натуральным числом, кроме 1, может быть показатель степени аргумента функции  $y = x^n$ , если известно, что при некотором целом значении  $x$  значение функции  $y$  равно:

- 1) 4; 2) 8; 3) -8; 4) 16; 5) 81; 6) 64; 7) -64?

**89.** В каких координатных четвертях расположен график функции:

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1) $y = x^{11}$ ;                    | 4) $\textcircled{O} y = (x - 5)^{10}$ ;      |
| 2) $y = x^{16}$ ;                    | 5) $\textcircled{O} y = (x - 4)^{17} - 10$ ; |
| 3) $\textcircled{O} y = (x + 3)^7$ ; | 6) $\textcircled{O} y = (x + 6)^{24} + 1$ ?  |

**90.** Может ли график функции  $y = (x - a)^n + b$  иметь точки во всех координатных четвертях, если:

- 1)  $n$  — чётное натуральное число;  
2)  $n$  — нечётное натуральное число?

Если может, приведите конкретные значения  $a$ ,  $b$  и  $n$ .

**91.** Определите, через какие координатные четверти проходит график функции  $y = k(x - a)^n + b$ , где:

- 1)  $n$  — чётное натуральное число;

2)  $n$  — нечётное натуральное число, причём:

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| a) $k > 0, a > 0, b > 0;$ | д) $k < 0, a > 0, b > 0;$ |
| б) $k > 0, a > 0, b < 0;$ | е) $k < 0, a > 0, b < 0;$ |
| в) $k > 0, a < 0, b > 0;$ | ж) $k < 0, a < 0, b > 0;$ |
| г) $k > 0, a < 0, b < 0;$ | з) $k < 0, a < 0, b < 0.$ |

92. Определите, если возможно, чётным или нечётным числом является показатель степени  $n$  функции  $y = f(x)$ , где  $f(x) = x^n$ , зная, что:

- |                     |                     |                    |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1) $f(-5) > f(-3);$ | 3) $f(-5) < f(-3);$ | 5) $f(5) > f(-3);$ |
| 2) $f(-5) > f(3);$  | 4) $f(-5) < f(3);$  | 6) $f(5) > f(3).$  |

93. Сравните, если возможно, натуральные числа  $m$  и  $n$ , зная, что:

- |   |   |
|---|---|
| 1) $1,3^m < 1,3^n;$   | 4) $(\sqrt{2})^m < (\sqrt{2})^n;$         |
| 2) $0,3^m < 0,3^n;$   | 5) $(\sqrt{3} - 1)^m < (\sqrt{3} - 1)^n;$ |
| 3) $\left(\frac{3}{\pi}\right)^m < \left(\frac{3}{\pi}\right)^n;$ | 6) $(1 - \sqrt{2})^m < (1 - \sqrt{2})^n.$ |

94. 1) С помощью каких преобразований из графика функции  $y = x^n$  можно получить график функции:

- а)  $y = -x^n;$       б)  $y = 0,2x^n?$

2) Можно ли утверждать, что все три функции  $y = x^n$ ,  $y = -x^n$  и  $y = 0,2x^n$  имеют одинаковую чётность (все они чётные или все они нечётные)?

95. Докажите, что функция является чётной:

- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1) $y = 3x^6 - 3x^2 + 7;$     | 3) $y = x^n \cdot x^{n+2} - 4;$   |
| 2) $y = \frac{x^6 + 8}{x^2};$ | 4) $y = \frac{x^{n+1}}{x^{n-1}}.$ |

96. Докажите, что функция является нечётной:

- |                       |                                   |                                 |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1) $y = 3x^5 - 5x^3;$ | 2) $y = \frac{x^6 + 8}{x^3 - x};$ | 3) $y = x^n \cdot x^{n+1} - x.$ |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|

97. 1) Является ли функция чётной, нечётной или она не является ни чётной, ни нечётной:

- |   |   |
|---|---|
| а) $y = \begin{cases} -x^2 & \text{при } x < 0, \\ x^2 & \text{при } x \geq 0; \end{cases}$ | в) $y = \begin{cases} -(x+1)^2 & \text{при } x < 0, \\ (x-1)^2 & \text{при } x > 0; \end{cases}$    |
| б) $y = \begin{cases} -x^3 & \text{при } x < 0, \\ x^3 & \text{при } x \geq 0; \end{cases}$ | г) $y = \begin{cases} (x+1)^2 & \text{при } x < 1, \\ -(x-1)^2 & \text{при } x \geq 1? \end{cases}$ |

2) Постройте графики этих функций. Какая из функций имеет точку разрыва?

98. Представьте функцию в виде суммы чётной и нечётной функций:

$$1) y = 4x^6 + 5x - 4;$$

$$2) y = \frac{|x| - 2x^3}{x^6 - 1}.$$

99. Является ли: 1) сумма; 2) разность; 3) произведение; 4) частное чётной и нечётной функций с одинаковыми областями определения: а) чётной; б) нечётной функцией?

100. 1) На рисунке 45 изображена часть параболы. Дополните её так, чтобы получившийся график задавал:

а) чётную функцию; б) нечётную функцию.

- 2) Задайте эту функцию формулой или кусочно и укажите промежутки её возрастания и убывания. Имеет ли эта функция точку разрыва?

101. Может ли при каком-нибудь значении  $a$  уравнение:

$$1) 2x^6 - x^4 + ax^2 = 1 \text{ иметь ровно три корня};$$

$$2) ax^8 - 5x^6 + 4x^4 - x^2 = 8 \text{ иметь ровно пять корней};$$

$$3) ax^7 - 6x^5 + 3x^3 - x = -2 \text{ иметь ровно три корня?}$$




Рис. 45

### ! Контрольные вопросы и задания

- Назовите свойства, общие для всех функций  $y = x^n$ , где  $n$  — натуральное число.
- Назовите свойства функций  $y = x^n$ , различные для чётных и нечётных  $n$ .
- Можно ли сделать вывод о том, что  $m > n$ , зная, что при некотором положительном  $a$  верно неравенство  $a^m > a^n$ ? Укажите все положительные значения  $a$ , при которых этот вывод верен.
- Является ли функция  $y = 5x^5 - 3x^2 + x - 1$  чётной, нечётной или она не является ни чётной, ни нечётной?

## 6. Понятие корня $n$ -й степени

По графику функции  $y = x^2$  для любого положительного числа  $a$  можно найти числа, квадраты которых равны  $a$ . Эти числа называют квадратными корнями из  $a$  (рис. 46, а).




Рис. 46

По графику функции  $y = x^3$  для любого числа  $a$  можно найти такое число  $b$ , что  $b^3 = a$  (рис. 46, б). Это число называют *кубическим корнем из  $a$*  или *корнем третьей степени из  $a$* .

Вообще, по графику функции  $y = x^n$  можно найти число,  $n$ -я степень которого известна.

**Число,  $n$ -я степень которого равна  $a$ , называют  
корнем  $n$ -й степени из  $a$ .**

Так, корнем пятой степени из числа  $-32$  является число  $-2$ , так как  $(-2)^5 = -32$ , а корнями четвёртой степени из числа  $16$  являются противоположные числа  $2$  и  $-2$ , так как  $2^4 = (-2)^4 = 16$ .

При любом  $a$  прямая  $y = a$  имеет с графиком функции  $y = x^n$ , где  $n$  — нечётное натуральное число, отличное от  $1$ , одну общую точку (рис. 47, а), абсцисса которой является корнем  $n$ -й степени из  $a$ . Этот корень обозначают  $\sqrt[n]{a}$  (читается: корень  $n$ -й степени из  $a$ ).




Рис. 47

При любом положительном  $a$  прямая  $y = a$  имеет с графиком функции  $y = x^n$ , где  $n$  — чётное натуральное число, две общие точки (рис. 47, б), абсциссы которых являются корнями  $n$ -й степени из  $a$ . Один из этих корней положителен, его обозначают  $\sqrt[n]{a}$ , другой — противоположное ему число, т. е.  $-\sqrt[n]{a}$ .

Корень чётной степени из 0 равен 0 ( $0^n = 0$  при любом натуральном  $n$ ):

$$\sqrt[n]{0} = 0.$$

Любое число, возведённое в степень с чётным натуральным показателем, неотрицательно, следовательно, не существует корня чётной степени из отрицательного числа.

В записи  $\sqrt[n]{a}$   $a$  называют *подкоренным числом* или *подкоренным выражением*, а  $n$  — *показателем степени корня*.

При записи квадратных корней показатель степени корня не указывают.

В зависимости от чётности или нечётности  $n$  выражение  $\sqrt[n]{a}$  имеет или не имеет смысл при отрицательных  $a$ . Из-за этого при проведении общих рассуждений относительно корней  $n$ -й степени приходится рассматривать два случая. Естественно поэтому при рассмотрении свойств ограничиться корнями из неотрицательных чисел — арифметическими корнями  $n$ -й степени. А корни нечётной степени из отрицательных чисел, которые при этом как бы остаются «за бортом», можно будет всегда выразить через арифметические:

$\sqrt[n]{-a} = -\sqrt[n]{a}$ , где  $n$  — нечётное число,  $a > 0$ . Это следует, например, из симметрии точек  $A$  и  $A_1$  графика функции  $y = x^n$  относительно начала координат (рис. 48). Так, например,  $\sqrt[7]{-11} = -\sqrt[7]{11}$ .

Формула  $y = \sqrt[n]{x}$  задаёт  $y$  как функцию  $x$ .

Для решения *обратной* задачи — нахождения значения переменной  $x$  по заданному значению  $y$  из этой формулы можно выразить переменную  $x$  как функцию переменной  $y$ :  $x = y^n$ .




Рис. 48

Равенствам  $x = y^n$  и  $y = \sqrt[n]{x}$  удовлетворяют координаты одних и тех же точек (мы продолжаем рассматривать только неотрицательные значения  $x$  и  $y$ ).

Другими словами, функции  $y = \sqrt[n]{x}$  и  $x = y^n$  имеют один и тот же график.

И этот график можно получить, преобразовав график функции  $y = x^n$ .

Рассмотрим степенные функции  $y = x^n$  и  $x = y^n$  при  $x \geq 0$ ,  $y \geq 0$  (напомним, что аргументом второй функции является переменная  $y$ ). Пусть точка  $M(a; b)$  принадлежит графику функции  $y = x^n$ , тогда  $b = a^n$ . Но из этого же равенства следует, что точка  $N(b; a)$  принадлежит графику функции  $x = y^n$ . Прямая  $y = x$  проходит через противоположные вершины квадрата с диагональю  $MN$  (рис. 49) и, значит, является его осью симметрии. Следовательно, точки  $M(a; b)$  и  $N(b; a)$  симметричны относительно прямой  $y = x$ .

Аналогично можно показать, что любой точке графика функции  $x = y^n$  соответствует симметричная ей относительно прямой  $y = x$  точка графика функции  $y = x^n$  (рис. 50).

Таким образом, графики функций  $y = x^n$  и  $y = \sqrt[n]{x}$  (напомним, что функции  $y = \sqrt[n]{x}$  и  $x = y^n$  имеют один и тот же график) симметричны относительно прямой  $y = x$ . В дальнейшем встретятся и другие пары функций с симметричными относительно прямой  $y = x$  графиками.

Функции  $y = f(x)$  и  $y = \varphi(x)$ , графики которых симметричны относительно прямой  $y = x$ , называют **взаимно обратными**, а каждую из таких функций — **обратимой**.




Рис. 49




Рис. 50

Рассматривая схематические графики взаимно обратных функций  $y = x^n$  и  $y = \sqrt[n]{x}$ , изображённые на рисунке 50, можно сформулировать некоторые свойства функции  $y = \sqrt[n]{x}$ .




Рис. 51

### Свойства функции $y = \sqrt[n]{x}$ , $x \geq 0$

- Функция возрастает, так как точка графика с большей абсциссой имеет и большую ординату.
- График функции проходит через точки с координатами  $(0; 0)$  и  $(1; 1)$ .
- Из симметрии графиков функций  $y = x^n$  и  $y = \sqrt[n]{x}$  следует, что значения функции  $y = \sqrt[n]{x}$  могут быть как угодно велики.

На рисунке 51 изображены графики функций  $y = \sqrt[n]{x}$  при  $x \geq 0$  для  $n$ , равных: 2; 3 и 4.

Можно заметить, что график той из функций  $y = \sqrt[n]{x}$ , у которой показатель степени корня  $n$  больше, на промежутке  $(0; 1)$  находится выше, а на промежутке  $(1; +\infty)$  — ниже других.

**Пример 1.** Решить неравенство  $\frac{\sqrt[8]{x^2 - 25}}{\sqrt{x+6} - 2} < 0$ .

**Решение.** Подкоренные выражения должны быть неотрицательны:

$$\begin{cases} x^2 - 25 \geq 0, \\ x + 6 \geq 0, \end{cases} \quad \begin{cases} x \leq -5 \text{ или } x \geq 5, \\ x \geq -6, \end{cases} \quad -6 \leq x \leq -5 \text{ или } x \geq 5.$$

При  $-6 \leq x < -5$  или  $x > 5$  числитель дроби положителен. Найдём нули знаменателя:

$$\sqrt{x+6} - 2 = 0, \quad \sqrt{x+6} = 2, \quad x+6 = 4, \quad x = -2.$$

При  $x > -2$  значения знаменателя положительны, а при  $-6 \leq x < -2$  — отрицательны. Значит, при  $x > 5$  дробь принимает положительные значения, а при  $-6 \leq x < -5$  — отрицательные (рис. 52).

Ответ:  $-6 \leq x < -5$ .




Рис. 52



**Пример 2.** Решить уравнение  $\sqrt{2x+3} + \sqrt{x-2} = 4$ .

**Примечание.** Уравнения, в которых неизвестное стоит под знаком радикала, называют *иррациональными*. Обычный способ решения — избавиться от радикалов, возводя обе части уравнения в степень. Однако при этом следует иметь в виду, что при возведении в чётную степень могут появиться лишние, так называемые *посторонние*, корни. Так, например, возводя в квадрат уравнение  $\sqrt{x} = -1$ , не имеющее корней, мы получим уравнение  $x = 1$ , корень которого не является корнем исходного уравнения — посторонний корень.

**Решение.** Перед тем как возводить данное уравнение в квадрат, полезно разнести радикалы по разным частям уравнения:

$$\sqrt{2x+3} + \sqrt{x-2} = 4, \quad \sqrt{2x+3} = 4 - \sqrt{x-2},$$

$$2x+3 = 16 + x - 2 - 8\sqrt{x-2}, \quad 8\sqrt{x-2} = 11 - x.$$

Ещё раз возводим в квадрат:

$$64(x-2) = 121 + x^2 - 22x, \quad x^2 - 86x + 249 = 0, \quad x_1 = 3, \quad x_2 = 83.$$

Теперь следует проверить, являются ли найденные числа корнями исходного уравнения, т. е. нет ли среди найденных корней посторонних.

**Проверка.** 1) Если  $x = 3$ , то  $\sqrt{2 \cdot (3+3)} + \sqrt{3-2} = 4$  — верно.

2) Если  $x = 83$ , то  $\sqrt{2 \cdot (83+3)} + \sqrt{83-2} = 4$  — неверно (так как уже первый корень больше 4).

Ответ: 3.

**Примечание.** Можно было найти подбором корень  $x = 3$ , и, поскольку левая часть уравнения задаёт возрастающую функцию, сделать вывод об отсутствии других корней.

**Пример 3.** Решить иррациональное неравенство

$$\sqrt{x^2 + x - 12} > x.$$

**Решение.** Здесь также нужно избавиться от радикала. Однако в отличие от уравнений, при решении которых находят всего несколько чисел, решение неравенств обычно приводит к бесконечному множеству значений переменной и проверить их все невозможно.

Будем рассуждать иначе. Заметим, что, когда правая часть данного неравенства отрицательна, неравенство верно, если, конечно, оно при этом имеет смысл. Значит, все решения системы  $\begin{cases} x < 0, \\ x^2 + x - 12 \geqslant 0 \end{cases}$  являются решениями данного неравенства.

Если же правая часть неравенства неотрицательна, то неравенство можно возвести в квадрат (по свойствам неравенств с неотрицательными частями):

$$\begin{cases} x \geqslant 0, \\ x^2 + x - 12 > x^2. \end{cases}$$

Таким образом, всё множество решений исходного неравенства является объединением решений двух систем.

$$\begin{cases} x < 0, \\ x^2 + x - 12 \geqslant 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x \geqslant 0, \\ x^2 + x - 12 > x^2. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < 0, \\ x \leqslant -4 \text{ или } x \geqslant 3 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x \geqslant 0, \\ x > 12, \end{cases}$$

$$x \leqslant -4 \text{ или } x > 12.$$

Ответ:  $x \leqslant -4, x > 12$ .

**Примечание.** Свойства неравенств с положительными членами удобно использовать и при решении иррациональных уравнений, особенно когда проверка корней трубоёмка. На основании соответствующего свойства неравенств или определения квадратного корня, при решении уравнения вида  $\sqrt{f(x)} = g(x)$  достаточно проверить, что  $g(x) \geqslant 0$ .

## Упражнения

**102.** Верно ли, что:

- 1) число  $-3$  является корнем четвёртой степени из числа  $81$ ;

- 2) число  $\frac{1}{2}$  является корнем третьей степени из числа  $\frac{1}{8}$ ;  
 3) число 0,1 является корнем шестой степени из числа 0,000001;  
 4) число -10 является корнем пятой степени из числа -100 000?

**103.** Найдите корни уравнения:

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1) $x^2 = 10$ ;       | 6) $(3x - 2)^5 = -32$ ;          |
| 2) $x^3 = 16$ ;       | 7) $(5 - 3x)^6 = \frac{1}{64}$ ; |
| 3) $x^5 = -43$ ;      | 8) $(5x + 7)^4 = 81$ ;           |
| 4) $x^8 = 15$ ;       | 9) $(x^2 - 5x + 2)^6 = 64$ ;     |
| 5) $(3 - 2x)^3 = 8$ ; | 10) $(9x - x^2 - 4)^4 = 256$ .   |

**104.** С помощью графика функции  $y = x^3$  найдите приближённые значения кубических корней из чисел:

- 1) 5;    2) -7;    3) 4,7;    4) -6,5.

**105.** Выясните с помощью графика, сколько корней имеет уравнение, и найдите приближённые значения этих корней:

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1) $\sqrt{x} - 6 = -x^2$ ;   | 3) $\sqrt{x+1} = x^2 - 7$ ; |
| 2) $\sqrt[3]{x} = (x-1)^2$ ; | 4) $x^3 - 1 = \sqrt{x+1}$ . |

**106.** Решите графически неравенство:

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1) $\sqrt{x} \geqslant x$ ; | 3) $\sqrt{x} \geqslant 2x - 1$ ; |
| 2) $\sqrt{x} < x$ ;         | 4) $x^2 \leqslant \sqrt{x}$ .    |

**107.** Принадлежит ли графику функции  $y = \sqrt[3]{x}$  точка:

- 1) A(3,375; 1,5);    2) B(-0,125; -0,5);    3) C(-343; -7)?

**108.** Данна функция  $y = \sqrt[n]{x}$ . Найдите  $n$ , если график функции проходит через точку:

- 1) A(-0,00032; -0,2);    2) B(2187; 3).

**109.** Каким натуральным числом может быть  $n$  — показатель степени корня у функции  $y = \sqrt[n]{x}$ , если известно, что  $y$  принимает натуральное значение, когда аргумент  $x$  равен:

- 1) 4;    2) 8;    3) 27;    4) 16;    5) 81;    6) 64;    7) 1024?

- 110.** Сравните натуральные числа  $m$  и  $n$ , зная, что:

- 1)  $\sqrt[m]{1,7} < \sqrt[n]{1,7}$ ;
- 2)  $\sqrt[m]{0,7} < \sqrt[n]{0,7}$ ;
- 3)  $\sqrt[m]{\frac{1}{\sqrt{2}}} < \sqrt[n]{\frac{1}{\sqrt{2}}}$ ;
- 4)  $\sqrt[m]{\frac{\sqrt{10}}{\pi}} < \sqrt[n]{\frac{\sqrt{10}}{\pi}}$ ;
- 5)  $\sqrt[m]{\pi - 3} < \sqrt[n]{\pi - 3}$ ;
- 6)  $\sqrt[m]{\pi - 4} < \sqrt[n]{\pi - 4}$ .




Рис. 53

- 111.** 1) Задайте функцию, обратную функции:

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| a) $y = x$ ;           | b) $y = 2x - 1$ ;           |
| б) $y = \frac{1}{x}$ ; | г) $y = 5 - \frac{2}{3}x$ . |

2) Как связаны коэффициенты  $k_1$  и  $k_2$  взаимно обратных линейных функций  $y = k_1x + l$  и  $y = k_2x + m$ ?

- 112.** Если функция  $y = f(x)$ , заданная рисунком 53, обратима, перерисуйте в тетрадь её график и в той же системе координат изобразите график обратной ей функции  $y = g(x)$ .

- 113.** Имеет ли смысл выражение:

- |                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1) $\sqrt[4]{10}$ ;  | 5) $\sqrt[3]{-15}$ ;              |
| 2) $\sqrt[6]{18}$ ;  | 6) $\sqrt[5]{-5}$ ;               |
| 3) $\sqrt[4]{-25}$ ; | 7) $\sqrt[4]{5 - \sqrt{22}}$ ;    |
| 4) $\sqrt[6]{-8}$ ;  | 8) $\sqrt[12]{7 - (5)\sqrt{2}}$ ? |

- 114.** Выразите через арифметические корни те из корней, которые арифметическими не являются:

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1) $\sqrt[3]{-7}$ ;           | 5) $\sqrt[9]{-1 - a^2}$ ;        |
| 2) $\sqrt[5]{-6}$ ;           | 6) $\sqrt[5]{-(4 + 4b - b^2)}$ ; |
| 3) $\sqrt[5]{1 - \sqrt{2}}$ ; | 7) $\sqrt[7]{x^2 + x + 1}$ ;     |
| 4) $\sqrt[3]{3 - \sqrt{5}}$ ; | 8) $\sqrt[9]{-(c^2 + 5c - 7)}$ . |

**115.** При каких значениях  $x$  имеет смысл выражение:

- |                                 |                           |                                  |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1) $\sqrt[6]{x}$ ;              | 4) $\sqrt[14]{2x - 5}$ ;  | 7) $\sqrt[6]{4x^2 - 1}$ ;        |
| 2) $\sqrt[10]{x^2}$ ;           | 5) $\sqrt[7]{3 + 6x}$ ;   | 8) $\sqrt[8]{x^2 - x - 90}$ ;    |
| 3) $\sqrt[12]{\frac{1}{x^2}}$ ; | 6) $\sqrt[4]{25 - x^2}$ ; | 9) $\sqrt[16]{20x - x^2 + 96}$ ? |

**116.** При каких значениях  $x$  не имеет смысла выражение:

- |                                |                                    |   |
|--------------------------------|------------------------------------|---|
| 1) $\frac{1}{\sqrt[4]{x-2}}$ ; | 3) $\frac{\sqrt[8]{x}}{x^2 - 4}$ ; | 5) $\frac{\sqrt[10]{x^2 - 25}}{x + 13}$ ; |
| 2) $\frac{5}{\sqrt[5]{x+3}}$ ; | 4) $\frac{\sqrt[4]{x+3}}{9-x^2}$ ; | 6) $\frac{\sqrt[10]{49-x^2}}{x+3}$ ?      |

**117.** Решите уравнение:

- |                                  |                             |                              |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1) $\sqrt[4]{x} = \frac{2}{3}$ ; | 3) $\sqrt[4]{2x+1} = 0,2$ ; | 5) $\sqrt[5]{x^2+7} = 2$ ;   |
| 2) $\sqrt[5]{x} = \frac{1}{2}$ ; | 4) $\sqrt[3]{2-5x} = 0,6$ ; | 6) $\sqrt[3]{x^3+37} = -3$ . |

**118.** Решите уравнение:

- |                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) $\sqrt{3x^2 + 5x + 6} = 1 - x$ ;   | 5) $\sqrt{x+6} - \sqrt{x} = 1$ ;    |
| 2) $\sqrt{3x^2 + 7x + 6} = x - 1$ ;   | 6) $\sqrt{x} + \sqrt{13-x} = 5$ ;   |
| 3) $\sqrt{9x^2 + 16x} = 2x + 3$ ;     | 7) $\sqrt{3x+7} - \sqrt{x+1} = 2$ ; |
| 4) $\sqrt{5x^2 - 15x - 1} = 3 - 2x$ ; | 8) $\sqrt{15-x} + \sqrt{3-x} = 6$ . |

**119.** Решите неравенство:

$$1) \frac{x-7}{\sqrt{4x^2-19x+12}} \leqslant 0; \quad 2) \frac{\sqrt{17-15x-2x^2}}{x+3} \geqslant 0.$$

**120.** Решите неравенство:

- |                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1) $\sqrt{9x-20} > x$ ;          | 5) $\sqrt{x^2-x-12} < x$ ;            |
| 2) $\sqrt{2x+15} \geqslant x$ ;  | 6) $\sqrt{13+8x-5x^2} \leqslant 4x$ ; |
| 3) $x+2 < \sqrt{4+5x}$ ;         | 7) $\sqrt{5x^2+x} \geqslant 3x-1$ ;   |
| 4) $x-1 \geqslant \sqrt{3x+7}$ ; | 8) $\sqrt{10x^2+9x} > x+2$ .          |

## ! Контрольные вопросы и задания

- Что означает запись  $\sqrt[n]{a}$ ?
- Почему при решении иррациональных уравнений необходимо делать проверку корней?
- Решите иррациональное уравнение  $\sqrt{11 - 2x} = 4 - x$ . Объясните, почему при проверке корней достаточно было бы убедиться, что  $4 - x \geq 0$ .
- К решению каких систем сводится решение иррационального неравенства  $\sqrt{f(x)} > g(x)$ ?

## 7. Свойства арифметических корней

Вы знакомы со свойствами квадратных корней. Аналогичными свойствами обладают и арифметические корни  $n$ -й степени.

### Свойства арифметических корней

Свойства	Квадратные корни	Корни $n$ -й степени
1	$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$	$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
2	$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$	$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$
3	$\sqrt{a^m} = (\sqrt{a})^m$	$\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$

По определению арифметического корня  $n$ -й степени для любого неотрицательного числа  $a$

$$(\sqrt[n]{a})^n = a.$$

Следовательно, чтобы убедиться в справедливости равенства  $\sqrt[n]{x} = y$ , где  $\sqrt[n]{x}$  — арифметический корень  $n$ -й степени, нужно проверить выполнение двух условий:

1)  $y \geq 0$  и 2)  $y^n = x$ .

Докажем, например, что  $\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$ .

Должно быть: 1)  $(\sqrt[n]{a})^m \geq 0$  и 2)  $((\sqrt[n]{a})^m)^n = a^m$ .

1)  $\sqrt[n]{a} \geqslant 0$ , как арифметический корень, значит, и  $(\sqrt[n]{a})^m \geqslant 0$ . (Заметим, что если  $m$  — целое отрицательное число или 0, то число  $a$  должно быть положительным.)

$$2) ((\sqrt[n]{a})^m)^n = (\sqrt[n]{a})^{mn} = ((\sqrt[n]{a})^n)^m = a^m.$$

Оба условия выполняются, значит, верно равенство

$$\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m.$$

Приведём примеры использования свойств арифметических корней.

**Пример 1.** Вынести множитель из-под знака корня

$$\sqrt[3]{8a^5}.$$

**Решение.**

$$\sqrt[3]{8a^5} = \sqrt[3]{8a^3 \cdot a^2} = \sqrt[3]{8a^3} \cdot \sqrt[3]{a^2} = \sqrt[3]{(2a)^3} \cdot \sqrt[3]{a^2} = 2a \sqrt[3]{a^2}.$$

**Пример 2.** Упростить выражение

$$(\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{a})^2 - \sqrt[3]{x^2} \cdot (\sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{a}).$$

**Решение.** Раскроем скобки и приведём подобные слагаемые:

$$\begin{aligned} & (\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{a})^2 - \sqrt[3]{x^2} \cdot (\sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{a}) = \\ & = \sqrt[3]{x^4} + \sqrt[3]{a^2} - 2\sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{x^4} + 2\sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt[3]{a} = \sqrt[3]{a^2}. \end{aligned}$$

**Пример 3.** Сравнить  $2\sqrt[3]{5}$  и  $\frac{1}{2}\sqrt[3]{300}$ .

**Решение.**  $2\sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{2^3} \cdot \sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 5} = \sqrt[3]{40}$ ;

$$\frac{1}{2}\sqrt[3]{300} = \sqrt[3]{\left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \sqrt[3]{300}} = \sqrt[3]{\frac{1}{8} \cdot 300} = \sqrt[3]{37,5}.$$

Функция  $y = \sqrt[n]{x}$  возрастающая, т. е. большему подкоренному числу соответствует большее значение корня:  $40 > 37,5$ , следовательно,  $\sqrt[3]{40} > \sqrt[3]{37,5}$ .

Ответ:  $2\sqrt[3]{5} > \frac{1}{2}\sqrt[3]{300}$ .

Свойства 1—3 используются для преобразования арифметических корней одной и той же степени. Однако в одном выражении могут оказаться корни разных степеней.

Арифметические корни различных степеней связывают следующие два свойства.

$$4. \sqrt[nk]{a} = \sqrt[n]{\sqrt[k]{a}}.$$

$$5. \sqrt[nk]{a^m} = \sqrt[n]{a^m}.$$

Докажем свойство 5. Должно быть:

$$1) \sqrt[n]{a^m} \geq 0 \text{ и } 2) (\sqrt[n]{a^m})^{nk} = a^{mk}.$$

1)  $\sqrt[n]{a^m} \geq 0$ , как арифметический корень;

$$2) (\sqrt[n]{a^m})^{nk} = ((\sqrt[n]{a^m})^n)^k = (a^m)^k = a^{mk}.$$

**Примечание.** Если показатель степени подкоренного выражения делится на показатель степени корня, то свойство 5 записывается так:  $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ .

$$\text{Например, } \sqrt[7]{3^{28}} = 3^{\frac{28}{7}} = 3^4 = 81.$$

**Пример 4.** Упростить выражение  $\sqrt[7]{a^2 \cdot \sqrt[3]{a}}$ .

**Решение.** Внесём  $a^2$  под знак кубического корня:

$$\sqrt[7]{a^2 \cdot \sqrt[3]{a}} = \sqrt[7]{\sqrt[3]{(a^2)^3 \cdot a}}.$$

Применим свойство 4 и упростим подкоренное выражение:

$$\sqrt[7]{\sqrt[3]{(a^2)^3 \cdot a}} = \sqrt[21]{a^6 \cdot a} = \sqrt[21]{a^7}.$$

Применим свойство 5 (сократим показатель степени корня и показатель степени подкоренного выражения):

$$\sqrt[21]{a^7} = \sqrt[3]{\sqrt[7]{a^7}} = \sqrt[3]{a}.$$

Ответ:  $\sqrt[7]{a^2 \cdot \sqrt[3]{a}} = \sqrt[3]{a}$ .

**Пример 5.** Представить в виде корня из числа выражение

$$\frac{\sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[4]{2}}{\sqrt[6]{6}}.$$

**Решение.** Приведём данные корни к одному и тому же показателю степени. Наиболее простым общим показателем является наименьшее общее кратное показателей степеней корней — число 12.

$$\sqrt[3]{3} = \sqrt[12]{3^4}; \quad \sqrt[4]{2} = \sqrt[12]{2^3}; \quad \sqrt[6]{6} = \sqrt[12]{6^2}.$$

Таким образом,

$$\frac{\sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[4]{2}}{\sqrt[6]{6}} = \frac{\sqrt[12]{3^4} \cdot \sqrt[12]{2^3}}{\sqrt[12]{6^2}} = \sqrt[12]{\frac{3^4 \cdot 2^3}{6^2}} = \sqrt[12]{\frac{3^4 \cdot 2^3}{3^2 \cdot 2^2}} = \sqrt[12]{3^2 \cdot 2} = \sqrt[12]{18}.$$

## Упражнения

**121.** Докажите, что для арифметических корней верно равенство  $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ .

**122.** Вычислите:

1)  $\sqrt{25 \cdot 81}$ ;

7)  $\sqrt[4]{125 \cdot 405}$ ;

2)  $\sqrt{49 \cdot 0,16}$ ;

8)  $\sqrt[4]{32 \cdot 648}$ ;

3)  $\sqrt[3]{\frac{5}{36}} : \sqrt[3]{\frac{6}{25}}$ ;

9)  $\sqrt{1,6 \cdot 12,1}$ ;

4)  $\sqrt[3]{8 \cdot 27}$ ;

10)  $\sqrt[3]{1,25 \cdot 6,4}$ ;

5)  $\sqrt[3]{250 \cdot 32}$ ;

11)  $\sqrt[3]{7 - \sqrt{22}} \cdot \sqrt[3]{7 + \sqrt{22}}$ ;

6)  $\sqrt[5]{\frac{27}{125}} \cdot \sqrt[5]{\frac{9}{25}}$ ;

12)  $\sqrt[3]{5 - 2\sqrt{6}} \cdot \sqrt[3]{5 + 2\sqrt{6}}$ .

**123.** Вынесите множитель из-под знака корня:

1)  $\sqrt[11]{2^{12}}$ ;

4)  $\sqrt[4]{b^9}$ ;

7)  $\sqrt[4]{-a^5}$ ;

2)  $\sqrt[4]{2^{15}}$ ;

5)  $\sqrt[5]{a^6 b^{11}}$ ;

8)  $\sqrt[6]{-128a^{13}b^{14}}$ ;

3)  $\sqrt[3]{a^4}$ ;

6)  $\sqrt[3]{32x^{16}b^{10}}$ ;

9)  $\sqrt[5]{64x^{12}y^{10}}$ .

**124.** Представьте в виде корня с меньшим показателем:

1)  $\sqrt[4]{4}$ ;

4)  $\sqrt[30]{8b^6}$ ;

7)  $\sqrt[4]{(2 - \sqrt{5})^2}$ ;

2)  $\sqrt[6]{27}$ ;

5)  $\sqrt[6]{64x^3}$ ;

8)  $\sqrt[6]{(2\sqrt{6} - 5)^2}$ ;

3)  $\sqrt[12]{16a^4}$ ;

6)  $\sqrt[12]{16a^4}$ ;

9)  $\sqrt[8]{(3\sqrt{5} - 7)^4}$ .

**125.** Запишите с одним знаком радикала:

1)  $\sqrt[3]{\sqrt{a}}$  ;

3)  $\sqrt{a^3 \sqrt{a}}$  ;

5)  $\sqrt[4]{\frac{1}{x^3} \cdot \sqrt[3]{x}}$  ;

2)  $\sqrt[3]{a \sqrt{a}}$  ;

4)  $\sqrt[5]{b^2 \sqrt{b}}$  ;

6)  $\sqrt[5]{\frac{1}{a^3} \cdot \sqrt[3]{\frac{1}{a}}}$  .

**126.** Сравните:

1)  $\sqrt{3}$ ,  $\sqrt[3]{5}$  и  $\sqrt[4]{8}$  ;

3)  $\sqrt{3 \sqrt[3]{3}}$  и  $\sqrt[3]{3 \sqrt{3}}$  ;

2)  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt[4]{5}$  и  $\sqrt[3]{3}$  ;

4)  $\sqrt[4]{8 \sqrt{2}}$  и  $\sqrt{2 \sqrt[4]{8}}$  .

**127.** Представьте в виде корня:

1)  $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[6]{0,5}$  ;

4)  $\sqrt[6]{2,5} : \sqrt[4]{0,5}$  ;

2)  $\sqrt[6]{6} \cdot \sqrt[4]{\frac{1}{12}}$  ;

5)  $\sqrt[12]{0,5} \cdot \sqrt[3]{25} \cdot \sqrt[4]{0,008}$  ;

3)  $\sqrt[8]{1,5} : \sqrt[12]{3}$  ;

6)  $\sqrt[5]{0,6} : \sqrt[10]{9} \cdot \sqrt[4]{10}$  .

**128.** Решите уравнение:

1)  $\sqrt{x^2 + 32} - \sqrt[4]{x^2 + 32} = 3$  ;

2)  $\sqrt[3]{3x^4 + 16} - \sqrt[6]{3x^4 + 16} = 2$  ;

3)  $x^2 + \sqrt{x^2 + 20} = 22$  ;

4)  $x^2 + 3x - 18 + 4\sqrt{x^2 + 3x - 6} = 0$  ;

5)  $\sqrt[4]{x^3 + 1} - \frac{6}{\sqrt[4]{x^3 + 1}} = 1$  ;

6)  $\frac{4}{\sqrt[3]{x+2}} + \frac{\sqrt[3]{x+3}}{5} = 2$  .

**129.** 1) Докажите формулу «сложного радикала»

$$\sqrt{a \pm \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} \pm \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}} .$$

2) С помощью этой формулы упростите выражение:

а)  $\sqrt{\frac{17 + \sqrt{145}}{2}} - \sqrt{\frac{17 - \sqrt{145}}{2}}$  ;      б)  $\sqrt{6 + 2\sqrt{5}} + \sqrt{6 - 2\sqrt{5}}$  .

**130.** Не решая уравнения:

1)  $\sqrt{26-x} - \sqrt{12-x} = 2$ , найдите значение выражения  $\sqrt{26-x} + \sqrt{12-x}$  ;

2)  $\sqrt{5x+39} + \sqrt{5x-8} = 10$ , найдите значение выражения  $\sqrt{5x+39} - \sqrt{5x-8}$ .

**131.** Решите уравнение:

$$1) \sqrt[3]{1+\sqrt{x}} + \sqrt[3]{1-\sqrt{x}} = 2; \quad 2) \sqrt[3]{x+10} - \sqrt[3]{x-9} = 1.$$

**132.** Решите систему уравнений:

$$1) \textcircled{O} \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{y}} = \frac{4}{3}, \\ xy = 9; \end{cases}$$

$$2) \textcircled{O} \begin{cases} 2(\sqrt{x} + \sqrt{y}) = 3\sqrt{xy}, \\ x + y = 5; \end{cases}$$

$$3) \textcircled{O} \begin{cases} \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} = 4, \\ x + y = 28; \end{cases}$$

$$4) \textcircled{O} \begin{cases} \sqrt[3]{x}\sqrt{y} + \sqrt[3]{y}\sqrt{x} = 12, \\ xy = 64. \end{cases}$$

**133.** Найдите все значения  $a$ , при которых уравнение имеет единственный корень:

$$1) \textcircled{O} \sqrt[3]{x+\sqrt{x}} + 4\sqrt[6]{x+\sqrt{x}} + a = 0;$$

$$2) \textcircled{*} 2z + \sqrt[4]{z} - 3\sqrt{2z + \sqrt[4]{z+1}} + a + 1 = 0.$$

**134.** Упростите выражение, считая, что переменные принимают только положительные значения:

$$1) \sqrt[10]{\frac{a^4}{b^7}} : \sqrt[15]{\frac{a^6}{b^{10}}};$$

$$4) \sqrt[5]{\frac{4x^3}{a^2}} : \left( x \sqrt[5]{\frac{2}{ax}} \right);$$

$$2) \sqrt[4]{\frac{a^2b}{9}} \cdot \sqrt[3]{\frac{3}{ab}};$$

$$5) \sqrt[3]{a^2\sqrt{a}} \cdot \sqrt[4]{\sqrt[3]{\frac{1}{a}}};$$

$$3) \frac{1}{a} \sqrt[3]{\frac{4a^2}{b}} \cdot \sqrt{\frac{ab}{2}};$$

$$6) \sqrt{x^3\sqrt{x^2}} : \sqrt[5]{x^4 \cdot \sqrt[4]{x}}.$$

**135.** Вычислите:

$$1) \sqrt[3]{1-\sqrt{2}} \cdot \sqrt[6]{3+2\sqrt{2}};$$

$$2) \sqrt[10]{7+4\sqrt{3}} \cdot \sqrt[5]{\sqrt{3}-2}.$$

## ! Контрольные вопросы и задания

- Докажите, что для арифметических корней верно равенство  $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$ , где  $a \geq 0, b > 0$ .
- Вычислите  $\sqrt{\frac{3}{2}} \cdot \sqrt[3]{\frac{3}{2}} \cdot \sqrt[6]{96}$ .
- Сравните  $\sqrt[3]{23}$  и  $2\sqrt{2}$ .

## 8. Степень с рациональным показателем

Равенство  $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$  в случае, когда  $m$  делится на  $n$  (т. е. число  $\frac{m}{n}$  — целое), позволяет заменить арифметический корень степенью:  $\sqrt[3]{3^9} = 3^3 = 3^3$ ,  $\sqrt{5^8} = 5^2 = 5^4$ ,  $\sqrt[5]{2^{-10}} = 2^{-\frac{10}{5}} = 2^{-2}$  и т. п. Если же целое число  $m$  не делится на натуральное число  $n$ , то число  $\frac{m}{n}$  является дробным.

Определим степень с дробным показателем с помощью равенства  $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ .

### Степень с рациональным показателем

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m},$$

где  $m$  — целое, а  $n$  — натуральное число, не равное 1,  $a > 0$ .

По определению, например,

$$3^{\frac{7}{5}} = \sqrt[5]{3^7}, 5^{-0.3} = 5^{\frac{-3}{10}} = \sqrt[10]{5^{-3}}$$

и т. п.

Рациональное число можно записать в виде дроби различными способами, например  $\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{3}{9}$  и т. п. Покажем, что значение степени с рациональным показателем не зависит от

того, какой из равных дробей представлен её показатель, т. е. если

$$\frac{m}{n} = \frac{p}{q}, \text{ то } a^{\frac{m}{n}} = a^{\frac{p}{q}},$$

где  $m$  и  $p$  — целые, а  $n$  и  $q$  — натуральные числа.

Действительно, учитывая, что  $mq = pn$ , имеем:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[nq]{a^{mq}} = \sqrt[nq]{a^{pn}} = \sqrt[q]{a^p} = a^{\frac{p}{q}}.$$

**Примечание.** В доказательстве предполагалось, что ни  $n$ , ни  $q$  не равны 1, поскольку показатель степени корня не равен 1. Если же всё-таки, например,  $n = 1$ , т. е.  $m = \frac{p}{q}$ , то преобразования стают ещё проще:  $a^m = \sqrt[q]{a^{mq}} = \sqrt[q]{a^p} = a^q$ .

Можно показать, что для степеней с рациональными показателями остаются справедливыми свойства, ранее установленные для степеней с целыми показателями.

### Свойства степеней с целыми показателями

$$a^x a^y = a^{x+y}$$

$$a^x b^x = (ab)^x$$

$$\frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x$$

$$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$$

$$(a^x)^y = a^{xy}$$

Докажем, что  $(a^x)^y = a^{xy}$ , где  $x$  и  $y$  — рациональные числа.

Пусть  $x = \frac{m}{n}$  и  $y = \frac{p}{q}$ , тогда  $(a^x)^y = \left(a^{\frac{m}{n}}\right)^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{\left(a^{\frac{m}{n}}\right)^p} = \sqrt[q]{\left(\sqrt[n]{a^m}\right)^p} = \sqrt[q]{a^{mp}} = a^{\frac{mp}{nq}} = a^{\frac{m}{n} \cdot \frac{p}{q}} = a^{xy}$ , что и требовалось доказать.

В рамках принятого определения степени с дробным показателем такие выражения, как  $(-2)^{\frac{1}{3}}$ ,  $0^{2.5}$ ,  $(-3)^{\frac{6}{18}}$ , не имеют смысла.

▼ Попытка распространить определение степени с дробным показателем на отрицательные основания приводит к противоречиям. Попробуем, например, применить это определение к выражению  $(-3)^{\frac{6}{18}}$ , а именно:  $(-3)^{\frac{6}{18}} = \sqrt[18]{(-3)^6} =$

$= \sqrt[18]{3^6} = \sqrt[3]{3}$ . В то же время,  $(-3)^{\frac{6}{18}} = (-3)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{-3} = -\sqrt[3]{3}$ . Получилось, что одно и то же выражение имеет два различных значения. Противоречия можно избежать, если договориться сокращать дробные показатели степени.  $\triangle$

Поскольку  $\sqrt[n]{0^m} = 0$  при любом натуральном  $m$ , естественно считать, что  $0^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{0^m}$ , и *доопределить* степень с дробным показателем.

При любом положительном рациональном показателе степени  $r$  имеем  $0^r = 0$ .

Степени с рациональными показателями часто встречаются в тождественных преобразованиях выражений.

**Пример 1.** Найти значение выражения

$$\frac{a+b}{a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{3}} + a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{2}{3}}} \text{ при } a = 1,5, b = 40,5.$$

**Решение.** Попытаемся упростить данное выражение. В знаменателе дроби каждый из членов содержит степень переменной  $a$ , поэтому попытаемся вынести общий множитель:

$a - a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{3}} + a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{1}{3}} \left( a^{\frac{2}{3}} - a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{2}{3}} \right)$ . Поскольку  $a^{\frac{2}{3}} = \left(a^{\frac{1}{3}}\right)^2$  и  $b^{\frac{2}{3}} = \left(b^{\frac{1}{3}}\right)^2$ , выражение  $a^{\frac{2}{3}} - a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{2}{3}}$  является неполным квадратом двучлена  $a^{\frac{1}{3}} - b^{\frac{1}{3}}$ . При этом выражение  $a + b$ , стоящее в числителе дроби, можно рассматривать как сумму кубов:

$$a + b = \left(a^{\frac{1}{3}}\right)^3 + \left(b^{\frac{1}{3}}\right)^3 = \left(a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{3}}\right) \left(a^{\frac{2}{3}} - a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{2}{3}}\right).$$

Теперь исходную дробь можно сократить:

$$\begin{aligned} \frac{a+b}{a - a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{3}} + a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{2}{3}}} &= \frac{\left(a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{3}}\right) \left(a^{\frac{2}{3}} - a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{2}{3}}\right)}{a^{\frac{1}{3}} \left(a^{\frac{2}{3}} - a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{2}{3}}\right)} = \frac{a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{3}}}{a^{\frac{1}{3}}} = 1 + \frac{b^{\frac{1}{3}}}{a^{\frac{1}{3}}} = \\ &= 1 + \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{3}}. \end{aligned}$$




Рис. 54

Пора подставить данные значения переменных:

$$1 + \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{3}} = 1 + 27^{\frac{1}{3}} = 1 + 3 = 4.$$

Ответ: 4.

**Примечание.** В рассмотренном примере удалось устно найти степень числа. В тех случаях, когда это не удается, на помощь приходит калькулятор. Так, на инженерном калькуляторе (рис. 54), который является одной из стандартных подпрограмм популярного компьютерного пакета «Windows»

(Пуск → Программы → Стандартные → Калькулятор → → Вид → Инженерный),

для возведения в степень есть специальная клавиша. Чтобы найти, например, значение степени  $3,7^{1,9}$  нужно:

- 1) ввести основание степени 3,7;
- 2) нажать клавишу  $x^y$ ;
- 3) ввести показатель степени 1,9;
- 4) нажать клавишу «=» на калькуляторе (или «Enter» на клавиатуре).

На дисплее калькулятора (рис. 54) появится приближённое значение степени, вычисленное с высокой точностью:

12,0111136337617598559088970536459.

**Пример 2.** Доказать, что при  $0 < a < 125$  верно равенство

$$\left( \left( a^{\frac{1}{3}} + 5 \right)^2 - 20a^{\frac{1}{3}} \right)^{\frac{1}{2}} + a^{\frac{1}{3}} = 5.$$

**Доказательство.** Преобразуем левую часть данного равенства:

$$\begin{aligned} \left( \left( a^{\frac{1}{3}} + 5 \right)^2 - 20a^{\frac{1}{3}} \right)^{\frac{1}{2}} + a^{\frac{1}{3}} &= \left( \left( a^{\frac{1}{3}} + 5 \right)^2 - 4 \cdot 5a^{\frac{1}{3}} \right)^{\frac{1}{2}} + a^{\frac{1}{3}} = \\ &= \left( \left( a^{\frac{1}{3}} - 5 \right)^{\frac{1}{2}} + a^{\frac{1}{3}} \right) = \left| a^{\frac{1}{3}} - 5 \right| + a^{\frac{1}{3}}. \end{aligned}$$

При  $0 < a < 125$  разность  $a^{\frac{1}{3}} - 5$  отрицательна, значит, модуль этой разности — число ей противоположное:

$$\left| a^{\frac{1}{3}} - 5 \right| + a^{\frac{1}{3}} = -\left( a^{\frac{1}{3}} - 5 \right) + a^{\frac{1}{3}} = 5,$$

что и требовалось доказать.

## Упражнения

**136.** Докажите, что  $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$ , где  $a > 0$ , а  $x$  и  $y$  — рациональные числа.

**137.** Представьте в виде степени или произведения степеней с дробными показателями:

- |                      |                         |                                   |                                     |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) $\sqrt[3]{x}$ ;   | 4) $\sqrt[6]{b^5}$ ;    | 7) $\sqrt[7]{\frac{a^5}{2b^4}}$ ; | 10) $\sqrt{-a^3}$ ;                 |
| 2) $\sqrt[4]{y}$ ;   | 5) $\sqrt[7]{a^2b^3}$ ; | 8) $\sqrt[7]{\frac{3c^8}{x^5}}$ ; | 11) $\sqrt[6]{-\frac{a^3}{2b^4}}$ ; |
| 3) $\sqrt[5]{a^3}$ ; | 6) $\sqrt[3]{bc^2}$ ;   | 9) $\sqrt[6]{-y^5}$ ;             | 12) $\sqrt[4]{-\frac{3c^2}{d^3}}$ . |

**138.** Представьте в виде корня или произведения корней:

- |                         |                                |  |
|-------------------------|--------------------------------|--|
| 1) $a^{\frac{2}{7}}$ ;  | 5) $c^{\frac{1}{3}}$ ;         | 9) $\sqrt[2]{2^{-\frac{3}{4}}} \cdot \sqrt[3]{3^{\frac{1}{3}}}$ ;  |
| 2) $b^{\frac{5}{9}}$ ;  | 6) $b^{-\frac{1}{2}}$ ;        | 10) $\sqrt[3]{3^{-\frac{1}{2}}} \cdot \sqrt[5]{5^{\frac{2}{3}}}$ ; |
| 3) $x^{-\frac{3}{4}}$ ; | 7) $a^{0,6} \cdot b^{-0,7}$ ;  | 11) $\sqrt{(a+b)^{-\frac{1}{2}}}$ ;                                |
| 4) $a^{-0,5}$ ;         | 8) $x^{-0,8} \cdot y^{-0,9}$ ; | 12) $\sqrt[2]{(x+2y)^3}$ .   |

**139.** Представьте в виде степеней:

1)  $x^{\frac{1}{3}} x^{\frac{1}{4}} x^{\frac{1}{6}}$ ;

4)  $b^{-\frac{7}{10}} b^{-\frac{1}{5}} b^{-\frac{4}{15}}$ ;

7)  $\left(b^{\frac{5}{7}}\right)^{0,7} \cdot b$ ;

2)  $y^{-\frac{1}{4}} y^{-\frac{1}{7}} y^{-\frac{1}{14}}$ ;

5)  $\left(a^{\frac{1}{3}} a^{\frac{1}{2}} a^{-\frac{1}{6}}\right)^3$ ;

8)  $(c^{-0,3})^{1\frac{2}{3}}$ ;

3)  $c^{-\frac{1}{6}} c^{-\frac{5}{9}} : c^{-\frac{3}{4}}$ ;

6)  $\left(x^{\frac{1}{3}} x^{-\frac{1}{2}} x^{\frac{5}{6}}\right)^{-3}$ ;

9)  $(d^{-0,5})^3 \cdot d$ .

**140.** Вычислите:

1)  $27^{\frac{1}{3}}$ ;

5)  $0,001^{-\frac{2}{3}}$ ;

9)  $\frac{9^{3,5}}{27^{1\frac{2}{3}}}$ ;

2)  $32^{-\frac{1}{5}}$ ;

6)  $0,0001^{-\frac{3}{4}}$ ;

10)  $\frac{8^{-1\frac{1}{3}}}{16^{-1,25}}$ ;

3)  $81^{-\frac{3}{4}}$ ;

7)  $\left(\frac{27}{64}\right)^{-\frac{2}{3}}$ ;

11)  $\frac{12^{\frac{5}{6}}}{2^{1\frac{2}{3}} \cdot 3^{\frac{1}{3}}}$ ;

4)  $125^{-\frac{2}{3}}$ ;

8)  $\left(5\frac{1}{16}\right)^{-\frac{3}{4}}$ ;

12)  $\frac{3^{\frac{5}{6}} \cdot 2^{\frac{1}{6}}}{18^{\frac{5}{12}}}$ .

**141.** ○ Представьте в виде степеней с основанием:

1) 2;

2)  $\sqrt{2}$ ;

3) 4;

4) 0,125;

5)  $\sqrt[3]{4}$

числа: а) 0,25; б)  $\frac{1}{32}$ ; в)  $\sqrt[5]{16}$ ; г)  $\frac{1}{\sqrt[10]{512}}$ ; д)  $8\sqrt{2}$ .

**142.** ○ Представьте в виде степеней с основанием:

1)  $\frac{1}{3}$ ;

2)  $\sqrt[3]{9}$ ;

3) 3;

4)  $\frac{1}{27}$ ;

5)  $\sqrt[5]{81}$

числа: а)  $\frac{1}{81}$ ; б) 81; в)  $\sqrt[5]{9}$ ; г)  $\frac{1}{\sqrt[7]{243}}$ ; д)  $27\sqrt{3}$ .

**143.** Представьте выражение в виде квадрата:

1)  $a$ ;

3)  $x^{\frac{2}{3}}$ ;

5)  $4c$ ;

7)  $64xy^{\frac{1}{2}}$ ;

2)  $y^3$ ;

4)  $b^{-\frac{2}{5}}$ ;

6)  $25a$ ;

8)  $9b^{\frac{1}{3}}c$ .

**144.** Представьте выражение в виде куба:

- |            |                         |            |                             |
|------------|-------------------------|------------|-----------------------------|
| 1) $p$ ;   | 3) $a^{\frac{3}{4}}$ ;  | 5) $8z$ ;  | 7) $125ay^{\frac{1}{3}}$ ;  |
| 2) $a^2$ ; | 4) $b^{-\frac{3}{7}}$ ; | 6) $27x$ ; | 8) $1000b^{\frac{1}{2}}c$ . |

**145.** Раскройте скобки:

- 1)  $\left(2a^{\frac{3}{4}} + 3b^{\frac{1}{2}}\right)^2$ ;
- 2)  $\left(a^{\frac{1}{2}} - a^{\frac{1}{4}}\right)\left(a^{\frac{1}{4}} + 1\right)$ ;
- 3)  $\left(b^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{6}}\right)\left(b^{\frac{1}{6}} - 1\right)$ ;
- 4)  $\left(x - x^{\frac{1}{2}}\right)\left(x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}}\right)$ ;
- 5)  $\left(c^{\frac{1}{2}} + c^{-\frac{1}{3}}\right)\left(c^{\frac{1}{3}} - c^{-\frac{1}{2}}\right)$ ;
- 6)  $\left(a^{\frac{1}{2}} + b^{-\frac{1}{3}}\right)\left(a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{3}}\right)$ ;
- 7)  $\left(x^{\frac{1}{6}} + z^{\frac{1}{3}}\right)\left(z^{\frac{1}{3}} - x^{\frac{1}{6}}\right)$ ;
- 8)  $\left(a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{3}}\right)\left(a^{\frac{2}{3}} - a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{2}{3}}\right)$ ;
- 9)  $\left(x^{\frac{2}{5}} - y^{\frac{1}{6}}\right)\left(x^{\frac{4}{5}} + x^{\frac{2}{5}}y^{\frac{1}{6}} + y^{\frac{1}{3}}\right)$ .

**146.** Представьте выражение в виде разности квадратов и разложите на множители:

- 1)  $10 - a$ ;
- 2)  $b - 7$ ;
- 3)  $a^3 - 25$ ;
- 4)  $x^4 - y^3$ ;
- 5)  $a^{\frac{1}{2}} - 9$ ;
- 6)  $25 - b^{\frac{1}{3}}$ ;
- 7)  $3x - y^{\frac{1}{4}}$ ;
- 8)  $p^{\frac{1}{5}} - 9q$ ;
- 9)  $x^{1,4} - 28y$ .

**147.** Представьте выражение в виде суммы или разности кубов и разложите на множители:

- 1)  $8 - a$ ;
- 2)  $b + 27$ ;
- 3)  $1000x - 3$ ;
- 4)  $125 + 2y$ ;
- 5)  $a^{\frac{1}{2}} + 8$ ;
- 6)  $64 - b^{\frac{1}{3}}$ ;
- 7)  $x^{\frac{1}{2}} - z^{\frac{1}{4}}$ ;
- 8)  $b^{\frac{1}{6}} + 8c^{\frac{1}{2}}$ .

**148.** Сократите дробь на  $a$ :

$$1) \frac{a}{a^{\frac{1}{2}}};$$

$$2) \frac{a}{a^{\frac{4}{3}} + a};$$

$$3) \frac{a}{a - a^{\frac{1}{2}}};$$

$$4) \frac{a - a^{\frac{1}{2}}}{a - a^{\frac{1}{6}}}.$$

**149.** Упростите выражение:

$$1) \frac{a - a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}}{b - a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}};$$

$$5) \frac{a + 2a^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}} + x}{ax^{\frac{1}{2}} + a^{\frac{1}{2}}x};$$

$$2) \frac{x + x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{2}{3}}}{y + x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{3}}};$$

$$6) \frac{3b^{\frac{1}{2}} - 3^{\frac{1}{2}}b}{b + 3 - 2 \cdot 3^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}};$$

$$3) \frac{a - 25}{a^{\frac{1}{2}} - 5};$$

$$7) \frac{\frac{1}{a^4} - \frac{3}{a^4 + 6} + \frac{a^{\frac{1}{2}}}{36 - a^2}}{a^4 - 6};$$

$$4) \frac{2y^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{1}{2}}}{x - 4y};$$

$$8) \frac{\frac{1}{x^6y^6 + y^3} + \frac{y^{\frac{1}{3}}}{x^6y^6 - x^{\frac{1}{3}}} - \frac{x^{\frac{1}{3}} + y^{\frac{1}{3}}}{x^6y^{\frac{1}{6}}}}{x^{\frac{1}{6}}y^{\frac{1}{6}}}$$

**150.** 1) Вычислите значение выражения, если нужно, упростив его:

$$\text{а)} \frac{7a^{\frac{4}{5}}}{a^{\frac{14}{5}} - 3a^{-\frac{1}{5}}} \text{ при } a = 2;$$

$$\text{б)} \frac{a^{\frac{7}{3}} - a^{\frac{1}{3}}}{5a^{\frac{4}{3}}} \text{ при } a = 4;$$

$$\text{в)} \frac{a}{a^{\frac{1}{3}} - 2} - \frac{2a + 16}{a^{\frac{1}{3}} + 2} \text{ при } a = 27;$$

$$\text{г)} \frac{y^2 - 8y^{\frac{1}{2}}}{y - 4} + \frac{8}{y^{\frac{1}{2}} + 2} \text{ при } y = 25;$$

$$\text{д)} \frac{\frac{1}{x^2} - y^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{3}} - x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{2}}} - \frac{\frac{1}{x^2} + y^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{2}}} \text{ при } x = 12,8; y = 5;$$

e)  $\frac{x^{\frac{2}{3}} - y^{\frac{2}{3}}}{x^{\frac{2}{3}}y + xy^{\frac{2}{3}}} - \frac{x^{\frac{2}{3}} - y^{\frac{2}{3}}}{x^{\frac{2}{3}}y - xy^{\frac{2}{3}}}$  при  $x = 4; y = 0,5$ .

2) Проведите вычисления с помощью калькулятора без предварительного упрощения выражений.

**151.** Замените корни степенями и упростите выражение:

1)  $\left( \frac{\sqrt[3]{c}}{\sqrt[3]{c^2} - \sqrt[3]{c} + 1} - \frac{3\sqrt[3]{c} - 1}{c + 1} \right) \cdot \frac{c + 1}{\sqrt[3]{c^2} - 1};$

2)  $\frac{y - 1}{\sqrt[3]{y^2} - \sqrt[3]{y}} \cdot \left( \frac{y}{y - 1} + \frac{1}{\sqrt[3]{y} - 1} \right);$

3)  $\sqrt[4]{b} \cdot \left( \frac{\sqrt[4]{b^3} + \sqrt[4]{x^3}}{\sqrt[4]{b} + \sqrt[4]{bx}} - \sqrt[4]{b} \right) - \frac{b - x}{\sqrt[4]{b} - \sqrt[4]{x}};$

4)  $\left( \frac{49}{x - 27} - \frac{\sqrt[3]{x} - 3}{\sqrt[3]{x^2} + 3\sqrt[3]{x} + 9} \right) \cdot \frac{\sqrt[3]{x^4} - 27\sqrt[3]{x}}{16 - \sqrt[3]{x^2}} - \frac{40 - \sqrt[3]{x^2}}{4 - \sqrt[3]{x}}.$

**152.** Решите уравнение:

1)  $(x + 9)^{\frac{1}{6}} - (x + 3)^{\frac{1}{2}} = 0;$       2)  $\frac{y}{y + 1} - 2\left(\frac{y + 1}{y}\right)^{0,5} = 3.$

**153.** Найдите все значения  $a$ , при которых не имеет корней уравнение:

1)  $x - 2ax^{\frac{1}{2}} - a + 2 = 0;$       2)  $x + 3(2 + x)^{0,5} + a = 0.$



## Контрольные вопросы и задания

1. Используя определение степени с рациональным показателем, докажите, что  $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$ , где  $a > 0$ ,  $x$  и  $y$  — рациональные числа.

2. Запишите без знаков корней выражение и упростите его

$$\frac{\sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt[4]{a^3}}{\sqrt[6]{a^5} \cdot \sqrt{a}}.$$

3. Сократите дробь  $\frac{x^{\frac{1}{2}} - 8}{x^{\frac{1}{3}} + 2x^{\frac{1}{6}} + 4}.$

## Глава 3

# ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ И ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ

В этой главе снимется последнее ограничение на показатель степени — вы сможете использовать степени, показателями которых являются любые действительные числа. В пункте 9 вас ожидает также знакомство с новой функцией, аргументом которой является показатель степени числа, — показательной функцией. Свойства показательной функции будут использоваться в решении уравнений и неравенств. Проблема решения показательного уравнения  $a^x = b$  в пункте 10 приведёт к понятию логарифма, а в последнем пункте главы вы научитесь применять свойства логарифмов к решению различных задач.



## 9. Функция $y = a^x$

В предыдущей главе вы познакомились с понятием степени с рациональным показателем. Это позволяет нам рассматривать функции вида  $y = a^x$ , аргумент которых может принимать любые рациональные значения. Аргументом функции  $y = a^x$  является показатель степени, поэтому такие функции получили название *показательных*.

Основанием степени с рациональным показателем может быть только положительное число, но, говоря об основании показательной функции, следует ввести ещё одно ограничение. Поскольку  $1^x = 1$ , функция  $y = 1^x$  является не показательной, а линейной.

Функцию вида  $y = a^x$ , где  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ , называют **показательной**.

Построим график функции  $y = a^x$ , например при  $a = 2$ . Для этого, как обычно, найдём сначала координаты некоторых точек графика и заполним таблицу значений функции:

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8} \approx 0,13; 2^{-2,5} = 2^{-3+0,5} =$$

$$= 2^{-3} \cdot 2^{0,5} \approx \frac{1}{8} \cdot 1,414 \approx 0,18;$$

$$2^{-2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4} = 0,25; \dots; 2^{3,5} =$$

$$= 2^3 \cdot 2^{0,5} \approx 8 \cdot 1,414 \approx 11,31.$$

$x$	$y = 2^x$	$x$	$y = 2^x$
-3	0,13	0,5	1,41
-2,5	0,18	1	2
-2	0,25	1,5	2,83
-1,5	0,35	2	4
-1	0,5	2,5	5,66
-0,5	0,71	3	8
0	1	3,5	11,31




Рис. 55

Отметим эти точки на координатной плоскости (рис. 55).

Составляя таблицу, вычислили значения функции  $y = 2^x$  для значений  $x$ , взятых с шагом 0,5. На рисунке 56, а изобра-





Рис. 56

жены точки графика функции  $y = 2^x$  для значений  $x$ , взятых с шагом 0,1.

Можно заметить, что с уменьшением шага точки всё гуще располагаются на некоторой непрерывной кривой линии (рис. 56, б).

Все точки этой линии, абсциссы которых рациональны, являются точками графика функции  $y = 2^x$ . Но кроме них на ней имеется также бесконечное множество «лишних» точек, абсциссы которых иррациональны. Условимся считать, что и при любом иррациональном значении  $x$  ордината соответствующей точки нашей кривой равна  $2^x$ .

Тогда полученная кривая будет являться графиком показательной функции  $y = 2^x$ , аргумент которой может принимать любые действительные (рациональные и иррациональные) значения.

Аналогичным образом, условимся считать, что при любом положительном  $a$ , отличном от 1, аргумент показательной функции  $y = a^x$  может принимать любые действительные значения.

Степени с действительными показателями обладают такими же свойствами, как и степени с рациональными показателями.




Рис. 57

### Свойства степени с рациональными показателями

$$a^x a^y = a^{x+y};$$

$$a^x b^x = (ab)^x;$$

$$\frac{a^x}{a^y} = \left(\frac{a}{b}\right)^x;$$

$$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y};$$

$$(a^x)^y = a^{xy}.$$

На рисунке 57 в одной системе координат изображены графики нескольких показательных функций с основаниями, большими 1. Рассматривая эти графики, можно отметить несколько свойств, общих для всех функций вида  $y = a^x$  при  $a > 1$ .

### Свойства функции $y = a^x$ , $a > 1$

- Функция определена и непрерывна на множестве всех действительных чисел.
- Область значений функции — множество всех положительных чисел.
- Функция является возрастающей.
- При  $x = 0$  значение функции равно 1, т. е. график проходит через точку  $(0; 1)$ .
- Ось абсцисс — горизонтальная асимптота графика функции  $y = a^x$ .

Из этих свойств следует, что при  $x > 0$  значения функции больше 1, а при  $x < 0$  значения функции заключены между 0 и 1.

Для построения графика функции  $y = a^x$  при  $0 < a < 1$  можно, конечно, снова составить таблицу значений, но лучше поступить иначе. Пусть, например, нужно построить график функции  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ . Поскольку  $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$ , график функции  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$  мы можем получить из графика функции  $y = 2^x$  с помощью симметрии относительно оси ординат (рис. 58).

На графиках функции  $y = a^x$  при  $a > 1$  и при  $0 < a < 1$  видно, что различие в их свойствах относится только к свойству 3 — характеру монотонности: при  $a > 1$  показательная функция возрастает, при  $0 < a < 1$  убывает.

Свойство монотонности часто применяется при решении показательных уравнений и неравенств.




Рис. 58



**Пример 1.** Решить уравнение  $9^x - 8 \cdot 3^x = 9$ .

**Решение.** Введём вспомогательную переменную  $t$ :  $t = 3^x$ , тогда  $9^x = (3^2)^x = (3^x)^2 = t^2$ . Поскольку переменная  $t$

может принимать только положительные значения, задача сводится к нахождению положительного корня уравнения  $t^2 - 8t - 9 = 0$ . Корни этого квадратного уравнения  $t_1 = -1$ ,  $t_2 = 9$ , значит, искомый корень 9.

Возвращаясь к переменной  $x$ , получим  $3^x = 9$ ,  $3^x = 3^2$ . В силу монотонности своё значение  $3^2$  функция  $y = 3^x$  принимает единственный раз при  $x = 2$ .

**Ответ:** 2.



### Пример 2. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} 9^x + 1 = 3^{3y+2}, \\ 4x^2 - 2x = y + 13. \end{cases}$$

**Решение.** Перепишем первое уравнение заданной системы  $9^x + 1 = 3^{3y+2}$  как равенство степеней с одинаковыми основаниями:  $3^{2x+2} = 3^{3y+2}$ . Поскольку каждое своё значение показательная функция принимает по одному разу, из равенства значений показательной функции следует равенство значений её аргумента:  $2x + 2 = 3y + 2$ ,  $2x = 3y$ .

Подставляя  $3y$  вместо  $2x$  во второе уравнение системы, получим:

$$(3y)^2 - 3y = y + 13, \quad 9y^2 - 4y - 13 = 0,$$

$$y_1 = -1, \quad y_2 = \frac{13}{9}.$$

Найдём соответствующие значения  $x$  из равенства  $2x = 3y$ :

$$x_1 = -\frac{3}{2}, \quad x_2 = \frac{13}{6}.$$

$$\text{Ответ: } x_1 = -\frac{3}{2}, y_1 = -1; x_2 = \frac{13}{6}, y_2 = \frac{13}{9}.$$



### Пример 3. Найти область определения функции


$$y = \sqrt[4]{0,25^{x-1} - 9 \cdot 0,5^x + 2}.$$

**Решение.** Выражение, стоящее под знаком корня чётной степени, должно быть неотрицательно:

$$0,25^{x-1} - 9 \cdot 0,5^x + 2 \geqslant 0.$$

Введём вспомогательную переменную  $t$ :  $t = 0,5^x$  и найдём положительные решения неравенства  $0,25^{-1} \cdot t^2 - 9t + 2 \geq 0$ :

$$\begin{cases} 4t^2 - 9t + 2 \geq 0, \\ t > 0, \end{cases} \quad \begin{cases} t \leq \frac{1}{4} \text{ или } t \geq 2, \\ t > 0, \end{cases}$$



$0 < t \leq \frac{1}{4}$  или  $t \geq 2$  (рис. 59).

Рис. 59

Вернёмся к переменной  $x$ .  $0 < 0,5^x \leq \frac{1}{4}$  или  $0,5^x \geq 2$ . Поскольку  $0 < 0,5^x$  при всех значениях  $x$ , имеем:

$$0,5^x \leq 0,5^2 \text{ или } 0,5^x \geq 0,5^{-1}.$$

Показательная функция с основанием  $0,5$  является убывающей, поэтому большему её значению соответствует меньшее значение аргумента, значит,  $x \geq 2$  или  $x \leq -1$ .

Ответ:  $D(y) = (-\infty; -1] \cup [2; +\infty)$ .

**Примечание.** При переходе от неравенств со степенями к неравенствам с их показателями мы, в силу убывания показательной функции с основанием, меньшим 1, изменили знаки неравенств. Понятно, что если бы мы имели дело с возрастающей функцией, знак неравенства следовало бы сохранить, например,  $3^x < 3^2$ ,  $x < 2$ .

С показательной функцией, определённой на множестве натуральных чисел, вы встречались в курсе алгебры 9 класса в теме прогрессии. Действительно, формула  $n$ -го члена геометрической прогрессии  $b_n = b_1 q^{n-1}$  при  $b_1 = q$  задаёт показательную функцию

$$b_n = b(n) = q^n.$$

Показательная функция  $y = a^x$  обладает важным свойством: при увеличении аргумента на 1 она изменяет своё значение в  $a$  раз:  $a^{x+1} = a \cdot a^x$ .

Такие зависимости довольно широко распространены в окружающем нас мире. Приведём три примера из биологии, физики и экономики, приводящих к показательной функции.

**Биология.** В питательной среде бактерия кишечной палочки делится каждые 20 минут. Понятно, что общее число бактерий за каждый час увеличивается в 8 раз. Если в начале процесса была одна бактерия, то через  $x$  часов их число  $N$  станет равным  $8^x$ :

$$N(x) = 8^x.$$

**Физика.** Время, за которое распадается половина массы радиоактивного вещества, называют его периодом полураспада. У цезия-137, являющегося основным компонентом радиоактивного заражения местности после Чернобыльской катастрофы, период полураспада 30 лет. Значит, от начальной массы  $m_0$  цезия через  $x$  лет останется  $m_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{30}}$ :

$$m(x) = m_0 \cdot \left(\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{30}}\right)^x.$$

**Экономика.** Если ежемесячно на банковский вклад, равный  $s_0$  рублей, начисляется  $p\%$ , то через  $x$  месяцев вклад  $s$  станет равным  $s_0 \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)^x$ :

$$s(x) = s_0 \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)^x.$$

Найдём, например, на сколько процентов возрастёт банковский вклад за год, если ежемесячно банк начисляет на него 2%.

1. Сначала найдём, каким станет вклад через 12 месяцев:

$$s(12) = s_0 \cdot (1 + 0,02)^{12} = s_0 \cdot 1,02^{12} \approx 1,27s_0.$$

2. Выясним, на сколько вырос вклад за год:

$$s(12) - s_0 = 1,27s_0 - s_0 = 0,27s_0.$$

3. Определим, сколько процентов от начального вклада составляет этот прирост:

$$\frac{s(12) - s_0}{s_0} \cdot 100\% = \frac{0,27s_0}{s_0} \cdot 100\% = 27\%.$$

## Упражнения

**154.** С помощью графика функции  $y = 2^x$  (см. рис. 56, б) найдите:

1) приближённое значение функции, если:

- |                |                 |                                      |
|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| а) $x = 0,8$ ; | в) $x = -0,4$ ; | д) $\circlearrowleft x = \sqrt{2}$ ; |
| б) $x = 1,7$ ; | г) $x = -0,6$ ; | е) $\circlearrowleft x = \sqrt{3}$ ; |




Рис. 60

2) приближённые значения аргумента, если:

- |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| a) $y = 0,6$ ; | b) $y = 2$ ;   | c) $y = 6$ ;   |
| d) $y = 1,5$ ; | e) $y = 3,5$ ; | f) $y = 4,5$ . |

155. Принадлежит ли графику функции  $y = 2^x$  точка:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1) $A(5; 32)$ ;     | 3) $C(4,5; 16\sqrt{2})$ ;                     |
| 2) $B(-3; 0,125)$ ; | 4) $D\left(-1,5; \frac{\sqrt{2}}{4}\right)$ ? |

156. Используя график функции  $y = 1,5^x$  (рис. 60), найдите приближённые решения уравнения и неравенства:

- |                  |                                      |  |
|------------------|--------------------------------------|--|
| 1) $1,5^x = 3$ ; | 4) $1,5^x = 0,3$ ;                   | 7) $0,5 \leqslant 1,5^x \leqslant 4$ ; |
| 2) $1,5^x > 7$ ; | 5) $1 \leqslant 1,5^x \leqslant 6$ ; | 8) $2 \leqslant 1,5^x < 7$ ;           |
| 3) $1,5^x < 3$ ; | 6) $1,5^x = 0,8$ ;                   | 9) $3 < 1,5^x \leqslant 4$ .           |

157. Сравните значения выражений:

- |                              |                                     |   |
|------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1) $2^{-7}$ и $2^{-5,3}$ ;   | 4) $0,3^0$ и $0,3^{0,1}$ ;          | 7) $0,2^{3\sqrt{3}}$ и $0,2^{\sqrt{2}}$ ; |
| 2) $4^{-1,4}$ и $4^{0,03}$ ; | 5) $1,1^{\sqrt{3}}$ и $1,1^{1,7}$ ; | 8) $17^{\sqrt[5]{4}}$ и $17^{\sqrt{2}}$ ; |
| 3) $5^0$ и $5^{-0,1}$ ;      | 6) $2^{-\sqrt{5}}$ и $2^{-2,5}$ ;   | 9) $3^{-\sqrt{3}}$ и $3^{\sqrt{3}}$ .     |

**158.** Решите уравнение, представляя его правую часть в виде степени с тем же основанием, что и степень в левой части:

$$\begin{array}{lll} 1) 2^x = 16; & 4) 5^x = \frac{1}{125}; & 7) \left(\frac{1}{2}\right)^x = \frac{\sqrt[4]{2}}{8}; \\ 2) 5^x = 625; & 5) \left(\frac{1}{3}\right)^x = \sqrt[3]{9}; & 8) 0,2^x = \frac{1}{\sqrt[4]{125}}; \\ 3) 2^x = 0,25; & 6) 2^x = \frac{4}{\sqrt[5]{16}}; & 9) \left(\frac{1}{3}\right)^x = 81. \end{array}$$

**159.** Определите  $a$ , если известно, что график функции  $y = a^x$  проходит через точку: 1)  $M(0,5; 3)$ ; 2)  $K(2; 5)$ .

**160.** График функции  $y = a^x$  проходит через точку  $A(4; 25)$ . Проходит ли этот график через точку:  
1)  $B(-6; 0,008)$ ; 2)  $C(6; 125)$ ?

**161.** На рисунке 57 изображены графики функций вида  $y = a^x$ . Определите значение  $a$  для каждой из них.

**162.** 1) Постройте график функции:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} y = 3^{|x|}; & \text{в)} y = 1,5^{|x+1|}; \\ \text{б)} y = \left(\frac{1}{3}\right)^{|x|}; & \text{г)} y = \left(\frac{2}{3}\right)^{|x|-1}. \end{array}$$

2) Укажите область значений функции, её промежутки возрастания и убывания, наибольшее или наименьшее значение.

**163.** Упростите выражение:

$$1) \frac{a^{2\sqrt{3}} - b^{2\sqrt{5}}}{(a^{\sqrt{3}} - b^{\sqrt{5}})^2} - 1; \quad 2) \frac{\frac{2\sqrt{3}}{a^{\frac{2}{3}}} - a^{\frac{1}{3}} b^{\frac{5}{3}} + b^{\frac{2}{3}}}{a^{\sqrt{3}} + b^{\sqrt{5}}}.$$

**164.** Не решая уравнения  $4^x + 4^{-x} = 19$ , найдите значение выражения  $2^x + 2^{-x}$ .

**165.** Выясните, является ли функция:

$$1) y = 2^x + 2^{-x}; \quad 2) y = 2^x - 2^{-x}$$

чётной, нечётной, или она не является ни чётной, ни нечётной.

**166.** Докажите, что при любом значении  $x$  верно неравенство  $2^x + 2^{-x} \geq 2$ .

**167.** Решите уравнение:

1)  $\left(\frac{1}{64}\right)^x = \sqrt{\frac{1}{8}};$

5)  $9^{2\sqrt{x}} = 3^{2x-6};$

2)  $8^x = 128\sqrt{2};$

6)  $10^x - \sqrt{x^2 + 5x + 1} = 1000;$

3)  $(2,5)^{2x-3} = 15\frac{5}{8};$

7)  $5^{x-\sqrt{3x-5}} = 125;$

4)  $0,125 \cdot 4^{2x+3} = \frac{0,25}{\sqrt{2}};$

8)  $\left(\frac{3}{2}\right)^{2-2x} - \left(\frac{8}{27}\right)^{x-2} = 0.$

**168.** Решите уравнение:

1)  $7^{x+2} - 14 \cdot 7^x = 5;$

2)  $3^{x+1} - 5 \cdot 3^{x-1} = 36;$

3)  $5^{x+2} - 4 \cdot 5^{x+1} + 4 \cdot 5^{x-1} = 29;$

4)  $5 \cdot 2^x - 7 \cdot 2^{x-1} + 9 \cdot 2^{x-2} = 60;$

5)  $\left(\frac{1}{3}\right)^{x-3} - 4 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{x-2} + 11 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x = 6;$

6)  $0,2^{x-3} - 3 \cdot 0,2^{x-2} - 6 \cdot 0,2^{x-1} = 500;$

7)  $9^x - 2^{x+0,5} = 2^{x+3,5} - 3^{2x-1};$

8)  $4^x - 3^{\frac{x-1}{2}} = 3^{\frac{x+1}{2}} - 2^{2x-1}.$

**169.** Решите уравнение:

1)  $4^x - 9 \cdot 2^x + 8 = 0;$

4)  $5^{x+1} + 5^{1-x} = 26;$

2)  $\left(\frac{1}{9}\right)^x - 8\left(\frac{1}{3}\right)^x - 9 = 0;$

5)  $5 \cdot 5^x - 3 \cdot 5^{-x} = 2;$

3)  $3 \cdot 2^x - 7 \cdot 2^{\frac{x}{2}} - 20 = 0;$

6)  $2^x - 13 \cdot 2^{\frac{x-2}{2}} - 12 = 0.$

**170.** Решите систему уравнений:

1)  $\begin{cases} 27^{x-2y} = \frac{1}{3^{2x+y}}, \\ 3x - 5y = 4; \end{cases}$

3)  $\begin{cases} 3^x - 2^{2y} = 17, \\ \frac{x}{3^2} + 2^y = 17; \end{cases}$

2)  $\begin{cases} 25^{x+y} = \frac{1}{\sqrt{5^{x-y}}}, \\ 3x - 2y = 6; \end{cases}$

4)  $\begin{cases} u - (\sqrt{5})^v = v - (\sqrt{5})^u, \\ u + v^2 = 12. \end{cases}$

**171.** Решите неравенство:

1)  $\left(\frac{1}{2}\right)^x > 16;$

2)  $\sqrt{3^x} < 27;$

3)  $(3 - \sqrt{3})^x > 1;$

7)  $2^x \leqslant 5 - \frac{x}{2};$

4)  $(\sqrt{15} - 3)^x \geqslant 1;$

8)  $3^x \geqslant \frac{3}{x};$

5)  $\frac{2^x - 0,5}{3 + x} > 0;$

9)  $* 3^x + 5^x > 8^x;$

6)  $\frac{3^x - 81}{5 + 4x - x^2} \geqslant 0;$

10)  $* 3^x + 4^x < 5^x.$

**172.** Найдите область определения функции:

1)  $\sqrt{9^x - 28 \cdot 3^x + 27};$

2)  $\frac{1}{\sqrt{0,5^x - \frac{4}{0,5^x} - 3}}.$

**173.** Найдите все значения  $a$ , при которых уравнение

$4^x - a \cdot 2^x + a - 1 = 0:$

1) имеет два корня;

2) не имеет корней;

3) имеет единственный корень. 

**174.** Процент инфляции показывает, на сколько процентов (в среднем) выросли цены.

1) Выразите процент инфляции за  $x$  месяцев, если ежемесячная инфляция составляла 3%.

2) Вычислите с помощью калькулятора годовой процент инфляции.



### Контрольные вопросы и задания

- Любое ли положительное число можно представить в виде степени с основанием 2 и рациональным показателем?
- Между какими последовательными натуральными числами заключено число  $2^{\sqrt{2}}$ ?
- Сравните значения выражений  $\pi^x$  и  $\pi^{\frac{10}{3}}$ .
- Решите неравенство  $0,25^x - 4 \cdot 0,5^x < 0$ .



## 10. Понятие логарифма

При решении показательных уравнений в предыдущем пункте удавалось представить обе части уравнения в виде степеней с одинаковыми основаниями и рациональными показате-

лями. Так, например, при решении уравнения  $2^x = \left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{2}{5}}$  мы заменяем

$\left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{2}{5}}$  степенью  $2^{-\frac{6}{5}}$  и из равенства степеней с одинаковыми основания-

ми  $2^x = 2^{-\frac{6}{5}}$  делаем вывод о равенстве показателей:  $x = -\frac{6}{5}$ . Однако,

чтобы решить, казалось бы, более простое уравнение  $2^x = 3$  имеющихся у вас знаний оказывается недостаточно. Дело в том, что число 3 нельзя представить в виде степени с основанием 2 и рациональным показателем.

▼ Действительно, если бы равенство  $2^{\frac{m}{n}} = 3$ , где  $m$  и  $n$  — натуральные числа, было верным, то, возведя его в степень  $n$ , мы должны были бы получить верное равенство  $2^m = 3^n$ . Но последнее равенство неверно, так как левая его часть является чётным числом, а правая — нечётным. Значит, не может быть верным и равенство  $2^{\frac{m}{n}} = 3$ . △

С другой стороны, график непрерывной функции  $y = 2^x$  пересекается с прямой  $y = 3$  (рис. 61), и, значит, уравнение  $2^x = 3$  имеет корень.

Таким образом, перед нами стоят два вопроса: «Как записать этот корень?» и «Как его вычислить?». Ко второму вопросу мы вернёмся в следующем пункте, а ответ на первый вопрос сформулируем в виде определения.

Показатель степени, в которую нужно возвести число  $a$  ( $a > 0, a \neq 1$ ), чтобы получить число  $b$ , называется **логарифмом  $b$  по основанию  $a$**  и обозначается  $\log_a b$ .

Теперь мы можем записать корень уравнения  $2^x = 3$ :

$$x = \log_2 3.$$

Равенства  $a^x = b$  и  $x = \log_a b$ , в которых число  $a$  положительно и не равно единице, число  $b$  положительно, а число  $x$  может быть любым, выражают одно и то же соотношение между числами  $a$ ,  $b$  и  $x$ . Подставив в первое равенство выра-




Рис. 61




Рис. 62

жение  $x$  из второго, получим основное логарифмическое тождество.

### Основное логарифмическое тождество

$$a^{\log_a b} = b$$

Выразим  $x$  из равенства  $y = \log_a x$ , получим  $x = a^y$ . Последнее равенство задаёт функцию  $x = a^y$ , график которой симметричен графику показательной функции  $y = a^x$  относительно прямой  $y = x$  (рис. 62, а, б).

Показательная функция  $x = a^y$  является монотонной, и, значит, разные значения  $y$  соответствуют разным значениям  $x$ , но это говорит о том, что  $y = \log_a x$ , в свою очередь, является функцией  $x$ .

Показательная функция  $y = a^x$  и логарифмическая функция  $y = \log_a x$  являются взаимно обратными. Сравнивая их графики, можно отметить некоторые основные свойства логарифмической функции.

### Свойства функции $y = \log_a x$ , $a > 0$ , $a \neq 1$

1. Функция  $y = \log_a x$  определена и непрерывна на множестве положительных чисел.
2. Область значений функции  $y = \log_a x$  — множество действительных чисел.
3. При  $0 < a < 1$  функция  $y = \log_a x$  является убывающей; при  $a > 1$  функция  $y = \log_a x$  является возрастающей.
4. График функции  $y = \log_a x$  проходит через точку  $(1; 0)$ .
5. Ось ординат — вертикальная асимптота графика функции  $y = \log_a x$ .

Рассмотрим несколько примеров, в которых используются свойства логарифмической функции.

**Пример 1.** Решить уравнение  $\log_2(2^x - 7) = 3 - x$ .

**Решение 1.** По определению логарифма имеем:

$$2^{3-x} = 2^x - 7.$$

Далее:  $2^x - \frac{8}{2^x} - 7 = 0$ . Поскольку  $2^x \neq 0$ , получаем:

$$(2^x)^2 - 7 \cdot 2^x - 8 = 0.$$

Будем рассматривать полученное уравнение как квадратное относительно  $2^x$  и найдём его положительный корень, поскольку  $2^x > 0$ , то  $2^x = 8$ . Далее имеем:  $2^x = 2^3$ ,  $x = 3$ .

Ответ: 3.

**Решение 2.** Левая часть уравнения задаёт возрастающую функцию  $y = \log_2(2^x - 7)$ . Действительно, при увеличении значения  $x$  соответственно увеличиваются значения  $2^x$ ,  $2^x - 7$  и  $\log_2(2^x - 7)$ . Правая же часть уравнения задаёт убывающую функцию  $y = 3 - x$ . Значит, данное уравнение либо не имеет корней, либо имеет единственный корень. Нетрудно подобрать корень данного уравнения — число 3.

**Пример 2.** Решить неравенство  $\log_{x+2}(5-x) > 1$ .

**Решение.** Найдём множество значений переменной  $x$ , при которых все входящие в данное неравенство выражения имеют смысл — *область допустимых значений переменной неравенства* (обычно используется сокращение ОДЗ). Одновременно должны выполняться следующие условия: основание логарифма и выражение, стоящее под знаком логарифма, положительны, а основание логарифма, кроме того, отличается от 1. Следовательно, ОДЗ состоит из решений системы

$$\begin{cases} 5-x > 0, \\ x+2 > 0, \\ x+2 \neq 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x < 5, \\ x > -2, \\ x \neq -1. \end{cases} \quad \text{ОДЗ: } (-2; -1) \cup (-1; 5).$$

Для любого значения  $x$  из ОДЗ правую часть данного неравенства можно представить в виде логарифма с основанием  $x+2$ :

$$\log_{x+2}(5-x) > \log_{x+2}(x+2).$$

Основание  $x + 2$  логарифмов может быть как больше, так и меньше 1. В первом случае большему логарифму соответствует большее значение стоящего под его знаком выражения, а во втором — меньшее. Следовательно, чтобы перейти от неравенства логарифмов к неравенству выражений, стоящих под их знаками, нужно рассмотреть два случая:

1) основание логарифма больше 1 (знак неравенства не изменяется);

2) основание логарифма меньше 1 (знак неравенства меняется на противоположный).

$$\text{Случай 1. } \begin{cases} x + 2 > 1, \\ 5 - x > x + 2; \end{cases} \quad \begin{cases} x > -1, \\ 2x < 3; \end{cases} \quad -1 < x < 1,5.$$

Найденные значения  $x$  входят в ОДЗ и, соответственно, в множество решений неравенства.

$$\text{Случай 2. } \begin{cases} x + 2 < 1, \\ 5 - x < x + 2; \end{cases} \quad \begin{cases} x < -1, \\ x > 1,5; \end{cases} \quad \text{нет решений.}$$

Ответ:  $-1 < x < 1,5$ .



### Пример 3. Решить неравенство

$$\log_3 \log_{0,5} (2x + 1) > 1.$$

**Решение.** Запишем обе части неравенства в виде логарифмов с одинаковым основанием 3:

$$\log_3 \log_{0,5} (2x + 1) > 1, \quad \log_3 \log_{0,5} (2x + 1) > \log_3 3.$$

Логарифмическая функция с основанием 3 возрастает, значит,  $\log_{0,5} (2x + 1) > 3$ . Понятно, что в этом случае значения выражения  $\log_{0,5} (2x + 1)$ , стоящего под знаком внешнего логарифма, положительны. Запишем обе части неравенства в виде логарифмов с одинаковым основанием 0,5:

$$\log_{0,5} (2x + 1) > \log_{0,5} 0,5^3.$$

Логарифмическая функция с основанием 0,5 убывает; учитывая, что под знаком логарифма должно быть положительное число, имеем:

$$\begin{cases} 2x + 1 < 0,5^3, \\ 2x + 1 > 0; \end{cases} \quad 0 < 2x + 1 < \frac{1}{8},$$

$$-1 < 2x < -\frac{7}{8}, \quad -\frac{1}{2} < x < -\frac{7}{16}.$$

Ответ:  $-\frac{1}{2} < x < -\frac{7}{16}$ .

**Примечание.** Освобождаясь от внешнего логарифма, имеющего основание 3, мы сослались на возрастание соответствующей логарифмической функции, т. е. на то, что большему значению логарифма соответствует большее значение выражения, стоящего под его знаком. Однако следует иметь в виду, что если функцию  $y = \log_3 \log_{0,5} (2x + 1)$  считать логарифмической, то её аргумент не переменная  $x$ , а всё выражение  $\log_{0,5} (2x + 1)$ . Если же всё-таки рассматривать  $x$  как аргумент функции  $y = \log_3 \log_{0,5} (2x + 1)$ , то эта функция окажется убывающей, так как при увеличении значения  $x$  увеличивается значение выражения  $2x + 1$ , уменьшается значение выражения  $\log_{0,5} (2x + 1)$  и, соответственно, уменьшается значение самой функции.

## Упражнения

**175.** Пользуясь определением логарифма, найдите:

1) а)  $\log_2 4$ ;      2) а)  $\log_5 25$ ;

б)  $\log_3 81$ ;      б)  $\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{27}$ ;

в)  $\log_{0,5} 0,125$ ;      в)  $\log_4 64$ ;

г)  $\log_3 \frac{1}{27}$ ;      г)  $\log_{0,25} 16$ ;

д)  $\log_{0,5} 8$ ;      д)  $\log_3 \frac{1}{81}$ ;

е)  $\log_4 \sqrt{2}$ ;      е)  $\log_{27} \sqrt{3}$ ;

ж)  $\log_{\sqrt{3}} \frac{1}{27}$ ;      ж)  $\log_{3\sqrt{2}} 0,125$ .

**176.** Запишите в виде логарифма с основанием:

1) 2;      2)  $\frac{1}{2}$ ;      3)  $\frac{2}{3}$ ;      4) 4;      5)  $\frac{1}{27}$ ;      6)  $x + 1$

числа: а) 1;      б) 2;      в) 3;      г) 0;      д) -1;

е) -2;      ж) -3;      з) 0,5;      и)  $\frac{1}{3}$ ;      к) -0,5;      л)  $\frac{2}{3}$ .

**177.** Решите уравнение:

1)  $\log_x 32 = 5$ ;      3)  $\log_x \sqrt{5} = 3$ ;

2)  $\log_x 27 = -3$ ;      4)  $\log_x \sqrt[3]{49} = -2$ .

**178.** Решите уравнение<sup>1</sup>:

- 1)  $\log_2(x+3)=2$ ;      3)  $\log_{\sqrt{3}}(x^2-3x-7)=2$ ;  
 2)  $\log_{0,6}(x-5)=-2$ ;      4)  $\log_{\frac{\sqrt{2}}{2}}(x^2+5x+2)=-6$ ;  
 5)  $\log_{\frac{2}{3}}(x+1)-\log_3(x+1)-2=0$ ;  
 6)  $\log_{0,5}^2(2x-1)+3\log_{0,5}(2x-1)+2=0$ .

**179.** Решите уравнение, пользуясь определением логарифма:

- 1)  $2^x=5$ ;      3)  $5^{x+1}=2$ ;  
 2)  $0,5^x=7$ ;      4)  $\left(\frac{1}{7}\right)^x=3$ .

**180.** Решите неравенство:

- 1)  $\left(\frac{1}{2}\right)^x > 3$ ;      3)  $(3-\sqrt{3})^x > 6$ ;  
 2)  $\sqrt{3^x} < 16$ ;      4)  $(\sqrt{15}-3)^x \leqslant 6$ .

**181.** В одной системе координат постройте графики функций.

1)  $y = \log_2 x$  и  $y = \log_3 x$ .

Используя графики, сравните числа:

- a)  $\log_2 5$  и  $\log_3 5$ ;      в)  $\log_2(5-\sqrt{17})$  и  $\log_3(5-\sqrt{17})$ ;  
 б)  $\log_2 0,9$  и  $\log_3 0,9$ ;      г)  $\log_2(\sqrt{2}-1)$  и  $\log_3(\sqrt{2}-1)$ .  
 2)  $y = \log_{\frac{1}{2}} x$  и  $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ .

Используя графики, сравните числа:

- а)  $\log_{\frac{1}{2}} 4$  и  $\log_{\frac{1}{3}} 4$ ;  
 б)  $\log_{\frac{1}{2}} 0,8$  и  $\log_{\frac{1}{3}} 0,8$ ;  
 в)  $\log_{\frac{1}{2}}(\sqrt{17}-4)$  и  $\log_{\frac{1}{3}}(\sqrt{17}-4)$ ;  
 г)  $\log_{\frac{1}{2}}(3-\sqrt{2})$  и  $\log_{\frac{1}{3}}(3-\sqrt{2})$ .

**182. 1)** В одной системе координат изобразите схематически графики функций  $y = a^x$  и  $y = b^x$ :

- а) при  $a > b > 1$ ;      б) при  $0 < b < a < 1$ .

<sup>1</sup> Принято обозначение  $\log_a^n b = (\log_a b)^n$ .

2) В этой же системе постройте графики обратных им функций  $y = \log_a x$  и  $y = \log_b x$ .

3) Используя графики, решите неравенство  $\log_a x < \log_b x$ .

4) Сформулируйте правило сравнения логарифмов одного и того же числа.

**183.** Сравните:

$$1) \log_7 \frac{6}{7}, \log_8 \frac{7}{8} \text{ и } \log_8 \frac{6}{7}; \quad 2) \log_7 \frac{8}{7}, \log_8 \frac{9}{8} \text{ и } \log_8 \frac{8}{7}.$$

**184.** Найдите область определения выражения:

$$\begin{array}{ll} 1) \log_5(7x^2 + 10x + 3); & 5) \log_{x+2}(7x^2 + 10x + 3); \\ 2) \log_5(7 + 10x - 17x^2); & 6) \log_{4x+3}(7 + 10x - 17x^2); \\ 3) \log_{3-2x}(2x + 3); & 7) \log_{3x-2} \frac{2x-1}{3-x}; \\ 4) \log_{3-2x}(7 - 3x); & 8) \log_{2-\frac{x}{3}} \frac{3x-1}{4-x}. \end{array}$$

**185.** Решите уравнение:

$$\begin{array}{ll} 1) 25^x - 8 \cdot 5^x + 15 = 0; & 3) \left(\frac{2}{3}\right)^x - 7 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^x + 6 = 0; \\ 2) 2^x + 10 \cdot 2^{-x} - 7 = 0; & 4) 2 \cdot (0,1)^x + 10^{x+1} - 21 = 0; \\ 5) 4^x - 6^{x+1} + 5 \cdot 9^x = 0; & \\ 6) 3 \cdot 4^x - 5 \cdot 6^x + 2 \cdot 9^x = 0; & \\ 7) 2^{x+1} - 3 \cdot 2^x + 5 \cdot 2^{x-1} = 15; & \\ 8) \left(\frac{1}{3}\right)^{2x-3} - 2 \cdot \left(\frac{1}{9}\right)^{x-1} - 4 \cdot \left(\frac{1}{9}\right)^x = 10. & \end{array}$$

**186.** Решите уравнение:

$$1) \log_3(3^x - 8) = 2 - x; \quad 2) \log_4(4^{-x} + 3) = x + 1.$$

**187.** Найдите все значения  $a$ , при которых уравнение  $\log_2(4^x - a) - x = 0$  имеет:

1) единственный корень; 2) два корня. 

**188.** Решите неравенство:

$$\begin{array}{ll} 1) \log_5(x+2) > 2; & 5) \log_{\sqrt[3]{16}}(x^2 - 3x + 4) < 1,5; \\ 2) \log_{0,5}(x-2) < -2; & 6) \log_{\sqrt{2}}(x^2 - 5x - 6) > 6; \\ 3) \log_{\sqrt{3}}(x+2) < 4; & 7) \log_{x-5}(x+2) > 1; \\ 4) \log_{\sqrt[3]{0,1}}(1-x) > 6; & 8) \log_{x+1}(x-2) < -1. \end{array}$$

**189.** Выполнив эскизы графиков функций  $y = f(x)$  и  $y = g(x)$ , решите:

1) уравнение  $f(x) = g(x)$ ; 2) неравенство  $f(x) < g(x)$ , где:  
 а)  $f(x) = \log_2 x$ ,  $g(x) = 5 - x^2$ ;

б)  $f(x) = \log_{\frac{1}{3}} x$ ,  $g(x) = \sqrt{x-2} - 2$ .

**190.** Решите неравенство, используя метод интервалов:

1)  $\frac{\log_5 x - 2}{2 - \log_6 x} > 0$ ;

4)  $\frac{7x^2 - 10x + 3}{\log_{0,9} x - 2} \leq 0$ ;

2)  $\frac{\log_{0,5} x + 2}{2 - \log_3 x} < 0$ ;

5)  $\frac{x^2 - 9x - 10}{\log_{0,9} (x^2 - 9)} \geq 0$ ;

3)  $\frac{\log_{0,4} x - 2}{3x^2 - 10x + 7} > 0$ ;

6)  $\frac{\log_5 (9 - x^2)}{x^2 - 3x - 4} < 0$ .

**191.** Решите неравенство:

1)  $\log_{x-3} (7-x) \geq 0$ ;

7)  $\log_{2x} (x^2 - 5x + 6) < 1$ ;

2)  $\log_{7-x} (x-3) > 0$ ;

8)  $\log_{x-1} (x^2 - 6x + 9) < 1$ ;

3)  $\log_{x-3} (7-x) > 1$ ;

9)  $\log_{x^2 - 6x + 9} (x-1) \leq 1$ ;

4)  $\log_{x+4} \frac{x^2 - 1}{3} < 0$ ;

10)  $\log_{x^2 + 2} (3x + 6) \leq 1$ ;

5)  $\log_{\frac{x^2 - 1}{3}} (x+4) > 0$ ;

11)  $\log_{x^2 + 3x - 4} (x+4) > 0$ ;

6)  $\log_{x-2} (x+10) < 2$ ;

12)  $\log_{x+4} (x^2 + 3x - 4) < 0$ .

**192.** Решите неравенство:

1)  $\log_2 \log_{\frac{1}{3}} (x-1) > 0$ ;

3)  $\log_{0,2} \log_2 (2x+3) < -1$ ;

2)  $\log_{0,6} \log_{0,5} (x+1) > 0$ ;

4)  $\log_{\frac{1}{3}} \log_2 (2x-1) < -1$ ;

5)  $\log_{0,5} \log_3 \frac{x-2}{x-4} > 0$ ;

6)  $\log_3 \log_{0,2} \log_{32} \frac{x-1}{x+5} > 0$ .



### Контрольные вопросы и задания

- Запишите соотношение  $a^c = b$  между числами  $a$ ,  $b$  и  $c$  с помощью логарифма с основанием  $a$ .
- Почему число 1 нельзя рассматривать в качестве основания логарифма?

3. В чём отличие свойств логарифмических функций с основаниями большими 1 и меньшими 1?
4. Решите: 1) уравнение  $\log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 5x + 6) = -1$ ;
- 2) неравенство  $\frac{\log_3 x - 2}{5x + 1} \leq 0$ .
5. Какие два случая надо рассмотреть при решении неравенства  $\log_x(7 - x) > 0$ ? Решите это неравенство.

## 11. Свойства логарифмов

В предыдущем пункте вы научились переходить от показательной формы записи равенств  $a^x = b$  к логарифмической  $x = \log_a b$  и обратно. Связь этих двух форм записи соотношения между числами  $a$ ,  $b$  и  $x$  позволяет получить свойства логарифмов, основываясь на известных свойствах степеней.

Рассмотрим, например, произведение степеней с одинаковым основанием:  $a^x a^y$ . Пусть  $a^x = b$  и  $a^y = c$ . Перейдём к логарифмической форме:  $x = \log_a b$  и  $y = \log_a c$ , тогда  $bc = a^{\log_a b} \cdot a^{\log_a c} = a^{\log_a b + \log_a c}$ . От показательной формы равенства  $bc = a^{\log_a b + \log_a c}$  перейдём к логарифмической форме:

$$\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c.$$

Заметим, что в левой части формулы числа  $a$  и  $b$  могут быть отрицательными. Тогда формула будет выглядеть так:

$$\log_a(bc) = \log_a|b| + \log_a|c|.$$

Аналогично можно получить ещё два свойства для логарифмов частного и степени.

### Свойства логарифмов

логарифм произведения

$$\log_a(bc) = \log_a|b| + \log_a|c|$$

логарифм частного

$$\log_a \frac{b}{c} = \log_a|b| - \log_a|c|$$

логарифм степени

$$\log_a b^p = p \log_a|b|$$

Последнее свойство даёт возможность вывести важную формулу, с помощью которой можно выразить логарифм с одним основанием через логарифм с другим основанием.

Пусть  $\log_a b = x$ . Переайдём к показательной форме  $a^x = b$ . Прологарифмируем это равенство по основанию  $c$ , т. е. найдём логарифмы с основанием  $c$  обеих частей этого равенства:  $\log_c a^x = \log_c b$ . Применяя к левой части свойство логарифма степени, получим  $x \log_c a = \log_c b$  или  $x = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ , откуда

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}.$$

**Формула перехода логарифма  
от одного основания к другому**

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Полезно запомнить частный случай формулы перехода, когда одно из оснований является степенью другого:

$$\log_{a^p} b = \frac{1}{p} \log_a b.$$

**Примечание.** Все рассмотренные свойства и формула перехода «работают», конечно, только когда все входящие в них выражения имеют смысл.

Рассмотрим несколько примеров уравнений и неравенств, в решении которых применяются свойства логарифмов.



**Пример 1.** Решить уравнение

$$\log_2 x = 3 - 4 \log_2 \sqrt{3} + 3 \log_2 3.$$

**Решение.** Используя свойства логарифма произведения, частного и степени «справа налево», представим правую часть равенства в виде логарифма с основанием 2:

$$\begin{aligned} 3 - 4 \log_2 \sqrt{3} + 3 \log_2 3 &= \log_2 2^3 - \log_2 (\sqrt{3})^4 + \log_2 3^3 = \\ &= \log_2 \frac{2^3 \cdot 3^3}{(\sqrt{3})^4} = \log_2 \frac{8 \cdot 3^3}{3^2} = \log_2 (8 \cdot 3) = \log_2 24. \end{aligned}$$

Мы пришли к равенству  $\log_2 x = \log_2 24$ . Потенцируя это равенство, т. е. находя число по известному его логарифму, получим  $x = 24$ .

Ответ: 24.

**Пример 2.** Решить уравнение  $\log_3 \frac{x-2}{x+2} + \log_3 (x^2 - 4) = 4$ .

**Решение.** Выражения, стоящие под знаками логарифмов, положительны при  $x < -2$  и при  $x > 2$ . Этим условием определяется ОДЗ данного уравнения. Для всех значений  $x$  из ОДЗ к левой части уравнения можно применить свойство логарифма произведения:

$$\begin{aligned}\log_3 \frac{x-2}{x+2} + \log_3 (x^2 - 4) &= \log_3 \left( \frac{x-2}{x+2} (x^2 - 4) \right) = \\ &= \log_3 \frac{(x-2)(x-2)(x+2)}{x+2} = \log_3 (x-2)^2.\end{aligned}$$

По определению логарифма от равенства  $\log_3 (x-2)^2 = 4$  приходим к равенству  $(x-2)^2 = 3^4$ .

Далее имеем  $x-2 = \pm 9$ ,  $x_1 = 11$ ,  $x_2 = -7$ . Оба найденных числа входят в ОДЗ, а значит, являются корнями исходного уравнения.

**Ответ:**  $-7; 11$ .

**Примечание 1.** В левой части уравнения  $\log_3 (x-2)^2 = 4$  можно было воспользоваться свойством логарифма степени:  $\log_3 (x-2)^2 = 2 \log_3 |x-2|$  (модуль необходимо поставить, чтобы не потерять корни, при которых выражение  $x-2$  принимает отрицательные значения). Вообще, полезно иметь в виду, что

$$\log_a b^{2n} = 2n \log_a |b|, \text{ где } n \text{ — целое число.}$$

**Примечание 2.** Свойствами логарифмов в преобразованиях выражений с переменными следует пользоваться осторожно, поскольку они могут изменить область допустимых значений переменных. Так, например, применив в левой части рассмотренного уравнения свойства логарифмов частного и произведения, мы получили бы уравнение

$$\begin{aligned}\log_3 (x-2) - \log_3 (x+2) + \log_3 (x-2) + \log_3 (x+2) &= 4, \\ 2 \log_3 (x-2) &= 4,\end{aligned}$$

ОДЗ которого  $x > 2$  является лишь частью ОДЗ исходного уравнения. Продолжая решение, получаем:

$$\log_3 (x-2) = 2, \quad x-2 = 9, \quad x = 11.$$

При таком решении корень  $-7$  оказался «съеден» уменьшением или, как говорят математики, *сужением* ОДЗ. Понятно, что потерю корней нельзя обнаружить, проверяя оставшиеся корни. При решении уравнений желательно *избегать сужения области допустимых значений*.



**Пример 3.** Решить уравнение

$$2 \log_x 5 - 3 \log_5 x = 1.$$

**Решение.** Приведём логарифмы левой части уравнения к одному основанию:

$$\log_x 5 = \frac{\log_5 5}{\log_5 x} = \frac{1}{\log_5 x}, \quad \frac{2}{\log_5 x} - 3 \log_5 x = 1,$$

поскольку  $x \neq 1$ ,  $\log_5 x \neq 0$  и умножение уравнения на  $\log_5 x$  не нарушает равносильность преобразования

$$3 \log_5^2 x + \log_5 x - 2 = 0.$$

Решая полученное уравнение как квадратное относительно  $\log_5 x$ , получаем:

$$\log_5 x_1 = -1, \quad x_1 = \frac{1}{5}; \quad \log_5 x_2 = \frac{2}{3}, \quad x_2 = \sqrt[3]{25}.$$

Ответ:  $\frac{1}{5}; \sqrt[3]{25}$ .

В предыдущем пункте был поставлен вопрос о том, как вычислять значения логарифмов. Проще всего значение логарифма можно найти с помощью инженерного калькулятора. Как правило, калькуляторы позволяют непосредственно находить значения логарифмов на выбор по одному из оснований 10 или  $e \approx 2,7$  (более близкое знакомство с числом  $e$  ожидает вас в следующем классе).

*Десятичные логарифмы* (логарифмы с основанием 10) широко применялись в вычислительной практике в до-компьютерный период, а логарифмы с основанием  $e$ , так называемые *натуральные логарифмы*, используются в различных научных расчётах. Широкое распространение логарифмов с основаниями 10 и  $e$  дало им право на специальные обозначения:

$$\log_{10} a = \lg a, \log_e a = \ln a.$$

На инженерном калькуляторе для вычисления значения десятичного логарифма имеется клавиша «*log*», для натурального логарифма — клавиша «*ln*». А для вычисления логарифмов с другими основаниями есть формула перехода.

Пусть, например, нужно найти значение  $\lg 23,5$ . Набираем число 23,5 и нажимаем клавишу «*log*». Дисплей калькулято-




Рис. 63

ра покажет число 1,37106786227173626920048050472471 (рис. 63), которое округляется с нужной точностью.

Логарифмы, как средство для упрощения вычислений, были изобретены в начале XVII в. Титанический труд швейцарца И. Бюрги, шотландца Д. Непера, англичанина Г. Бригса и голландца А. Влакка, составивших многозначные логарифмические таблицы, более 300 лет помогал людям выполнять различные вычисления. «*Открытие логарифмов*, — как сказал знаменитый французский математик, физик и астроном Пьер Лаплас, — *удлинило человеческую жизнь, если оценивать её не числом прожитых лет, а количеством сделанной работы*».

Генри Бригс составил 14-значные логарифмические таблицы. С принципом их использования можно познакомиться на примере *двухзначной таблицы десятичных логарифмов*, рассмотренной на с. 100.

В этой таблице с двумя входами указаны значения десятичных логарифмов чисел от 1 до 9,9. Пусть, например, нужно найти  $\lg 6,4$ . Значение этого логарифма находится на пересечении строки 6 и столбца 0,4. Оно равно  $\lg 6,4 \approx 0,81$ .

Вычислим корень уравнения  $2^x = 3$ , с которого в предыдущем пункте был начат разговор о логарифмах:

$$x = \log_2 3 = \frac{\lg 3}{\lg 2} \approx \frac{0,48}{0,30} = 1,6.$$

	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
1	0,00	0,04	0,08	0,11	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,28
2	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	0,41	0,43	0,45	0,46
3	0,48	0,49	0,51	0,52	0,53	0,54	0,56	0,57	0,58	0,59
4	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69
5	0,70	0,71	0,72	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,76	0,77
6	0,78	0,79	0,79	0,80	0,81	0,81	0,82	0,83	0,83	0,84
7	0,85	0,85	0,86	0,86	0,87	0,88	0,88	0,89	0,89	0,90
8	0,90	0,91	0,91	0,92	0,92	0,93	0,93	0,94	0,94	0,95
9	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,98	0,98	0,99	0,99	1,00

Не слишком большая точность, но ведь и таблица двузначная.

В таблице нет значений логарифмов чисел, больших 9,9 и меньших 1. Однако таблицу можно использовать и для них. Так, например,

$$\begin{aligned}\lg 438 &= \lg (4,38 \cdot 100) = \lg 4,38 + \lg 100 \approx \\ &\approx \lg 4,4 + 2 \approx 0,64 + 2 = 2,64 \approx 2,6.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lg 0,078 &= \lg (7,8 \cdot 10^{-2}) = \lg 7,8 + \lg 10^{-2} \approx 0,89 - 2 = \\ &= -1,11 \approx -1,1.\end{aligned}$$

**Примечание.** Заметим, что в обоих случаях число, стоявшее под знаком логарифма, представлялось в стандартном виде:  $a \cdot 10^n$ , где  $1 \leq a < 10$  и  $n$  — целое. При этом сам логарифм представлялся в виде суммы своей дробной и целой частей:

$$\lg (a \cdot 10^n) = \lg a + n.$$

Дробную часть десятичного логарифма называют *мантиссой*, а целую — *характеристикой*.

Покажем теперь, как использовались логарифмы в вычислении значений выражений.



**Пример 4.** Вычислить приближённо  $\frac{0,63^2}{0,57^5 \cdot \sqrt{23}}$ .

**Решение.** Обозначим буквой  $x$  данное выражение:  
 $x = \frac{0,63^2}{0,57^5 \cdot \sqrt{23}}$  и прологарифмируем полученное равенство по основанию 10:

$$\begin{aligned} \lg x &= \lg \frac{0,63^2}{0,57^5 \cdot \sqrt{23}} = \lg 0,63^2 - \lg (0,57^5 \cdot \sqrt{23}) = \\ &= 2 \lg 0,63 - \left( 5 \lg 0,57 + \frac{1}{2} \lg 23 \right) = 2 \lg 0,63 - 5 \lg 0,57 - \frac{1}{2} \lg 23. \end{aligned}$$

Найдём значения логарифмов:

$$\begin{aligned} \lg 0,63 &\approx 0,80 - 1 = -0,20, \quad \lg 0,57 \approx 0,76 - 1 = -0,24, \\ \lg 23 &\approx 0,36 + 1 = 1,36 \end{aligned}$$

и подставим их в полученное выражение

$$\begin{aligned} \lg x &\approx 2 \cdot (-0,20) - 5 \cdot (-0,24) - \frac{1}{2} \cdot 1,36 \approx \\ &\approx -0,40 + 1,20 - 0,68 = 0,12. \end{aligned}$$

Наиболее близкие из значений, имеющихся в таблице 0,11 и 0,15, соответствуют  $\lg 1,3$  и  $\lg 1,4$ , значит,

$$\lg 1,3 < \lg x < \lg 1,4 \text{ и } 1,3 < x < 1,4.$$

С помощью двузначной таблицы и нельзя было получить более чем две значащие цифры, однако все вычисления были устными. Проверяя результат с помощью калькулятора, находим  $x \approx 1,375$ .

**Ответ:**  $\approx 1,375$ .

## Упражнения

**193.** 1) Из каких свойств степеней получаются формулы:

$$\text{а) } \log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c; \quad \text{б) } \log_a b^p = p \log_a b?$$

2) ● Выведите эти формулы.

**194.** Вычислите значение выражения:

$$1) \log_6 2 + \log_6 3; \quad 3) \log_{\sqrt{3}} 12 - \log_{\sqrt{3}} 4;$$

$$2) \log_{\frac{1}{15}} 25 + \log_{\frac{1}{15}} 9; \quad 4) \log_2 12 + \log_{0,5} 3;$$

$$5) ● \log_5 10 + \log_{\sqrt{5}} 100 - \log_{3\sqrt{5}} 0,1 + \log_{\frac{1}{\sqrt{5}}} 16;$$

6)  $\log_3 49 \cdot \log_{\sqrt{7}} 5 \cdot \log_{25} 27;$

7)  $\log_3 4 \cdot \log_4 5 \cdot \log_5 6 \cdot \log_6 7 \cdot \log_7 8 \cdot \log_8 9;$

8)  $* \log_{\sqrt{2}-1} (\sqrt{3} - \sqrt[4]{8}) - \log_{\sqrt{2}+1} (\sqrt{3} + \sqrt[4]{8}).$

195. Зная, что  $\log_6 2 = a$ , выразите через  $a$  выражение:

1)  $\log_6 16;$

4)  $\log_{\sqrt[4]{216}} 0,125;$

7)  $\log_3 2;$

2)  $\log_{\sqrt{6}} 2;$

5)  $\log_2 6;$

8)  $\log_2 3;$

3)  $\log_{\sqrt[5]{36}} 8;$

6)  $\log_6 3;$

9)  $* \log_{48} 54.$

196. Найдите:

1)  $\lg 56$ , зная, что  $\lg 2 = a$  и  $\log_2 7 = b$ ;

2)  $\log_{30} 8$ , зная, что  $\lg 5 = a$  и  $\lg 3 = b$ .

197. Найдите число  $a$ , зная, что:

1)  $\log_3 a = 3 + 2 \log_{\sqrt{3}} 7 - \frac{1}{2} \log_9 16 - 4 \log_3 7;$

2)  $\log_2 a = \log_4 7 + 2 \log_{\sqrt{2}} 3 + 0,5 \log_{0,5} 7 - 2.$

198. Найдите натуральное число  $n$  такое, что:

1)  $3^2 \cdot 3^5 \cdot 3^8 \cdot \dots \cdot 3^{3n-1} = 81^{10};$

2)  $\log_2 3 \cdot \log_3 4 \cdot \log_4 5 \cdot \dots \cdot \log_n (n+1) = 10.$

199. Не вычисляя значений логарифмов, докажите, что

$$2 < \log_3 2 + \log_2 3 < 3.$$

200. Найдите наименьшее значение выражения

$$|\log_x 7 + \log_7 x|.$$

201. Сравните числа:

1)  $\log_7 8$  и  $\log_8 9$ ;

2)  $\log_7 6$  и  $\log_8 7$ .

202. При решении следующих уравнений называйте свойства логарифмов, которые вы используете в преобразованиях, и подумайте, изменяют ли выполняемые преобразования ОДЗ (и если да, то как):

1)  $\log_2 x + \log_4 x + \log_8 x = 11;$

2)  $\log_5 (3x-2) + \log_5 (x-7) = 2 + \log_5 2;$

3)  $\log_2 (4 \cdot 3^x - 6) - \log_2 (9^x - 6) = 1;$

4)  $\log_{\sqrt{5}} (4^x - 6) - \log_{\sqrt{5}} (2^x - 2) = 2;$

5)  $\log_x 9 + \log_{x^2} 729 = 10;$

6)  $\log_{10} x + \log_{\sqrt{10}} x + \log_{\frac{3}{\sqrt{10}}} x + \dots + \log_{\frac{10}{\sqrt{10}}} x = 5,5;$

7)  $\log_{\sqrt{3}} x + \log_{\frac{1}{\sqrt{3}}} x + \log_{\frac{1}{6\sqrt{3}}} x + \dots + \log_{\frac{1}{16\sqrt{3}}} x = 36;$

8)  $\lg(5^x + x - 20) = x - x \lg 2;$

9)  $3 \log_5 2 + 2 - x = \log_5(3^x - 5^{2-x});$

10)  $\log_3(81^x + 3^{2x}) = 3 \log_{27} 90;$

11)  $\log_{1-x} 3 - \log_{1-x} 2 = 0,5 = 0;$

12)  $\log_{4x+1} 7 + \log_{9x} 7 = 0;$

13)  $2 \log_x 27 - 3 \log_{27} x = 1;$

14)  $\log_4 \log_2 x + \log_2 \log_4 x = 2;$

15) ●  $\log_3 x \cdot \log_9 x \cdot \log_{27} x \cdot \log_{81} x = \frac{2}{3};$

16) ●  $3x - \log_6 8^x = \log_6(3^{3x} + x^2 - 9);$

17) ●  $\log_{x^2} 16 + \log_{2x} 64 = 3;$

18) ●  $\log_x(9x^2) \cdot \log_{\frac{2}{3}} x = 4.$

**203.** Решите уравнение, логарифмируя обе его части:

1)  $x^{\lg x} = 10\,000;$

7)  $x^{\frac{\lg x + 5}{3}} = 10^{5 + \lg x};$

2)  $x^{\log_2 x + 2} = 8;$

8)  $10^{2x+1} = 7^x;$

3)  $x^{\log_3 x - 4} = \frac{1}{27};$

9)  $2^x = 3^{x-2};$

4)  $x^{1-\lg x} = 0,01;$

10) ○  $5^{x+1} = 0,2 \cdot 3^{2x+1};$

5)  $x^{\log_3 3x} = 9;$

11) ●  $x^{\sqrt[n]{x}} = (\sqrt[n]{x})^x$  при  $x > 0;$

6)  $x^{\log_2 x} = 4x;$

12) ●  $x^{\log_9(x+3)} = 5^{\log_3 x}.$

**204.** ● Решите устно уравнение

$$2^{\log_3 x^2} \cdot 5^{\log_3 x} = 400.$$

**205.** 1) Сравните выражения  $a^{\log_b c}$  и  $c^{\log_b a}.$

2) На основании сформулированного вывода решите уравнение:

а)  $5^{\lg x} = 50 - x^{\lg 5};$

б)  $25^{\lg x} = 5 + 4x^{\lg 5}.$

**206.** Решите уравнение:

- 1)  $2\lg x^2 - \lg^2(-x) = 4;$
- 2)  $3\lg x^2 - \lg^2(-x) = 9.$

**207.** Решите неравенство:

- 1)  $\log_{\pi}(x+27) - \log_{\pi}(16-2x) < \log_{\pi}x;$
- 2)  $\log_{\sqrt{3}-1}(2x+3) + \log_{\sqrt{3}-1}(4-x) < \log_{\sqrt{3}-1}(2-3x);$
- 3)  $\log_{\pi-3}(2-7x) - \log_{\pi-3}(2-3x) > \log_{\pi-3}(x+4);$
- 4)  $\log_3(3^x-1) \cdot \log_{\frac{1}{3}}\left(3^{x-2} - \frac{1}{9}\right) > -3;$
- 5)  $\log_3(4^x+1) + \log_{4^x+1}3 > 2,5;$
- 6)  $\log_4 \log_2 x + \log_2 \log_4 x \leq 0;$
- 7)  $\log_x(x+1) < \log_{\frac{1}{x}}(2-x);$
- 8)  $\log_x \log_2(4^x-12) \leq 1;$
- 9)  $\log_{0,5} \log_2 \log_{x-1} 9 > 0;$
- 10)  $\log_3 \log_{x^2} \log_{x^2} x^4 > 0.$

**208.** Решите систему неравенств:

- 1)  $\begin{cases} 25^x - 30 \cdot 5^x + 125 \geq 0, \\ \log_x(x-1) \cdot \log_x(x+1) \leq 0; \end{cases}$
- 2)  $\begin{cases} x^2 \log_{25} x \geq \log_{25} x^3 + x \log_5 x, \\ 5^x + 5^{-x} \geq \frac{17}{4}; \end{cases}$
- 3)  $\begin{cases} \frac{1}{4\sqrt{x} - 3 \cdot 2\sqrt{x} + 2} < \frac{1}{6}, \\ \log_{\frac{1}{x}}\left(\frac{5}{2}x - 1\right) \geq -2; \end{cases}$
- 4)  $\begin{cases} 8 \cdot 4^x - 65 \cdot 2^x \leq 0, \\ \log_{|x|}^2 x^4 + \log_3 x^2 \leq 18. \end{cases}$

**209.** 1) С помощью двузначной таблицы логарифмов найдите приближённые значения выражений:

а)  $\frac{7,2^{0,4}}{\sqrt[3]{3,9}}$ ;      в)  $\frac{0,043^3\sqrt{78}}{12}$ ;      д)  $\frac{0,63^2}{0,83^5\sqrt[13]{13}}$ ;

б)  $\frac{4,8^{\frac{1}{3}}}{\sqrt[5]{4,4^{-3}}}$ ;      г)  $\frac{\sqrt[3]{441}}{0,78^5\sqrt{81}}$ ;      е)  $14^{0,85} - \frac{\sqrt[5]{58}}{\sqrt[7]{0,67}}$ .

2) Найдите с помощью калькулятора значения этих выражений с четырьмя верными значащими (кроме нулей в начале записи числа) цифрами.

## ! Контрольные вопросы и задания

- Что происходит с ОДЗ при замене  $\log_a(x(x + 3))$  на  $\log_a x + \log_a(x + 3)$ ? Что происходит с ОДЗ при обратной замене? В каком случае могут потеряться корни? В каком случае могут образоваться посторонние корни?
- В каком случае при замене  $\log_a(x + 4)^c$  на  $c\log_a(x + 4)$  может произойти изменение ОДЗ? Могут ли при этом преобразовании появиться посторонние корни?
- Решите уравнение  $\log_3 x^2 + \log_9 x - \log_{\sqrt[3]{3}} x = 1$ .
- Как с помощью таблицы значений десятичных логарифмов найти значения логарифмов чисел, больших 10? Найдите с помощью двузначной таблицы логарифмов  $\lg 0,0057$ .

## ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ И ИХ СВОЙСТВА

Слово «тригонометрия» произошло от двух греческих слов «*тригонон*» — треугольник и «*метрео*» — измеряю, и его можно перевести как знакомое вам по курсу планиметрии «*решение треугольников*». При решении прямоугольного треугольника вы впервые встретились с синусом и косинусом острого угла. В этой главе вы расширите своё знакомство с синусом, косинусом, а также познакомитесь ещё с двумя тригонометрическими функциями: тангенсом и котангенсом.

### 12. Угол поворота

В курсе геометрии нам было достаточно углов, не превосходящих  $360^\circ$ . Иначе обстоит дело в ряде задач механики, связанных с вращательным движением. В этих задачах часто используют понятие угловой скорости вращения — угол поворота в единицу времени.

На рисунке 64 изображён проигрыватель грампластинок. В зависимости от положения переключателя грампластинка совершают 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Найдём, на какой угол поворачивается пластинка за 1 с при каждом из положений переключателя.

Учитывая, что один оборот — это поворот на угол  $360^\circ$ , имеем:

$$33 \text{ об/мин} = \frac{33 \cdot 360^\circ}{60 \text{ с}} = 198 \text{ град/с},$$

$$45 \text{ об/мин} = \frac{45 \cdot 360^\circ}{60 \text{ с}} = 270 \text{ град/с},$$

$$78 \text{ об/мин} = \frac{78 \cdot 360^\circ}{60 \text{ с}} = 468 \text{ град/с.}$$

В последнем случае угол, на который поворачивается диск проигрывателя за 1 с, оказался больше  $360^\circ$ . В технике часто встречаются



Рис. 64




Рис. 65




Рис. 66

скорости вращения, достигающие сотен оборотов в секунду, поэтому приходится рассматривать углы, во много раз превышающие  $360^\circ$ . Так, например, лазерный диск, пришедший на смену грампластинке, вращается со скоростью до 900 об/мин, а диски в винчестере современного персонального компьютера — со скоростью 15 000 об/мин.

Пусть, двигаясь по окружности, точка перешла из начального положения  $A$  в конечное положение  $B$  (рис. 65). При этом она повернулась вокруг центра окружности на некоторый угол.

Обозначим угол поворота через  $\alpha^\circ$ , начальную точку поворота через  $P_0$  и конечную точку поворота через  $P_{\alpha^\circ}$  (рис. 66).

Однако знать начальную и конечную точки поворота ещё недостаточно, чтобы однозначно определить величину угла  $\alpha^\circ$ , так как неизвестно, сколько оборотов и в каком направлении (по часовой стрелке или против) совершила точка. На рисунке 67 изображено нескольких вариантов возможного перемещения точки. Очевидно, что существует бесконечно много подобных поворотов.

Условились считать углы поворота против часовой стрелки положительными, а по часовой стрелке — отрицательными.

Так, на рисунке 67, а угол поворота равен  $120^\circ$ , на рисунке 67, б изображён поворот на угол  $-240^\circ$ , а на рисунке 67, в поворот состоит из двух полных оборотов против часовой




Рис. 67

стрелки и поворота на угол  $120^\circ$ , значит, угол этого поворота равен  $120^\circ + 360^\circ \cdot 2 = 840^\circ$ .

Заметим, что любые два поворота с начальной точкой  $P_0$  и конечной точкой  $P_{\alpha^\circ}$  отличаются друг от друга на целое число полных оборотов, т. е. на  $360^\circ \cdot n$ , где  $n$  — целое число.

В рассмотренном случае общий вид углов  $\alpha^\circ$  будет равен  $120^\circ + 360^\circ \cdot n$ , где  $n$  — любое целое число.

**Общий вид углов поворота с конечной точкой  $P_{\alpha^\circ}$ :**

$$\alpha^\circ + 360^\circ \cdot n \quad (n \text{ — любое целое число}).$$

Подставляя в выражение  $\alpha^\circ + 360^\circ \cdot n$  вместо  $n$  числа  $\pm 1$ ,  $\pm 2$ ,  $\pm 3$  и т. д., будем получать углы, повороты на которые имеют одну и ту же конечную точку  $P_{\alpha^\circ}$ .

## Упражнения

- 210.** Приведите несколько примеров вращательного движения.
- 211.** Барабан стиральной машины в режиме отжима может совершать или 400, или 600 оборотов в минуту. Найдите, с какой угловой скоростью вращается барабан в каждом из этих случаев.
- 212.** Сравните значения угла поворота минутной и часовой стрелок часов за:
- |                |                |                 |
|----------------|----------------|-----------------|
| 1) 20 мин;     | 3) 1 ч 20 мин; | 5) 40 ч 30 мин; |
| 2) 2 ч 45 мин; | 4) 7 ч 10 мин; | 6) 10 ч 40 мин. |
- 213.** Два ученика, наблюдавшие за проехавшим велосипедистом, спорили. Один заявил, что колёса велосипеда вращались по часовой стрелке, а другой — что против. Могут ли они оба быть правы?
- 214.** Ведущая и ведомая звёздочки одной из моделей велосипеда имеют соответственно 40 и 15 одинаковых зубьев (рис. 68). На какой угол повернётся ведомая звёздочка, если ведущая повернётся на угол:
- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1) $360^\circ$ ; | 2) $540^\circ$ ? |
|------------------|------------------|




Рис. 68

- 215.** Представьте угол в виде  $\alpha^\circ + 360^\circ n$ , где  $n$  — целое число и  $0^\circ < \alpha^\circ < 360^\circ$ :
- 1)  $840^\circ$ ;      3)  $-170^\circ$ ;      5)  $3200^\circ$ ;      7)  $-2450^\circ$ ;
  - 2)  $1200^\circ$ ;      4)  $-390^\circ$ ;      6)  $3500^\circ$ ;      8)  $-3100^\circ$ .
- 216.** 1) Представьте угол в виде  $\alpha^\circ + 360^\circ n$ , где  $n$  — целое число и  $-180^\circ < \alpha^\circ < 180^\circ$ :
- a)  $700^\circ$ ;      б)  $3500^\circ$ ;      в)  $-470^\circ$ ;      г)  $-2890^\circ$ .
  - 2) С помощью транспортира постройте на окружности начальную и конечную точки поворота на данный угол.

**217.** Выпишите все углы, модули которых не превышают  $1000^\circ$ :

    - 1)  $40^\circ + 360^\circ n$ ;      2)  $-70^\circ + 360^\circ n$  ( $n$  — целое число).

**218.** 1) Постройте точку  $P_{30^\circ}$  — конечную точку поворота на угол  $30^\circ$ . Постройте: а) квадрат; б) равносторонний треугольник с вершинами на окружности так, чтобы одной из вершин была точка  $P_{30^\circ}$ . Для каждой из вершин укажите общий вид углов поворота с конечной точкой в этой вершине.

2) В каждом случае задайте одним выражением общий вид всех таких углов.

**219.** 1) Постройте окружность с центром в начале координат. За начальную точку поворота возьмите точку её пересечения с осью абсцисс. Постройте точку  $P_{70^\circ}$  — конечную точку поворота на угол  $70^\circ$ .

2) Постройте точку  $P_{\beta^\circ}$  — конечную точку поворота на угол  $\beta^\circ$  так, чтобы точки  $P_{70^\circ}$  и  $P_{\beta^\circ}$  были симметричны:

    - а) относительно оси абсцисс;
    - б) относительно оси ординат;
    - в) относительно начала координат.

3) Для каждого случая укажите:

    - а) наименьшее по модулю значение  $\beta$ ;
    - б) наименьшее положительное значение  $\beta$ .

**220.** По окружности в противоположных направлениях движутся две точки, одна с угловой скоростью  $30$  градус/с, другая —  $45$  градус/с.

    - 1) Какое время проходит между двумя последовательными встречами точек?
    - 2) Сколько всего точек встречи?
    - 3) Через какое время после встречи обе точки снова встретятся в том же самом месте?



## Контрольные вопросы и задания

- Укажите какой-нибудь отрицательный угол, поворот на который имеет ту же конечную точку, что и поворот на угол  $100^\circ$ .
- Укажите общий вид углов, поворот на которые имеет конечную точку  $P_{195^\circ}$ .
- Постройте с помощью транспортира конечные точки поворотов на углы  $145^\circ$ ,  $215^\circ$  и  $-250^\circ$ .

## 13. Радианная мера угла

Уже в Древнем Вавилоне задолго до нашей эры углы измеряли в градусах. Градус, как вы знаете, — это  $\frac{1}{360}$  часть полного оборота. Иногда такая единица измерения оказывается слишком большой. Так, например, в артиллерии при указании цели углы измеряют в *тысячных* (шеститысячных долях полного оборота), которые были введены во Франции в конце XVIII в.

В этом пункте вы познакомитесь ещё с одним способом измерения углов, который наиболее часто применяют в математике.

Рассмотрим центральный угол в  $\alpha^\circ$ , которому соответствуют дуги двух произвольных концентрических окружностей: дуга  $A_1B_1$  длиной  $l_1$  и дуга  $A_2B_2$  длиной  $l_2$  (рис. 69). Обозначим радиусы этих окружностей соответственно через  $R_1$  и  $R_2$ .

Фигуры  $A_1OB_1$  и  $A_2OB_2$  подобны, поэтому отношение длины дуги, соответствующей центральному углу в  $\alpha^\circ$ , к радиусу окружности не зависит от размера окружности, а зависит только от величины угла  $\alpha^\circ$ .

Следовательно, частное  $\frac{l}{R}$  можно использовать для определения величины соответствующего центрального угла.

В том случае, когда длина дуги равна радиусу окружности  $\left(\frac{R}{R} = 1\right)$ , мы получаем угол в 1 радиан — единицу радианной меры угла.




Рис. 69

Центральный угол, опирающийся на дугу, длина которой равна радиусу окружности, называется углом в 1 радиан.

Чтобы установить связь между градусной и радианной мерами одного и того же угла, рассмотрим центральный угол в  $180^\circ$ . Он опирается на половину окружности — дугу длиной  $\pi R$ . Радианная мера этого угла равна  $\frac{\pi R}{R} = \pi$  рад. Таким образом,  $180^\circ = \pi$  рад. Разделив обе части равенства на 180, получим, что  $1^\circ = \frac{\pi}{180}$  рад. И наконец, умножив это равенство на  $\alpha$ , получим:

$$\alpha^\circ = \frac{\alpha\pi}{180} \text{ рад.}$$

Аналогично, из равенства  $\pi$  рад =  $180^\circ$  можно получить формулу перехода из радианной меры в градусную:

$$\alpha_{\text{рад}} = \frac{\alpha \cdot 180^\circ}{\pi}.$$

### Формулы перевода градусной меры в радианную и обратно

$$\alpha^\circ = \frac{\alpha\pi}{180} \text{ рад} \quad \alpha_{\text{рад}} = \frac{\alpha \cdot 180^\circ}{\pi}$$

**Пример 1.** Выразить в радианах величину угла:  $30^\circ$ ,  $40^\circ$ ,  $-480^\circ$ .

**Решение.** Воспользуемся формулой (1):

$$30^\circ = \frac{30 \cdot \pi}{180} = \frac{\pi}{6} \text{ рад}, \quad 40^\circ = \frac{40 \cdot \pi}{180} = \frac{2\pi}{9} \text{ рад},$$

$$-480^\circ = \frac{-480 \cdot \pi}{180} = -2\frac{2}{3}\pi \text{ рад.}$$

**Ответ:**  $\frac{\pi}{6}$ ,  $\frac{2\pi}{9}$ ,  $-2\frac{2}{3}\pi$ .

**Пример 2.** Выразить в градусах величину угла:

$$\frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{2}, -6 \text{ радиан.}$$

**Решение.** Воспользуемся формулой (2):

$$\frac{\pi}{3} \text{ рад} = \frac{\pi \cdot 180^\circ}{3 \cdot \pi} = 60^\circ, \quad \frac{3\pi}{2} \text{ рад} = \frac{3\pi \cdot 180^\circ}{2 \cdot \pi} = 270^\circ,$$

$$-6 \text{ рад} = \frac{-6 \cdot 180^\circ}{\pi} \approx \frac{-6 \cdot 180^\circ}{3,14} \approx -344^\circ.$$

**Ответ:**  $60^\circ, 270^\circ, -344^\circ$ .

Как отношение одноимённых величин, радианная мера угла является числом, поэтому обозначение *рад* обычно не указывают, записывая просто  $\frac{\pi}{3} = 60^\circ$ ,  $270^\circ = \frac{3\pi}{2}$ ,  $-30^\circ = -\frac{\pi}{6}$  и т. п. Таким образом, радианная мера позволяет использовать действительные числа для измерения углов, что особенно важно в математике, имеющей дело с числовыми множествами.

▼ Радианная мера углов позволяет значительно упростить многие формулы физики и математики. Выразим, например, с помощью радианной меры угла зависимость между угловой ( $\omega$ ) и линейной ( $v$ ) скоростями равномерного движения по окружности.

Пусть за  $t$  с материальная точка проходит по окружности радиуса  $R$  путь, равный  $l$ , и совершают при этом поворот вокруг центра окружности на угол  $\phi$ . Тогда линейная скорость точки  $v = \frac{l}{t}$ , а угловая её скорость  $\omega = \frac{\phi}{t}$ .

Из равенства  $\phi = \frac{l}{R}$  находим, что  $l = \phi R$ . Подставим произведение  $\phi R$  вместо  $l$  в формулу линейной скорости:

$$v = \frac{l}{t} = \frac{\phi R}{t} = \omega R. \triangle$$

Линейная скорость равномерного движения по окружности равна произведению угловой скорости на радиус окружности

$$v = \omega R.$$

Градусная мера углов обычно применяется при решении практических задач.

## Упражнения

**221.** Переведите угол из градусной меры в радианную:

- 1)  $0^\circ$ ;      3)  $20^\circ$ ;      5)  $125^\circ$ ;      7)  $-225^\circ$ ;  
 2)  $1^\circ$ ;      4)  $45^\circ$ ;      6)  $185^\circ$ ;      8)  $-375^\circ$ .

**222.** Переведите угол из радианной меры в градусную:

- 1)  $\pi$ ;      4)  $-0,3\pi$ ;      7)  $-\frac{7}{10}\pi$ ;  
 2)  $\frac{2\pi}{5}$ ;      5)  $\frac{\pi}{4}$ ;      8)  $1,8\pi$ ;  
 3)  $0,2\pi$ ;      6)  $2\pi$ ;      9)  $2$ .

**223.** Переведите угол из градусной меры в радианную, представляя результат в виде произведения  $k\pi$ , где  $k$  — рациональное число:

- 1)  $36^\circ$ ;      4)  $265^\circ$ ;      7)  $870^\circ$ ;  
 2)  $48^\circ$ ;      5)  $-120^\circ$ ;      8)  $1020^\circ$ ;  
 3)  $225^\circ$ ;      6)  $-135^\circ$ ;      9)  $-2510^\circ$ .

**224.** Запишите в таблицу радианные меры  $\phi$  указанных углов  $\alpha^\circ$ .

$\alpha^\circ$	$0^\circ$	$30^\circ$	$45^\circ$	$60^\circ$	$90^\circ$	$120^\circ$	$135^\circ$	$150^\circ$	$180^\circ$	$270^\circ$	$330^\circ$	$360^\circ$
$\phi$												

**225.** 1) На рисунке 70 в окружности проведены 8 диаметров. Скопируйте рисунок в тетрадь. У концов диаметров укажите углы поворотов в градусной и в радианной мере.

2) Укажите углы конечных точек поворотов, которые симметричны относительно:

- а) горизонтального диаметра;  
 б) вертикального диаметра.




Рис. 70

- 226.** Зная, что  $\frac{\pi}{180} \approx 0,0175$ , переведите в радианную меру величины углов:
- 1)  $20^\circ$ ;      4)  $-100^\circ$ ;      7)  $1030^\circ$ ;
  - 2)  $50^\circ$ ;      5)  $250^\circ$ ;      8)  $1300^\circ$ ;
  - 3)  $-80^\circ$ ;      6)  $310^\circ$ ;      9)  $-1600^\circ$ .
- 227.** Окружность морского компаса делится на 32 равные части, называемые румбами. Выразите румб в градусах и радианах.
- 228.** Углы треугольника относятся как  $1:2:6$ . Найдите их величины в радианах.
- 229.** Выразите в радианах угол, опирающийся на дугу длины  $2,15\text{ м}$  окружности, радиус которой равен  $1,24\text{ м}$ .
- 230.** 1) Вычислите площадь кругового сектора, угол которого равен  $1,32\text{ рад}$ , а радиус  $2,26\text{ м}$ .  
 2) Площадь кругового сектора равна  $0,38\text{ м}^2$ . Найдите угол сектора в радианах, если радиус круга равен  $1,52\text{ м}$ .
- 231.** ● Переведите из радианной меры в градусную, взяв  $\pi \approx 3,14$ :
- 1)  $0,25$ ;      3)  $-1,625$ ;      5)  $1,15$ ;      7)  $-4,382$ ;
  - 2)  $3,45$ ;      4)  $5,285$ ;      6)  $2,64$ ;      8)  $7,168$ .
- 232.** Напишите общий вид углов поворота вокруг начала координат, переводящих точку  $P(1; 0)$  окружности с центром в начале координат и радиусом, равным единице, в точку:  
 1)  $M(0; 1)$ ;      2)  $N(0; -1)$ ;      3)  $K(-1; 0)$ .
- 233.** Найдите угловые скорости часовой, минутной и секундной стрелок часов (в рад/с).
- 234.** 1) ○ С какой угловой скоростью  $\omega$  (рад/ч) Земля вращается вокруг своей оси?  
 2) ● С какой линейной скоростью  $v$  (км/ч) при этом движется точка экватора Земли, отстоящая от оси на расстояние  $6370\text{ км}$ ? Выполните вычисления с помощью двузначной таблицы логарифмов (см. с. 100).
- 235.** Шкив скоростного электродвигателя делает  $120\,000$  оборотов в минуту. Определите угловую скорость вращения этого шкива:  
 1) в градусах в секунду;      2) в радианах в секунду.

**236.** Что означает слово «радиальная» в словосочетаниях «радиальная линия метро», «радиальная планировка города»?

### ! Контрольные вопросы и задания

- Что такое угол в один радиан?
- Выразите:  
а) в градусах  $1,2\pi, -0,7\pi$ ;      б) в радианах  $64^\circ, -145^\circ$ .
- Постройте на окружности начальную и конечную точки поворота на угол:  $135^\circ, \frac{3\pi}{4}, -\frac{5\pi}{6}$ .

## 14. Синус и косинус любого угла

При решении прямоугольных треугольников находят синус и косинус острых углов. В теоремах синусов и косинусов для косоугольных треугольников появляются и тупые углы.

Теперь нам предстоит находить синусы и косинусы произвольных углов, с которыми вы познакомились в двух предыдущих пунктах. Но сначала напомним, как определяется синус и косинус острого угла в прямоугольном треугольнике (рис. 71).




Рис. 71

**Синус угла равен**

отношению противолежащего катета к гипотенузе.

$$\sin \alpha^\circ = \frac{a}{c}.$$

**Косинус угла равен**

отношению прилежащего катета к гипотенузе.

$$\cos \alpha^\circ = \frac{b}{c}.$$

Полезно помнить значения синусов и косинусов некоторых острых углов.

$\alpha^\circ$	$30^\circ$	$45^\circ$	$60^\circ$
$\varphi$ рад	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$
$\sin \varphi$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos \varphi$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$




Рис. 72




Рис. 73

Синус и косинус произвольного угла придётся определять по-другому. Рассмотрим для этого *единичную окружность* — окружность с центром в начале координат и радиусом 1.

Пусть, двигаясь по этой окружности, точка перешла из начальной точки  $P_0(1; 0)$  в конечную точку  $P_\varphi$  (рис. 72). Положение точки  $P_\varphi$  можно определить двумя способами: указав величину угла  $\varphi$  или указав её координаты  $x$  и  $y$  в данной системе координат.

Для углов от  $0$  до  $\frac{\pi}{2}$  (от  $0^\circ$  до  $90^\circ$ ) координаты точки  $P_\varphi$  найдём из прямоугольного треугольника  $P_\varphi CO$  (см. рис. 72), гипotenуза которого равна 1:

$$x = \cos \varphi, \quad y = \sin \varphi.$$

Равенства остаются верными для любых углов, если определить косинус и синус следующим образом.

**Синусом угла  $\varphi$**  называется ордината конечной точки поворота точки  $(1; 0)$  вокруг начала координат на угол  $\varphi$ .

$$y = \sin \varphi$$

**Косинусом угла  $\varphi$**  называется абсцисса конечной точки поворота точки  $(1; 0)$  вокруг начала координат на угол  $\varphi$ .

$$x = \cos \varphi$$

Таким образом, *абсцисса любой точки единичной окружности равна косинусу, а её ордината — синусу соответствующего угла* (рис. 73).

Рассматривая  $\varphi$  как переменную, заметим, что любому её значению соответствует единственное значение выражения

$\cos \varphi$  и единственное значение выражения  $\sin \varphi$ . Следовательно, формулы

$$x = \cos \varphi \text{ и } y = \sin \varphi$$

задают *функции* переменной  $\varphi$ .

**✓ Пример 1.** Найти синус и косинус угла  $310^\circ$ .

**Решение.** Построим единичную окружность с центром в начале координат. Точка  $P_0(1; 0)$  — начальная точка поворота (рис. 74).

Поворот на угол  $310^\circ$  можно заменить одним полным оборотом на  $360^\circ$  и поворотом на угол  $-50^\circ$ :  $310^\circ = 360^\circ - 50^\circ$ .

Отложим от начальной точки  $P_0$  с помощью транспортира угол, равный  $-50^\circ$ , и найдём координаты точки  $P_{310^\circ}$  — конечной точки поворота на угол  $310^\circ$ :  $x \approx 0,64$ ,  $y \approx -0,77$ .

**Ответ:**  $\cos 310^\circ \approx 0,64$ ,  $\sin 310^\circ \approx -0,77$ .

В зависимости от величины угла конечная точка может оказаться в любой из четырёх координатных четвертей.

По положению конечной точки углы называют углами I, II, III или IV четверти.

В рассмотренной задаче конечная точка находилась в IV четверти (см. рис. 74), значит,  $310^\circ$  — угол IV четверти.

**✓ Пример 2.** Найти приближённо углы, косинусы которых равны 0,8.

**Решение.** Косинус — это абсцисса соответствующей точки единичной окружности. Все точки с абсциссами, равными 0,8, принадлежат прямой, параллельной оси ординат и проходящей через точку  $C(0,8; 0)$  (рис. 75). Эта прямая пере-




Рис. 74




Рис. 75

секает единичную окружность в двух точках:  $P_{\alpha^\circ}$  и  $P_{\beta^\circ}$ , симметричных относительно оси абсцисс.

С помощью транспортира находим, что угол  $\alpha^\circ$  приблизённо равен  $37^\circ$ . Значит, общий вид углов поворота с конечной точкой  $P_{\alpha^\circ}$ :

$$\alpha^\circ \approx 37^\circ + 360^\circ n, \text{ где } n \text{ — любое целое число.}$$

В силу симметрии относительно оси абсцисс точка  $P_{\beta^\circ}$  — конечная точка поворота на угол  $-37^\circ$ . Значит, для неё общий вид углов поворота:

$$\beta^\circ \approx -37^\circ + 360^\circ n, \text{ где } n \text{ — любое целое число.}$$

**Ответ:**  $37^\circ + 360^\circ n, -37^\circ + 360^\circ n$ , где  $n$  — любое целое число.



### Пример 3. Найти углы, синусы которых равны 0,5.

**Решение.** Синус — это ордината соответствующей точки единичной окружности. Все точки с ординатами, равными 0,5, принадлежат прямой, параллельной оси абсцисс и проходящей через точку  $D(0; 0,5)$  (рис. 76).

Эта прямая пересекает единичную окружность в двух точках:  $P_\varphi$  и  $P_{\pi-\varphi}$ , симметричных относительно оси ординат.

В прямоугольном треугольнике  $OKP_\varphi$  катет  $KP_\varphi$  равен половине гипotenузы  $OP_\varphi$ , значит,  $\varphi = \frac{\pi}{6}$ .

Общий вид углов поворота с конечной точкой  $P_\varphi$ :

$$\frac{\pi}{6} + 2\pi n,$$

где  $n$  — любое целое число.

Общий вид углов поворота с конечной точкой  $P_{\pi-\varphi}$ :

$$\pi - \frac{\pi}{6} + 2\pi n = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n,$$

где  $n$  — любое целое число.

$$\text{Ответ: } \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{5\pi}{6} + 2\pi n,$$

где  $n$  — любое целое число.




Рис. 76

## Упражнения

**237.** 1) Даны координаты точки  $P_\alpha$  единичной окружности. Укажите  $\sin \alpha$  и  $\cos \alpha$ :

а)  $\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ; в)  $\left(-\frac{1}{3}; \frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ ;

б)  $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}\right)$ ; г)  $\left(-\frac{3}{5}; -\frac{4}{5}\right)$ .

2) В какой координатной четверти расположена каждая точка?

**238.** Определите, в какой координатной четверти находится  $P_\alpha$  — конечная точка поворота на угол  $\alpha$  и каковы знаки  $\cos \alpha$  и  $\sin \alpha$ , если угол  $\alpha$  равен:

- |                  |                   |                    |
|------------------|-------------------|--------------------|
| 1) $260^\circ$ ; | 4) $480^\circ$ ;  | 7) $8760^\circ$ ;  |
| 2) $290^\circ$ ; | 5) $-915^\circ$ ; | 8) $8000^\circ$ ;  |
| 3) $565^\circ$ ; | 6) $-825^\circ$ ; | 9) $-9000^\circ$ . |

**239.** Используя рисунок единичной окружности, определите знаки  $\cos \beta$  и  $\sin \beta$ , если:

1)  $\textcolor{lightgreen}{\bullet} \beta = \frac{4\pi}{9}$ ; 3)  $\textcolor{lightgreen}{\bullet} \beta = -\frac{5\pi}{9}$ ; 5)  $\textcolor{darkgreen}{\bullet} \beta = 5,5$ ;

2)  $\textcolor{lightgreen}{\bullet} \beta = -1,6\pi$ ; 4)  $\textcolor{lightgreen}{\bullet} \beta = 1,2\pi$ ; 6)  $\textcolor{darkgreen}{\bullet} \beta = 4,8$ .

**240.** С помощью единичной окружности найдите:

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1) $\sin 1115^\circ$ ; | 3) $\sin (-2120^\circ)$ ; |
| 2) $\cos 1490^\circ$ ; | 4) $\cos (-2030^\circ)$ . |

**241.** Найдите общий вид углов, для которых число:

1) 0,4; 3)  $-0,6$ ; 5)  $\frac{2}{3}$ ;

2) 0,7; 4)  $-0,3$ ; 6)  $-\frac{3}{4}$

является: а) синусом; б) косинусом.

**242.** В каких координатных четвертях знаки синуса и косинуса:

- 1) совпадают; 2) противоположны?

**243.** Постройте точку  $P_\alpha$  и найдите  $\cos \alpha$  и  $\sin \alpha$ , если:

1)  $\alpha^\circ = 72^\circ$ ; 2)  $\alpha^\circ = 320^\circ$ ; 3)  $\alpha^\circ = 105^\circ$ ; 4)  $\alpha^\circ = 215^\circ$ .

**244.** Найдите углы:

- 1) синус которых равен: а) 0,5; б) -0,5;  
 2) косинус которых равен: а) 0,5; б) -0,5.

**245.** Найдите значение выражения:

- 1)  $3 \sin 90^\circ - 2 \cos 270^\circ$ ; 4)  $2 \sin 270^\circ - 3 \cos 180^\circ$ ;  
 2)  $4 \cos 0^\circ - 3 \sin 270^\circ$ ; 5)  $3 \cos 270^\circ + 5 \sin 0^\circ$ ;  
 3)  $\sin \frac{\pi}{2} - \cos \frac{\pi}{2}$ ; 6)  $\sin \frac{3\pi}{2} \cos \pi$ .

**246.** Для каких углов от  $0^\circ$  до  $360^\circ$ :

- 1) синус равен косинусу;  
 2) синус противоположен косинусу;  
 3) синус и косинус имеют равные модули;  
 4) синус больше косинуса;  
 5) синус меньше косинуса?

**247.** Заполните таблицу.

$\alpha^\circ$	$0^\circ$	$30^\circ$	$45^\circ$	$60^\circ$	$90^\circ$	$120^\circ$	$135^\circ$	$150^\circ$
$\varphi$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$				
$\sin \varphi$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$				
$\cos \varphi$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$				
$\alpha^\circ$	$180^\circ$	$210^\circ$	$225^\circ$	$240^\circ$	$270^\circ$	$300^\circ$	$315^\circ$	$330^\circ$
$\varphi$								
$\sin \varphi$								
$\cos \varphi$								

**248.** Найдите углы треугольника  $x$ ,  $y$  и  $z$  в радианах, если

$$\frac{\sin x}{1} = \frac{\sin y}{\sqrt{3}} = \frac{\sin z}{2}.$$

**249.** Имеет ли смысл выражение:

1)  $\sqrt{\sin 165^\circ}$ ;

6)  $\log_3 \cos \frac{11\pi}{5}$ ;

2)  $\lg \sin 195^\circ$ ;

7)  $\sqrt{\sin 40^\circ - \cos 40^\circ}$ ;

3)  $\log_{0,5} \cos 243^\circ$ ;

8)  $\log_{0,6} (\sin 50^\circ - \cos 50^\circ)$ ;

4)  $\sqrt{\cos 287^\circ}$ ;

9)  $\ln (\sin 1 - \cos 1)$ ;

5)  $\sqrt{\cos \frac{4\pi}{7}}$ ;

10)  $\sqrt{\sin 7 - \cos 7}$ ?

**250.** Укажите все значения  $\varphi$  из промежутка  $[0; 2\pi]$ , для которых верно равенство:

1)  $\sin \varphi = 1$ ;

3)  $\sin \varphi = -1$ ;

2)  $\cos \varphi = 1$ ;

4)  $\cos \varphi = -1$ .

**251.** Запишите общий вид углов  $\varphi$ , для которых верно равенство:

1)  $\sin \varphi = 0$ ;

2)  $\cos \varphi = 0$ .

**252.** Укажите все значения  $\varphi$ , при которых не имеет смысла выражение:

1)  $\frac{\sin \varphi}{\cos \varphi}$ ;

3)  $\frac{\cos \varphi}{1 - \sin \varphi}$ ;

5) \*  $\lg \frac{\cos \varphi}{1 + \sin \varphi}$ ;

2)  $\frac{\cos \varphi}{\sin \varphi}$ ;

4)  $\frac{\sin \varphi}{1 + \cos \varphi}$ ;

6) \*  $\lg \frac{\sin \varphi}{1 - \sin \varphi}$ .

**253.** Объясните, как получена цепочка равенств:

1)  $\cos \frac{\pi}{2} = \cos \frac{5\pi}{2} = \cos \frac{9\pi}{2} = \cos \left( -\frac{3\pi}{2} \right) = \cos \left( \frac{7\pi}{2} \right)$ ;

2)  $\sin \pi = \sin (-\pi) = \sin 3\pi = \sin (-3\pi)$ .

**254.** 1) Сравните числовые значения:

а)  $\sin \frac{\pi}{6}$  и  $\sin \left( -\frac{\pi}{6} \right)$ ;

б)  $\cos \frac{\pi}{6}$  и  $\cos \left( -\frac{\pi}{6} \right)$ .

2) Какие предположения о последствиях изменения знака аргумента синуса и косинуса можно высказать?



## Контрольные вопросы и задания

- Что называется синусом и косинусом любого угла  $\varphi$ ?
- Выполнив необходимые построения и измерения, найдите косинус и синус угла  $150^\circ$ .
- В какой четверти находится каждый из следующих углов  $0,8\pi, 1,3\pi, 1,7\pi$ ? Какие знаки имеют его синус и косинус?

## 15. Тангенс и котангенс любого угла

В курсе геометрии вы познакомились с тангенсом острого угла, равным частному синуса и косинуса этого угла:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi}.$$

С помощью этого равенства можно определить тангенс любого угла  $\varphi$ , косинус которого отличен от нуля.

**Тангенсом угла называется частное синуса и косинуса этого угла.**

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi}$$

Для углов, косинусы которых равны нулю, т. е. углов вида  $\frac{\pi}{2} + \pi n$  ( $n$  — любое целое число), тангенс не существует.

Косинус и синус любого угла изображаются как абсцисса и ордината соответствующей точки единичной окружности. Единичная окружность поможет и при изображении тангенса.

На рисунке 77 к единичной окружности в точке  $P_0$  проведена касательная;  $P_\varphi$  — конечная точка поворота на угол  $\varphi$ ;  $C$  — точка пересечения касательной и прямой  $OP_\varphi$ .




Рис. 77

*Ордината точки  $C$  равна тангенсу угла  $\phi$ .*

▼ Докажем это. Заметим сначала, что  $\operatorname{tg} \phi$  и ордината точки  $C$  одинаковы по знаку. Так, если  $P_\phi$  — точка I или III координатной четверти, то  $\cos \phi$  и  $\sin \phi$  или оба положительны (рис. 77, а), или оба отрицательны (рис. 77, в). Значит, их частное  $\operatorname{tg} \phi$  положительно. Точка  $C$  в этих случаях расположена в верхней полуплоскости и, следовательно, имеет положительную ординату.

Если же точка  $P_\phi$  находится во II или в IV координатной четверти, то знаки  $\cos \phi$  и  $\sin \phi$  различны (рис. 77, б, г), следовательно,  $\operatorname{tg} \phi$  отрицателен. Точка  $C$  при этом находится в нижней полуплоскости и имеет отрицательную ординату.

Остается показать, что  $|P_0C| = |\operatorname{tg} \phi|$ . Это равенство следует из подобия треугольников  $P_0OC$  и  $DOP_\phi$  (см. рис. 77):

$$\frac{|P_0C|}{1} = \frac{|DP_\phi|}{|OD|} = \frac{|\sin \phi|}{|\cos \phi|} = |\operatorname{tg} \phi|.$$

Итак, утверждение доказано.  $\triangle$

*Касательную, проведённую к единичной окружности в точке  $P_0$ , называют осью тангенсов.*

Наверное, поэтому математик Т. Финк в конце XVI в. назвал отношение синуса к косинусу «тангенсом», что в переводе с латыни означает «касающийся».

Прямая  $OC$  проходит через начало координат, её уравнение, как вы знаете,  $y = kx$ .

При  $x = 1$  получаем  $y = k$ , т. е. угловой коэффициент прямой  $y = kx$  равен ординате точки  $C$ . Значит,

$$k = \operatorname{tg} \phi.$$

Угол  $\phi$ , образованный в верхней полуплоскости прямой  $y = kx$  и лучом  $Ox$ , называют углом наклона прямой. Такие же углы образуют с положительным направлением оси абсцисс все прямые  $y = kx + b$ :

*угловой коэффициент прямой  $y = kx + b$  равен тангенсу её угла наклона.*

В тригонометрии наряду с синусом, косинусом и тангенсом рассматривают котангенс угла.

**Котангенсом угла называется частное косинуса и синуса этого угла.**

$$\operatorname{ctg} \varphi = \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi}$$

Это равенство позволяет определить котангенс любого угла, синус которого отличен от нуля, т. е.

$\varphi \neq \pi n$ ,  $n$  — любое целое число.



**Пример 1.** Найти тангенс и котангенс угла  $220^\circ$ .

**Решение.** Построим единичную окружность с центром в начале координат и проведём ось тангенсов. Отметим на окружности с помощью транспортира точку  $P_{220^\circ}$  ( $220^\circ = 360^\circ - 140^\circ$ ). Через точку  $P_{220^\circ}$  и начало координат проведём прямую — она пересечёт ось тангенсов в точке  $C$  (рис. 78). Ордината этой точки приближённо равна 0,84. Значит,

$$\operatorname{tg} 220^\circ \approx 0,84.$$

Заметив, что

$$\operatorname{ctg} \varphi = \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi} = \frac{1}{\frac{\sin \varphi}{\cos \varphi}} = \frac{1}{\operatorname{tg} \varphi},$$

найдём:

$$\operatorname{ctg} 220^\circ = \frac{1}{\operatorname{tg} 220^\circ} \approx \frac{1}{0,84} \approx 1,2.$$

Ответ:  $\operatorname{tg} 220^\circ \approx 0,84$ ,  $\operatorname{ctg} 220^\circ \approx 1,2$ .

Можно было для вычисления значения котангенса воспользоваться осью котангенсов (рис. 79). Абсцисса точки




Рис. 78




Рис. 79

пересечения прямой, касающейся единичной окружности в точке  $(0; 1)$ , с прямой  $OP_\phi$  равна котангенсу угла  $\phi$ .

Доказательство этого факта аналогично доказательству, проведённому для оси тангенсов.

**Пример 2.** Найти общий вид углов, тангенс которых равен  $-1,2$ .

**Решение.** Отметим на оси тангенсов точку  $C$  с ординатой, равной  $-1,2$ , и проведём прямую  $OC$ . Прямая  $OC$  пересекает единичную окружность в точках  $P_{\alpha^\circ}$  и  $P_{\beta^\circ}$  — концах одного и того же диаметра (рис. 80). Углы, соответствующие этим точкам, отличаются друг от друга на целое число полуоборотов, т. е. на  $180^\circ n$  ( $n$  — целое число). С помощью транспортира находим, что угол  $P_{\alpha^\circ}OP_0$  равен  $-50^\circ$ . Значит, общий вид углов, тангенс которых равен  $-1,2$ , следующий:  $-50^\circ + 180^\circ n$  ( $n$  — целое число).

Ответ:  $-50^\circ + 180^\circ n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ .

По синусу и косинусу углов  $30^\circ$ ,  $45^\circ$  и  $60^\circ$  легко найти их тангенсы и котангенсы. Например,

$$\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{\sin 30^\circ}{\cos 30^\circ} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Перечисленные углы довольно часто встречаются в разных задачах, поэтому полезно запомнить значения тангенса и котангенса этих углов.




Рис. 80

$\alpha^\circ$	$30^\circ$	$45^\circ$	$60^\circ$
$\phi$ рад	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$
$\operatorname{tg} \phi$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$
$\operatorname{ctg} \phi$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$

## Упражнения

- 255.** Даны координаты точки  $P_\alpha$  на единичной окружности. Вычислите  $\sin \alpha$ ,  $\cos \alpha$ ,  $\operatorname{tg} \alpha$ ,  $\operatorname{ctg} \alpha$ :

  - 1)  $\left(-\frac{3}{5}; \frac{4}{5}\right)$ ;      3)  $\left(\frac{12}{13}; -\frac{5}{13}\right)$ ;
  - 2)  $\left(-\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ;      4)  $\left(\frac{2}{3}; \frac{\sqrt{5}}{3}\right)$ .

**256.** Определите знак выражения:

  - 1)  $\operatorname{tg} 148^\circ$ ;      7)  $\operatorname{ctg} \frac{\pi}{4} \operatorname{tg} \frac{3\pi}{5}$ ;
  - 2)  $\operatorname{ctg} 248^\circ$ ;      8)  $\operatorname{tg} \frac{2\pi}{5} \operatorname{ctg} \frac{5\pi}{4}$ ;
  - 3)  $\operatorname{ctg} 348^\circ$ ;      9)  $\operatorname{tg} 68^\circ - \sin 68^\circ$ ;
  - 4)  $\operatorname{tg} 548^\circ$ ;      10)  $\operatorname{tg} 125^\circ + \sin 125^\circ$ ;
  - 5)  $\operatorname{tg} 230^\circ \sin 130^\circ$ ;      11)  $\operatorname{tg} 1,7\pi - \sin 1,7\pi$ ;
  - 6)  $\cos 285^\circ \operatorname{ctg} 185^\circ$ ;      12)  $\operatorname{tg} 1,2\pi + \sin 1,2\pi$ .

**257.** В каких координатных четвертях синус и тангенс имеют: 1) одинаковые знаки; 2) разные знаки?

**258.** 1) В каких четвертях тангенс и котангенс:  
а) положительны;      б) отрицательны?  
2) Могут ли тангенс и котангенс одного угла иметь разные знаки?

**259.** С помощью оси тангенсов найдите:

  - 1)  $\operatorname{tg} 72^\circ$ ;      3)  $\operatorname{tg} 126^\circ$ ;      5)  $\operatorname{ctg} 215^\circ$ ;
  - 2)  $\operatorname{tg} 40^\circ$ ;      4)  $\operatorname{tg} 310^\circ$ ;      6)  $\operatorname{ctg} 165^\circ$ .

**260.** Найдите общий вид углов, тангенс которых равен:  
1) 1,3;      2) 0,7;      3) -0,4;      4) -1,7.

**261.** Для каких углов от  $0^\circ$  до  $360^\circ$ :  
1) тангенс равен котангенсу;  
2) тангенс противоположен котангенсу;  
3) тангенс больше котангенса;  
4) тангенс меньше котангенса?

**262.** Докажите, что синус острого угла меньше тангенса того же угла.

**263.** С помощью единичной окружности определите, имеет ли смысл выражение:

$$1) \sqrt{\operatorname{tg} 2}; \quad 2) \lg \operatorname{tg} 4; \quad 3) \sqrt[4]{\operatorname{tg} 5}; \quad 4) \lg \operatorname{tg} 6.$$

**264.** Докажите, что абсцисса точки пересечения прямой  $OP_\varphi$  с осью котангенсов равна  $\operatorname{ctg} \varphi$ .

**265.** Заполните таблицу.

$\alpha^\circ$	$0^\circ$	$30^\circ$	$45^\circ$	$60^\circ$	$90^\circ$	$120^\circ$	$135^\circ$	$150^\circ$	$180^\circ$
$\varphi$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$						
$\operatorname{tg} \varphi$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1		—				
$\operatorname{ctg} \varphi$	—	$\sqrt{3}$							

**266.** Вычислите:

$$1) \operatorname{tg} \pi \cdot \cos \frac{\pi}{2}; \quad 3) \cos \frac{\pi}{6} + \operatorname{tg} \frac{\pi}{4};$$

$$2) \operatorname{ctg} \frac{\pi}{3} + \operatorname{tg} \frac{\pi}{3}; \quad 4) 2 \cos \frac{3\pi}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{tg} \pi.$$

**267.** Проверьте справедливость равенства

$$\cos 30^\circ + \operatorname{tg} 45^\circ - 1 = \operatorname{ctg} 60^\circ (1 + \sin^2 45^\circ).$$

**268.** Найдите все углы  $\varphi$ , при которых верно равенство:

$$1) \operatorname{tg} \varphi = 0; \quad 2) \operatorname{ctg} \varphi = 0; \quad 3) \operatorname{tg} \varphi = 1; \quad 4) \operatorname{tg} \varphi = -1.$$

**269.** Найдите все углы  $\varphi$  из промежутка  $[0; 2\pi]$ , для которых верно равенство:

$$1) \operatorname{tg} \varphi = \sqrt{3}; \quad 4) \operatorname{tg} \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{3};$$

$$2) \operatorname{ctg} \varphi = \sqrt{3}; \quad 5) \lg \operatorname{tg} \varphi = \lg \sin \varphi - \lg \cos \varphi;$$

$$3) \operatorname{tg} \varphi = -\sqrt{3}; \quad 6) \lg \operatorname{ctg} \varphi = \lg \cos \varphi - \lg \sin \varphi.$$

**270.** Укажите все углы  $\varphi$ , для которых не имеет смысла выражение:

$$1) \frac{1}{\operatorname{tg} \varphi}; \quad 3) \frac{1}{\operatorname{tg} \varphi - 1}; \quad 5) \lg \operatorname{tg} \varphi;$$

$$2) \frac{1}{\operatorname{ctg} \varphi}; \quad 4) \frac{1}{\operatorname{tg} \varphi + 1}; \quad 6) \lg \operatorname{ctg} \varphi.$$

- 271.** Запишите уравнение прямой, если известно, что она проходит: 1) через начало координат; 2) через точку с координатами  $(0; 3)$  и её угол наклона равен:  
 а)  $30^\circ$ ;      б)  $45^\circ$ ;      в)  $120^\circ$ ;      г)  $135^\circ$ .
- 272.** Что больше:  
 1)  $\sin 1^\circ$  или  $\sin 1$ ;      3)  $\sin 15^\circ$  или  $\sin 15$ ;  
 2)  $\operatorname{tg} 1$  или  $\operatorname{tg} 2$ ;      4)  $\cos 3$  или  $\cos 4$ ?



### Контрольные вопросы и задания

- Что называется тангенсом и котангенсом любого угла  $\varphi$ ?
- При каких значениях  $\varphi$  выражение  $\operatorname{ctg} \varphi \operatorname{tg} \varphi$  не имеет смысла? Докажите, что равенство  $\operatorname{ctg} \varphi \operatorname{tg} \varphi = 1$  верно при всех допустимых значениях  $\varphi$ .
- С помощью оси тангенсов найдите  $\operatorname{tg}(-40^\circ)$ .

## 16. Простейшие тригонометрические уравнения

В предыдущих пунктах вы уже находили угол по значению его синуса, косинуса, тангенса или котангенса.

Уравнения вида

$$\sin \varphi = a, \quad \cos \varphi = a, \quad \operatorname{tg} \varphi = a, \quad \operatorname{ctg} \varphi = a$$

называются простейшими тригонометрическими уравнениями.

В дальнейшем будут встречаться различные тригонометрические уравнения, однако все они в процессе решения будут сводиться к простейшим. Естественно поэтому сначала выяснить, как решаются простейшие тригонометрические уравнения.

### Уравнение $\sin \varphi = a$

Прямая  $y = a$  при  $-1 < a < 1$  пересекает окружность в двух точках  $P_\varphi$  и  $P_{\pi - \varphi}$  (рис. 81). Число  $\varphi$ , принадлежащее промежутку  $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ , синус которого равен  $a$ , называют **арксинусом  $a$** . Обозначение:  $\arcsin a$  («arc» означает «дуга»,

а целиком « $\arcsin a$ » можно перевести как «угол, синус которого равен  $a$ »).

Из рисунка 81 видно, что уравнение  $\sin \varphi = a$  при  $-1 < a < 1$  имеет две серии корней.

- $$\sin \varphi = a,$$
- 1)  $\varphi = \arcsin a + 2\pi n,$
  - 2)  $\varphi = \pi - \arcsin a + 2\pi n,$   
 $n$  — любое целое число.




Рис. 81

Выражение для второй серии корней можно несколько упростить, записав:

$$\varphi = -\arcsin a + (2n + 1)\pi.$$

Решение каждого из уравнений  $\sin \varphi = 1$  и  $\sin \varphi = -1$ , как вы уже видели, записывается в виде одной серии корней.

$$\sin \varphi = 1, \varphi = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$$

$$\sin \varphi = -1, \varphi = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

### Уравнение $\cos \varphi = a$

В данном случае надо рассмотреть прямую, перпендикулярную оси абсцисс, которая при  $-1 < a < 1$  пересекает окружность в двух точках  $P_\varphi$  и  $P_{-\varphi}$  (рис. 82). Как и в предыдущем случае, для числа  $\varphi$  вводят специальное название «арккосинус  $a$ » — корень уравнения  $\cos x = a$ , принадлежащий промежутку  $[0; \pi]$  (на рис. 82 соответствующая дуга единичной окружности выделена); обозначают арккосинус числа  $a$ :  $\arccos a$  (угол, косинус которого равен  $a$ ).

Из рисунка видно, что уравнение  $\cos \varphi = a$  при  $-1 < a < 1$  имеет две серии корней.

- $$\cos \varphi = a,$$
- $\varphi_1 = \arccos a + 2\pi n,$
  - $\varphi_2 = -\arccos a + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$




Рис. 82

Как и в случае синуса, решение каждого из уравнений  $\cos \varphi = 1$  и  $\cos \varphi = -1$  записывается в виде одной серии корней.

$$\begin{aligned}\cos \varphi &= 1, \varphi = 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \\ \cos \varphi &= -1, \varphi = \pi(2n + 1), n \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

Отметим, что если число  $a$  больше 1 или меньше  $-1$ , то ни уравнение  $\sin \varphi = a$ , ни уравнение  $\cos \varphi = a$  корней не имеют.

### Уравнения $\operatorname{tg} \varphi = a$ и $\operatorname{ctg} \varphi = a$

Решения уравнений  $\operatorname{tg} \varphi = a$  и  $\operatorname{ctg} \varphi = a$  проиллюстрируем с помощью осей тангенсов и котангенсов (рис. 83).




Рис. 83

Ясно, что число  $a$  в этих уравнениях может быть любым.

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} \varphi &= a, \\ \varphi &= \operatorname{arctg} a + \pi n, n \in \mathbb{Z},\end{aligned}$$

$$-\frac{\pi}{2} < \operatorname{arctg} a < \frac{\pi}{2},$$

т. е.  $\operatorname{arctg} a$  — угол из промежутка  $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ , тангенс которого равен  $a$ ,

$$\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} a) = a.$$

$$\begin{aligned}\operatorname{ctg} \varphi &= a, \\ \varphi &= \operatorname{arcctg} a + \pi n, n \in \mathbb{Z},\end{aligned}$$

$$0 < \operatorname{arcctg} a < \pi,$$

т. е.  $\operatorname{arcctg} a$  — угол из промежутка  $(0; \pi)$ , котангенс которого равен  $a$ ,

$$\operatorname{ctg}(\operatorname{arcctg} a) = a.$$

**✓ Пример 1.** Найти корни уравнения  $2 \sin x + \sqrt{3} = 0$ , принадлежащие промежутку  $[0; 2\pi]$ .

**Решение.** Заменим данное уравнение простейшим уравнением  $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ . Его корни:

$$1) x = \arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$$

$$2) x = \pi - \arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Из рисунка 84 видно, что

$$\arcsin(-a) = -\arcsin a.$$

С учётом этого можно записать:

$$\arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\arcsin\frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{\pi}{3}.$$

Продолжая решение уравнения, получим:

$$1) x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \quad 2) x = \pi + \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Будем подставлять в эти две серии решений целые значения  $n$  и определять, принадлежат ли получаемые при этом решения промежутку  $[0; 2\pi]$ .

При  $n = 1$  имеем

$$x_1 = -\frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{5\pi}{3}.$$

Другие решения этой серии выходят за границы промежутка, поскольку отстоят от  $x_1$  не меньше, чем на  $2\pi$ , а границы промежутка отличаются от  $x_1$  меньше, чем на  $2\pi$ .

Аналогично получаем единственное решение второй серии, входящее в указанный промежуток при  $n = 0$ :

$$x_2 = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}.$$

Ответ:  $\frac{5\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$ .




Рис. 84

**П р и м е ч а н и е.** Получив простейшее уравнение  $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ , можно было изобразить его решения на единичной окружности (рис. 85) и сразу записать ответ.

**✓ Пример 2.** Найти значение  $\arccos \left( \cos \frac{3\pi}{5} \right)$ .

**Р е ш е н и е.** Для любого  $a$  из промежутка  $[0; \pi]$   
 $\arccos (\cos a) = a$ .

Поскольку  $0 \leqslant \frac{3\pi}{5} \leqslant \pi$ ,  $\arccos \left( \cos \frac{3\pi}{5} \right) = \frac{3\pi}{5}$ .

**О т в е т:**  $\frac{3\pi}{5}$ .

**✓ Пример 3.** Решить уравнение  $7 \operatorname{tg}^2 x - \operatorname{tg} x - 6 = 0$ .

**Р е ш е н и е.** Обозначим  $\operatorname{tg} x$  буквой  $y$ , тогда данное уравнение примет вид

$$7y^2 - y - 6 = 0.$$

Его корни:  $y_1 = 1$ ,  $y_2 = -\frac{6}{7}$ . Возвращаясь к переменной  $x$ , получим:

$$1) \operatorname{tg} x = 1, x = \frac{\pi}{4} + \pi n \quad (n \text{ — любое целое число});$$

$$2) \operatorname{tg} x = -\frac{6}{7}, x = \operatorname{arctg} \left( -\frac{6}{7} \right) + \pi n \quad (n \text{ — любое целое число}).$$

Заметим, что  $\operatorname{arctg} \left( -\frac{6}{7} \right) = -\operatorname{arctg} \frac{6}{7}$  (рис. 86).




Рис. 85




Рис. 86

Поэтому вторую серию решений можно записать так:

$$x = \pi n - \operatorname{arctg} \frac{6}{7} \quad (n \text{ — любое целое число}).$$

Ответ:  $\frac{\pi}{4} + \pi n, \pi n - \operatorname{arctg} \frac{6}{7}$  ( $n \text{ — любое целое число}$ ).

## Упражнения

- 273.** Используя таблицу значений синусов и косинусов, полученную при выполнении задания 265, заполните таблицу.

$\alpha$	-1	1	0	0,5	-0,5	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\arcsin \alpha$									
$\arccos \alpha$									

- 274.** Используя таблицу значений тангенсов и котангенсов, полученную при выполнении задания 247, заполните таблицу.

$\alpha$	-1	1	0	$\sqrt{3}$	$-\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\operatorname{arctg} \alpha$							
$\operatorname{arcctg} \alpha$							

- 275.** Постройте угол, равный:

1)  $\arcsin \frac{4}{5};$

3)  $\operatorname{arctg} 2;$

2)  $\arccos \left( -\frac{3}{4} \right);$

4)  $\operatorname{arcctg} \left( -\frac{1}{4} \right).$

- 276.** Используя графическую иллюстрацию, определите знак разности:

1)  $\arcsin \frac{3}{4} - \arcsin 1;$

3)  $\operatorname{arctg} 1 - \operatorname{arctg} 4;$

2)  $\arccos \frac{3}{4} - \arccos 1;$

4)  $\operatorname{arcctg} 3 - \operatorname{arcctg} 1,5.$

**277.** В каких границах заключён угол:

1)  $\frac{1}{2} \arcsin p$ ;

3)  $\frac{\pi}{2} + \operatorname{arctg} p$ ;

2)  $2 \arccos p$ ;

4)  $\pi + \operatorname{arcctg} p$ ?

**278.** Вычислите:

1)  $\arcsin \frac{1}{2}$ ;

4)  $\operatorname{arcctg} \sqrt{3}$ ;

7)  $\operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{3}$ ;

2)  $\arccos \left( -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ ;

5)  $\arccos 0$ ;

8)  $\operatorname{arcctg} 0$ ;

3)  $\operatorname{arctg} (-1)$ ;

6)  $\arcsin 1$ ;

9)  $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

**279.** Найдите значение выражения:

1)  $\arccos \left( \cos \frac{\pi}{6} \right)$ ;

4)  $\operatorname{arcctg} (\operatorname{ctg} 1)$ ;

2)  $\arcsin \left( \sin \frac{\pi}{6} \right)$ ;

5)  $\cos \left( \arccos \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$ ;

3)  $\operatorname{arctg} (\operatorname{tg} 1)$ ;

6)  $\sin \left( \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ .

**280.** Найдите значение выражения:

1)  $\sin \left( \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} + \arccos \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ ;

2)  $\cos \left( \arccos \frac{\sqrt{2}}{2} + \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$ ;

3)  $\cos (\operatorname{arctg} 1 + \operatorname{arcctg} 1)$ ;

4)  $\operatorname{tg} \left( \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} + \operatorname{arctg} \sqrt{3} \right)$ .

**281.** Может ли: 1)  $\arcsin t$ ; 2)  $\arccos t$ ; 3)  $\operatorname{arctg} t$ ; 4)  $\operatorname{arcctg} t$  принимать значение:

а) 0;      г)  $\sqrt{2}$ ;      ж)  $\frac{\pi}{2}$ ;      к)  $-2\pi$ ;

б)  $-1$ ;      д)  $\frac{\pi}{6}$ ;      з)  $-\frac{\pi}{2}$ ;      л)  $3\sqrt{5}$ ;

в) 1;      е)  $-\frac{\pi}{6}$ ;      и)  $\pi$ ;      м)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ?

**282.** Сравните  $\alpha$  и  $\beta$ , если:

$$1) 5\alpha + \frac{\pi}{4} = \arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \text{ и } 10\beta + \frac{7\pi}{4} = \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right);$$

$$2) 3\alpha - \frac{\pi}{3} = \arccos\left(-\frac{1}{2}\right) \text{ и } 3\beta - \frac{4\pi}{3} = \arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

**283.** Для каких значений  $a$  имеет смысл выражение:

- 1)  $\arcsin a$ ;    2)  $\arccos a$ ;    3)  $\operatorname{arctg} a$ ;    4)  $\operatorname{arcctg} a$ ?

**284.** Найдите корни уравнения, принадлежащие отрезку  $[0; 2\pi]$ :

$$1) \sin x = 0; \qquad 5) 2 \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right) = 1;$$

$$2) \cos x - 1 = 0; \qquad 6) \operatorname{ctg}(x - \pi) - 1 = 0;$$

$$3) 3 \operatorname{tg} x + \sqrt{3} = 0; \qquad 7) 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \sqrt{2} = 0;$$

$$4) \operatorname{ctg}^2 x - 3 = 0; \qquad 8) 2 \sin^2 x - \sqrt{2} \sin x = 0.$$

**285.** 1) Верно ли утверждение, что при любом значении  $a$ :

- а)  $\arcsin(\sin a) = a$ ;    в)  $\operatorname{arctg}(\operatorname{tg} a) = a$ ;  
б)  $\arccos(\cos a) = a$ ;    г)  $\operatorname{arcctg}(\operatorname{ctg} a) = a$ ?

2) Если вы считаете, что утверждение неверно, приведите опровергающий пример.

**286.** Верно ли утверждение « $\arcsin(\cos a) = \frac{\pi}{2} - a$  для любого значения  $a$ »?

**287.** Что означают слова *арка*, *аркада*? Существует ли какая-нибудь связь этих слов со значением приставки «арк» в словах «арксинус», «арккосинус»?

**288.** Решите уравнение:

$$1) 4 \sin^2 x + 5 \sin x + 1 = 0; \qquad 2) 3 \cos^2 x + 2 \cos x - 5 = 0.$$

**289.** 1) Объясните цепочку равенств

$$\frac{\pi}{3} = \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \arccos \frac{1}{2} = \operatorname{arctg} \sqrt{3} = \operatorname{arcctg} \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

2) Составьте аналогичные цепочки равенств для чисел  $\frac{\pi}{6}$  и  $\frac{\pi}{4}$ .



## Контрольные вопросы и задания

- Сформулируйте определения арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса числа.
- Вычислите  $\left( \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} + 2 \arccos \frac{\sqrt{3}}{2} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{3} \right)$ .
- Найдите корни уравнения, принадлежащие отрезку  $[0; 2\pi]$ :  
а)  $\sin x - 0,5 = 0$ ; б)  $\operatorname{tg} x - 1 = 0$ .

## 17. Формулы приведения

Уже в древности при выполнении различных расчётов применялись таблицы, в которых были приведены значения синусов, косинусов и тангенсов острых углов. Чтобы пользоваться такими таблицами, нужно было уметь приводить тригонометрические функции к углам от  $0^\circ$  до  $90^\circ$  (от  $0$  до  $\frac{\pi}{2}$ ), т. е. выражать значения тригонометрических функций любых углов через значения тригонометрических функций углов от  $0^\circ$  до  $90^\circ$ .

Рассмотрим сначала, как тригонометрические функции любого угла приводятся к функциям углов от  $0^\circ$  до  $360^\circ$  (от  $0$  до  $2\pi$ ).

Поскольку повороты на углы, отличающиеся друг от друга на  $360^\circ n$  (на  $2\pi n$ ), где  $n$  — любое целое число, имеют одну и ту же конечную точку, то уменьшение или увеличение аргумента тригонометрической функции на  $2\pi$  не изменяет её значения.

$$\sin(\varphi \pm 2\pi) = \sin \varphi$$

$$\cos(\varphi \pm 2\pi) = \cos \varphi$$

$$\operatorname{tg}(\varphi \pm 2\pi) = \operatorname{tg} \varphi$$

$$\operatorname{ctg}(\varphi \pm 2\pi) = \operatorname{ctg} \varphi$$



**Пример 1.** Привести к углу от  $0^\circ$  до  $360^\circ$  (от  $0$  до  $2\pi$ ):

$$\cos 2000^\circ, \sin \left(-\frac{59\pi}{6}\right).$$

**Решение.**  $\cos 2000^\circ = \cos (2000^\circ - 360^\circ \cdot 5) = \cos 200^\circ$ ;

$$\sin\left(-\frac{59\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6} - 2\pi \cdot 5\right) = \sin\frac{\pi}{6}.$$

**Ответ:**  $\cos 200^\circ$ ,  $\sin \frac{\pi}{6}$ .

Получить следующие три формулы приведения нам помогут рисунки.

На рисунке 87 точки  $P_\varphi$ ,  $P_{-\varphi}$ ,  $P_{\pi-\varphi}$  и  $P_{\pi+\varphi}$  — конечные точки поворотов на углы  $\varphi$ ,  $-\varphi$ ,  $\pi - \varphi$  и  $\pi + \varphi$ . Точки  $P_\varphi$  и  $P_{-\varphi}$  симметричны относительно оси абсцисс, значит, абсциссы этих точек равны, а ординаты противоположны.

$$\cos(-\varphi) = \cos \varphi$$

$$\sin(-\varphi) = -\sin \varphi$$

Точки  $P_{\pi-\varphi}$  и  $P_{-\varphi}$ , а также точки  $P_\varphi$  и  $P_{\pi+\varphi}$  являются концами соответствующих диаметров единичной окружности и, следовательно, симметричны относительно её центра — начала координат. Абсциссы этих точек противоположны, противоположны и их ординаты.

$$\cos(\pi - \varphi) = -\cos(-\varphi) = -\cos \varphi$$

$$\cos(\pi + \varphi) = -\cos \varphi$$

$$\sin(\pi - \varphi) = -\sin(-\varphi) = \sin \varphi$$

$$\sin(\pi + \varphi) = -\sin \varphi$$




Рис. 87

Эти формулы позволяют привести к углам от  $0$  до  $\frac{\pi}{2}$  (от  $0^\circ$  до  $90^\circ$ ) синус и косинус любых углов.

Точки  $P_\varphi$  и  $P_{\frac{\pi}{2}-\varphi}$  (рис. 88) — конечные точки поворота на углы  $\varphi$  и  $\frac{\pi}{2} - \varphi$ . Эти точки симметричны относительно прямой  $y = x$ . С симметрией




Рис. 88

относительно этой прямой вы уже встречались, рассматривая графики взаимно-обратных функций.

Абсцисса точки  $P_{\frac{\pi}{2} - \varphi}$  равна ординате точки  $P_\varphi$ , а ордината точки  $P_{\frac{\pi}{2} - \varphi}$  равна абсциссе точки  $P_\varphi$ .

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = \sin \varphi \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = \cos \varphi$$

Полученные формулы приведения позволяют понять происхождение терминов «косинус» и «котангенс». В формуле  $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = \cos \varphi$  аргумент косинуса дополняет аргумент синуса до  $\frac{\pi}{2}$ , получаем  $\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) + \varphi = \frac{\pi}{2}$ . От перестановки слов *sinus complementi* (синус дополнения) и сокращения одного из них образовался термин «косинус». Термин «котангенс» стали применять по аналогии с «косинусом».

Для приведения к углу  $\varphi$  синусов и косинусов углов  $\frac{\pi}{2} + \varphi$ ,  $\frac{3\pi}{2} - \varphi$  и  $\frac{3\pi}{2} + \varphi$  можно использовать симметрии точки  $P_{\frac{\pi}{2} - \varphi}$  с точкой  $P_{\frac{\pi}{2} + \varphi}$  относительно оси ординат, с точкой  $P_{\frac{3\pi}{2} + \varphi}$  относительно начала координат и с точкой  $P_{\frac{3\pi}{2} - \varphi}$  относительно оси абсцисс (рис. 89).

Но можно применить и уже полученные формулы приведения. Для этого достаточно заметить, что

$$\frac{\pi}{2} + \varphi = \pi - \left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right),$$

$$\frac{3\pi}{2} - \varphi = \pi + \left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right),$$

$$\frac{3\pi}{2} + \varphi = 2\pi - \left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right).$$




Рис. 89

Формулы приведения для тангенса и котангенса легко получить, рассматривая их как частные синуса и косинуса, например:

$$\operatorname{tg}(\pi - \varphi) = \frac{\sin(\pi - \varphi)}{\cos(\pi - \varphi)} = \frac{\sin \varphi}{-\cos \varphi} = -\operatorname{tg} \varphi.$$

$\alpha$	$\varphi + 2\pi n$	$-\varphi$	$\pi - \varphi$	$\pi + \varphi$
$\sin \alpha$	$\sin \varphi$	$-\sin \varphi$	$\sin \varphi$	$-\sin \varphi$
$\cos \alpha$	$\cos \varphi$	$\cos \varphi$	$-\cos \varphi$	$-\cos \varphi$
$\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{tg} \varphi$	$-\operatorname{tg} \varphi$	$-\operatorname{tg} \varphi$	$\operatorname{tg} \varphi$
$\operatorname{ctg} \alpha$	$\operatorname{ctg} \varphi$	$-\operatorname{ctg} \varphi$	$-\operatorname{ctg} \varphi$	$\operatorname{ctg} \varphi$
$\alpha$	$\frac{\pi}{2} - \varphi$	$\frac{\pi}{2} + \varphi$	$\frac{3\pi}{2} - \varphi$	$\frac{3\pi}{2} + \varphi$
$\sin \alpha$	$\cos \varphi$	$\cos \varphi$	$-\cos \varphi$	$-\cos \varphi$
$\cos \alpha$	$\sin \varphi$	$-\sin \varphi$	$-\sin \varphi$	$\sin \varphi$
$\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{ctg} \varphi$	$-\operatorname{ctg} \varphi$	$\operatorname{ctg} \varphi$	$-\operatorname{ctg} \varphi$
$\operatorname{ctg} \alpha$	$\operatorname{tg} \varphi$	$-\operatorname{tg} \varphi$	$\operatorname{tg} \varphi$	$-\operatorname{tg} \varphi$

Формулы приведения являются тождествами, т. е. они верны для любых допустимых значений  $\varphi$ . Анализируя полученную таблицу, можно заметить, что:

1) знак в правой части формулы совпадает со знаком приводимой функции в соответствующей четверти, если считать  $\varphi$  острым углом;

2) название меняют только функции углов  $\frac{\pi}{2} \pm \varphi$  и  $\frac{3\pi}{2} \pm \varphi$  ( $90^\circ \pm \alpha^\circ$  и  $270^\circ \pm \alpha^\circ$ ).

**Пример 2.** Привести  $\cos 289^\circ$  к тригонометрической функции острого угла.

**Решение.** Можно рассуждать следующим образом:

1)  $289^\circ$  — угол IV четверти, в которой косинус положителен, значит, в правой части формулы нет знака «-»;

2)  $289^\circ = 270^\circ + 19^\circ$  — название меняется.

Таким образом,  $\cos 289^\circ = \cos(270^\circ + 19^\circ) = \sin 19^\circ$ .

Ответ:  $\sin 19^\circ$ .

**Примечание.** Можно было представить  $289^\circ$  как  $360^\circ - 71^\circ$ , тогда название не меняется и

$$\cos 289^\circ = \cos (360^\circ - 71^\circ) = \cos 71^\circ.$$

Понятно, что  $\cos 71^\circ = \cos (90^\circ - 19^\circ) = \sin 19^\circ$ .

Вычислять значения тригонометрических функций можно с помощью таблиц или инженерных калькуляторов. На инженерном калькуляторе из Windows, о котором мы упоминали в связи с вычислением степеней и логарифмов, нет нужды использовать формулы приведения для вычисления значений тригонометрических функций — это делает сам калькулятор (рис. 90).

**Пример 3.** С помощью калькулятора найти  $\sin 43,5$  с точностью до сотых.

**Решение.** Чтобы найти  $\sin 43,5$ , нужно сначала перейти в режим работы с радианами, для этого «щёлкнуть» мышью на указателе Радианы (*Rad*), набрать 43,5, «щёлкнуть» клавишу  $\sin$  и прочитать в окошке искомое значение

$$-0,46381551598382738881409597093642 \text{ (рис. 90),}$$

$$\sin 43,5 \approx -0,46381551598388 \approx -0,46$$

с точностью до сотых.

**Ответ:**  $\sin 43,5 \approx -0,46$ .




Рис. 90

**Пример 4.** Вычислить с помощью калькулятора  $\operatorname{ctg} 48757^\circ$  с точностью до тысячных.

**Решение.** Чтобы перевести калькулятор в режим работы с градусной мерой углов, следует «щёлкнуть» на указателе Градусы (*Deg*). Введя число 48757, нажмём на клавишу  $\operatorname{tg}$  (или  $\tan$  — иное обозначение тангенса) и на  $\langle \frac{1}{x} \rangle$  — так как специальной клавиши для котангенса нет, мы находим его как величину, обратную тангенсу:

$$\operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{1}{\frac{\sin x}{\cos x}} = \frac{1}{\operatorname{tg} x}.$$

На индикаторе появится число

$-2,3558523658237528339395866623439$ .

**Ответ:**  $\operatorname{ctg} 48757^\circ \approx -2,356$ .

Если при вычислении окажется, что тангенс не существует, значит, котангенс равен нулю, а если тангенс окажется равным нулю, то не существует котангенса.

**Пример 5.** Вычислить с помощью калькулятора  $\arcsin 0,7$ .

**Решение.** Помогает инженерный калькулятор и в нахождении углов. Так, чтобы найти  $\arcsin 0,7$ , нужно ввести 0,7, «щёлкнуть» на указателе *Inv* (от английского слова *inverse* — обратный) и на клавише  $\sin$ . Если калькулятор находился в режиме работы с градусной мерой, то он покажет 44,42700400081, если в режиме работы с радианами, то в окошке увидим число 0,7753974966108.

**Ответ:**  $\arcsin 0,7 \approx 44,42700400081^\circ$ ,  $\arcsin 0,7 \approx 0,7753974966108$ . (Правда, трудно представить, что вам когда-нибудь потребуется вычислять углы с такой высокой точностью.)

С развитием электронно-вычислительной техники, позволяющей быстро и точно получать значения тригонометрических функций углов, заданных как в градусной, так и в радианной мере, вычисления значений тригонометрических функций практически перестали выполняться вручную. Однако в преобразованиях тригонометрических выражений формулы приведения используются довольно часто.

## Упражнения

**290.** Приведите к тригонометрической функции острого угла:

- |                                       |                                     |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) а) $\sin 152^\circ$ ;              | в) $\sin 242^\circ$ ;               | д) $\sin 312^\circ$ ;               |
| б) $\cos 124^\circ$ ;                 | г) $\cos 196^\circ$ ;               | е) $\cos 326^\circ$ ;               |
| 2) а) $\sin 175^\circ$ ;              | в) $\sin 221^\circ$ ;               | д) $\sin 290^\circ$ ;               |
| б) $\cos 166^\circ$ ;                 | г) $\cos 235^\circ$ ;               | е) $\cos 306^\circ$ ;               |
| 3) а) $\operatorname{tg} 111^\circ$ ; | в) $\operatorname{tg} 187^\circ$ ;  | д) $\operatorname{tg} 286^\circ$ ;  |
| б) $\operatorname{ctg} 163^\circ$ ;   | г) $\operatorname{ctg} 215^\circ$ ; | е) $\operatorname{ctg} 319^\circ$ ; |
| 4) а) $\operatorname{ctg} (-11,2)$ ;  | в) $\sin 19,3$ ;                    | д) $\sin (-12,5)$ ;                 |
| б) $\cos 5,7$ ;                       | г) $\operatorname{tg} (-8,3)$ ;     | е) $\cos (-17)$ .                   |

**291.** Приведите к углам от  $0^\circ$  до  $45^\circ$ :

- |                             |                          |                                       |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1) а) $\sin 72^\circ$ ;     | б) $\cos 71^\circ$ ;     | в) $\operatorname{tg} 65^\circ$ ;     |
| 2) а) $\sin 175^\circ$ ;    | б) $\cos 155^\circ$ ;    | в) $\operatorname{tg} 102^\circ$ ;    |
| 3) а) $\sin 285^\circ$ ;    | б) $\cos 273^\circ$ ;    | в) $\operatorname{tg} 250^\circ$ ;    |
| 4) а) $\sin (-355^\circ)$ ; | б) $\cos (-451^\circ)$ ; | в) $\operatorname{tg} (-317^\circ)$ . |

● По какому принципу сгруппированы задания?

**292.** Упростите выражение:

- 1)  $\sin 146^\circ + \sin 304^\circ + \sin (-56^\circ) + \cos (-34^\circ)$ ;
- 2)  $\cos 220^\circ + \cos 320^\circ - \operatorname{tg} 110^\circ + \operatorname{ctg} 380^\circ$ .

**293.** Упростите выражение:

$$\begin{aligned} 1) & \frac{\cos(\pi - x)\operatorname{ctg}\left(\frac{3\pi}{2} + x\right)}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\sin(\pi + x)}; & 3) & \frac{\sin(\pi - \varphi)\cos(3\pi + \varphi)}{\cos\left(\varphi - \frac{\pi}{2}\right)\cos\left(\frac{3\pi}{2} + \varphi\right)}; \\ 2) & \frac{\sin\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} + x\right)}{\cos(\pi + x)\operatorname{tg}(-x)}; & 4) & \frac{\sin\left(\frac{5\pi}{2} - \alpha\right)\sin\left(\alpha - \frac{3\pi}{2}\right)}{\operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right)\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)}. \end{aligned}$$

**294.** Найдите с точностью до тысячных значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла:

- 1) а)  $120^\circ$ ;
- б)  $-225^\circ$ ;
- в)  $300^\circ$ ;
- 2) а)  $-150^\circ$ ;
- б)  $210^\circ$ ;
- в)  $315^\circ$ ;
- 3) а)  $\frac{7\pi}{3}$ ;
- б)  $\frac{5\pi}{4}$ ;
- в)  $-\frac{43\pi}{6}$ .

**295.** Вычислите с точностью до тысячных:

- 1)  $3 \arccos 0,06 : \arcsin (-0,316)$ ;
- 2)  $\arccos (-0,5213) - \operatorname{arctg} 3,148$ ;

3)  $\arcsin 0,87 + \operatorname{arctg} (-57)$ ;

4)  $\sin (\operatorname{arctg} (-2))$ .

**296.** Догадайтесь, как находить на калькуляторе значения арккотангенсов.

**297.** Найдите приближённое значение  $\operatorname{arcctg} a$ , если  $a$  равно:

1) 15;

3) -26 589;

5)  $\operatorname{tg} \sqrt{2}$ ;

2) -0,000547;

4)  $-\frac{\pi}{3}$ ;

6)  $\operatorname{tg} (-46^\circ)$ .

**298.** Решите уравнение на промежутке  $[0; 2\pi]$ :

1)  $2 \sin \left( \frac{\pi}{2} + x \right) = \sqrt{2}$ ;

3)  $\operatorname{tg} (\pi + x) = 1$ ;

2)  $2 \cos \left( \frac{3\pi}{2} - x \right) + 1 = 0$ ;

4)  $3 \operatorname{ctg} (2\pi - x) = \sqrt{3}$ .

**299.** Решите уравнение:

1)  $2 \sin \left( x + \frac{\pi}{2} \right) + \sqrt{2} = 0$ ;

2)  $\cos (2\pi - x) + \sin \left( \frac{\pi}{2} + x \right) = \sqrt{2}$ ;

3)  $\sin \left( \frac{\pi}{2} - x \right) = \sin \frac{\pi}{4}$ ;

4)  $3 \operatorname{tg} \left( 2x - \frac{\pi}{2} \right) - \sqrt{3} = 0$ .

**300.** Найдите значение выражения:

1)  $\arcsin \left( \sin \frac{7}{9}\pi \right)$ ;

4)  $\operatorname{arctg} (\operatorname{tg} 10)$ ;

2)  $\arccos \left( \cos \frac{24\pi}{7} \right)$ ;

5)  $\operatorname{arctg} (\operatorname{ctg} 10)$ ;

3)  $\arccos (\sin 6)$ ;

6)  $\operatorname{arcctg} (\operatorname{tg} 10)$ .



## Контрольные вопросы и задания

- Какие координаты имеет точка  $B$ , симметричная точке  $A(m; n)$  относительно:
  - оси абсцисс;
  - оси ординат;
  - начала координат;
  - прямой  $y = x$ ?
- Докажите, что  $\sin (270^\circ + \alpha^\circ) = -\cos \alpha^\circ$ .
- Найдите: а)  $\sin 855^\circ$ ;
- б)  $\operatorname{tg} \frac{34\pi}{3}$ .

## 18. Свойства и график функции $y = \sin x$

Вы познакомились с некоторыми свойствами функции  $y = \sin \phi$ , аргумент  $\phi$  которой может принимать любые значения. Эти свойства удобно использовать при построении графика функции  $y = \sin x$  (аргумент функции, как вы знаете, обычно обозначают буквой  $x$ ).

Построим сначала график функции  $y = \sin x$  на промежутке от 0 до  $\frac{\pi}{2}$  (для значений  $x$  от 0 до  $\frac{\pi}{2}$ ). На рисунке 91 показано, как можно получать точки графика функции  $y = \sin x$  с помощью единичной окружности.




Рис. 91

Соединив точки плавной линией, получим график функции  $y = \sin x$  на промежутке от 0 до  $\frac{\pi}{2}$  (рис. 92, а).

График функции  $y = \sin x$  на других промежутках получим из построенной части графика.





Рис. 92






Рис. 93

Формула  $\sin(\pi - x) = \sin x$  позволяет, используя симметрию графика относительно прямой  $x = \frac{\pi}{2}$  (рис. 92, б), построить его на промежутке от  $\frac{\pi}{2}$  до  $\pi$ .

Формула  $\sin(-x) = -\sin x$  позволяет получить график функции  $y = \sin x$  на промежутке от  $-\pi$  до 0, используя обычный для построения графиков нечётных функций приём — симметрию относительно начала координат (рис. 93).

Формула  $\sin(2\pi + x) = \sin x$  показывает, что значения функции  $y = \sin x$  через каждые  $2\pi$  повторяются, т. е. для любого значения  $x$

$$\sin(x - 2\pi) = \sin x = \sin(x + 2\pi).$$

Повторяющиеся события или явления в окружающем нас мире встречаются довольно часто: восход и заход солнца, бой часов на Спасской башне Московского Кремля, колебание маятника настенных старинных часов. И в математике мы встречались с бесконечным повторением группы цифр в дробной части десятичной дроби, например при делении 4 на 33 получается бесконечная десятичная дробь  $0,12121212\dots$ . Такие дроби называют периодическими. Этот же термин применяют и к функциям, значения которых повторяются.

Положительное число  $T$  называется **периодом** функции  $y = f(x)$ , если для любого значения  $x$  из её области определения выполняются условия:

1)  $x - T$  и  $x + T$  тоже входят в область определения функции;

$$2) f(x - T) = f(x) = f(x + T).$$

Функции, имеющие период, называют **периодическими**.




Рис. 94

Периодичность функции  $y = \sin x$  позволяет получить её график на промежутках от  $\pi$  до  $3\pi$ , от  $-3\pi$  до  $-\pi$ , от  $3\pi$  до  $5\pi$ , от  $-5\pi$  до  $-3\pi$  и т. д. с помощью сдвига построенной части графика вдоль оси абсцисс вправо и влево на  $2\pi$ ,  $4\pi$  и т. д. (рис. 94).

**Примечание.** В качестве периода функции  $y = \sin x$  можно было бы взять  $4\pi$ ,  $6\pi$  и т. д. Число  $2\pi$  является наименьшим из её периодов. В этом легко убедиться, если найти расстояние между двумя соседними точками графика с ординатами, равными 1. Например,  $\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{3\pi}{2}\right) = 2\pi$ .

Полученная кривая называется *синусоидой*. Это первый график тригонометрических функций, который был опубликован в 30-х годах XVII в.

Синусоида — один из самых популярных графиков в физике. С ней непосредственно связано практически любое колебание. На рисунке 95 вы видите, что физический маятник на движущейся с постоянной скоростью бумажной ленте вычерчивает синусоиду.

Синусоиду образует и край срезанного наискось рулона бумаги (рис. 96).




Рис. 95




Рис. 96



Рис. 97

Поверхность волн, как показано на рисунке 97, иногда напоминает синусоиду. Наверное, именно поэтому часть синусоиды длиной, равной периоду (например, на промежутке от 0 до  $2\pi$ ), называют волной синусоиды.

### Основные свойства функции $y = \sin x$

1. Аргумент функции может принимать любые значения.
2. Функция принимает любые значения от  $-1$  до  $1$ .
3. Функция  $y = \sin x$  нечётная, так как для любого значения  $x$  выполняется условие  $\sin(-x) = -\sin x$ .
4. Функция  $y = \sin x$  периодическая, её наименьшим периодом является число  $2\pi$ .
5. а) Функция  $y = \sin x$  возрастает на промежутках

$$\left[ -\frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{\pi}{2} + 2\pi n \right], \text{ где } n \text{ — любое целое число.}$$

Например, при  $n = 0$  получаем промежуток возрастания

$$\left[ -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right], \text{ а при } n = 2 \text{ — промежуток } \left[ \frac{7\pi}{2}; \frac{9\pi}{2} \right].$$

- б) Функция убывает на промежутках  $\left[ \frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{3\pi}{2} + 2\pi n \right]$ ,

где  $n$  — любое целое число. (Так, при  $n = 0$  получаем промежуток  $\left[ \frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right]$ , а при  $n = -1$  — промежуток  $\left[ -\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2} \right]$ .)

- а) Функция принимает своё наибольшее значение, равное  $1$ , при  $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$ , где  $n$  — любое целое число.
- б) Функция принимает своё наименьшее значение, равное  $-1$ , при  $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n$ , где  $n$  — любое целое число.
7. Функция  $y = \sin x$  принимает значение, равное нулю, при  $x = \pi n$ , где  $n$  — любое целое число.



**Пример 1.** Расположить в порядке возрастания  $\sin 225^\circ$ ,  $\sin 310^\circ$  и  $\cos 118^\circ$ .

**Решение.** Функция  $y = \sin x$  возрастает на промежутке от  $-\frac{\pi}{2}$  до  $\frac{\pi}{2}$ , следовательно, большему острому углу соответствует больший синус. Выразим данные в условии выражения через синусы острых углов:

$$\sin 225^\circ = \sin (180^\circ + 45^\circ) = -\sin 45^\circ,$$

$$\sin 310^\circ = \sin (360^\circ - 50^\circ) = -\sin 50^\circ,$$

$$\cos 118^\circ = \cos (90^\circ + 28^\circ) = -\sin 28^\circ.$$

Так как в первой четверти функция  $y = \sin x$  возрастает, имеем:  $\sin 28^\circ < \sin 45^\circ < \sin 50^\circ$ . Значит,

$$-\sin 50^\circ < -\sin 45^\circ < -\sin 28^\circ.$$

**Ответ:**  $\sin 310^\circ$ ,  $\sin 225^\circ$ ,  $\cos 118^\circ$ .



**Пример 2.** Доказать, что число  $\pi$  является периодом функции  $y = \sin x \cdot \cos x$ .

**Доказательство.** Поскольку аргумент  $x$  этой функции может принимать любые значения, нужно доказать, что при всех значениях  $x$

$$\begin{aligned} \sin(x - \pi) \cos(x - \pi) &= \sin x \cos x = \\ &= \sin(x + \pi) \cos(x + \pi). \end{aligned}$$

Используя формулы приведения, получаем:

$$\begin{aligned} \sin(x - \pi) \cos(x - \pi) &= -\sin(\pi - x) \cos(\pi - x) = \\ &= -\sin x (-\cos x) = \sin x \cos x; \end{aligned}$$

$$\sin(x + \pi) \cos(x + \pi) = -\sin x (-\cos x) = \sin x \cos x,$$

что и требовалось доказать.

## Упражнения

**301.** Воспользуйтесь графиком функции  $y = \sin x$  для выполнения следующих заданий.

1) Можно ли по графику определить период функции?

Являются ли следующие числа периодами данной функции:  $\pi$ ,  $2\pi$ ,  $3\pi$ ,  $4\pi$ ?

2) Как по графику определить чётность функции?

3) Найдите точки, принадлежащие одновременно и промежуткам возрастания, и промежуткам убывания функции.

4) Назовите наибольшие и наименьшие значения функции.

5) Назовите корни уравнения:  
 $\sin x = 0; \sin x = 1; \sin x = -1.$

6) Найдите значения:  $\sin 0; \sin \frac{\pi}{2}; \sin \left(-\frac{\pi}{2}\right).$

**302.** Используя график функции  $y = \sin x$ , найдите приближённые значения:

1)  $\sin 1;$       3)  $\sin 0,5;$       5)  $\sin \frac{\pi}{4};$       7)  $\sin \left(-\frac{\pi}{3}\right);$

2)  $\sin 2;$       4)  $\sin (-1);$       6)  $\sin \frac{\pi}{5};$       8)  $\sin \left(-\frac{\pi}{6}\right).$

**303.** Используя график и свойства функции  $y = \sin x$ , сравните:

1)  $\sin 160^\circ$  и  $\sin 170^\circ;$       3)  $\sin 1$  и  $\sin 2;$

2)  $\sin 230^\circ$  и  $\sin 300^\circ;$       4)  $\sin 5$  и  $\sin 6.$

**304.** 1) Постройте график функции  $y = \sin x$  и выделите цветным карандашом те его точки, ординаты которых:

а) положительны;      б) отрицательны.

2) На каких промежутках функция  $y = \sin x$  принимает положительные и на каких — отрицательные значения?

**305.** 1) Постройте одну волну синусоиды  $y = \sin x$  на промежутке от 0 до  $2\pi$ , взяв за единицу 2,5 см. Выделите карандашами разных цветов точки графика, ординаты которых:

а) равны:  $0; \frac{1}{2}; -\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2};$

б) больше:  $\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2};$       в) меньше:  $-\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}.$

2) Запишите абсциссы выделенных точек.

**306.** Решите неравенство:

1)  $\sin x < 1;$       3)  $\sin x > \sqrt{2};$

2)  $\sin x > -1;$       4)  $\sin x < -\sqrt{3}.$

**307. 1)** Постройте график функции  $y = \sin x$  и проведите не сколько его осей симметрии.

2) ● Напишите общий вид уравнения оси симметрии графика функции  $y = \sin x$ .

**308.1) Постройте график функции  $y = \sin x$  и отметьте сколько центров симметрии этого графика.**

2) Укажите общий вид абсцисс центров симметрии графика функции  $y = \sin x$ .

**309. 1)** Докажите, что число  $\pi$  является периодом функции:

a)  $y = \sin^2 x$ ; б)  $y = |\sin x|$ .

2) Изобразите схематически график этой функции.

**310.** Является ли периодической функция:

$$1) y = \{x\}; \quad 2) y = [x]?$$

Если является, то какой у неё наименьший положительный период?

**311.** 1) Постройте график функции:

a)  $y = \{2x\}$ ; б)  $y = \{0,5x\}$ .

2) Укажите её наименьший положительный период.

**312.** Укажите наибольшее и наименьшее значения функции:

$$1) y = 2 \sin x; \quad 4) y = 3 - 2 \sin x;$$

$$5) * y = \sin^2 x - \sin x + 4;$$

$$6) * y = \sin^2 x + 3 \sin x - 2.$$

313. ○ Какие из следующих функций являются чётными, а какие — нечётными:

$$1) y = \sin^3 x; \quad 3) y = \sin x^2;$$

2)  $y = \sin^4 x$ ;      4)  $y = \sin x^3$ ?

**314.** 1) Постройте в одной системе координат графики функций:

6)  $y = 2 \sin x$ ; r)  $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ .

2) С помощью каких преобразований графика функции  $y = \sin x$  можно получить графики этих функций?

**315.** При каких значениях  $a$  функция

$$y = \sin^2 2x + 6 \sin 2x + a$$

принимает только положительные значения?

**316\***. Найдите все значения  $a$ , при которых определённая на

интервале  $\left(-\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{6}\right)$  функция:

1)  $y = \sin^2 x - 2a \sin x - 7$ ;

2)  $y = \cos^2 x - 2a \cos x - 7$

принимает своё наименьшее значение.

**317.** 1) Постройте график функции:

а)  $y = |\sin x|$ ;      б)  $y = \sin |x|$ ;      в)  $y = |\sin |x||$ .

2) Являются ли эти функции периодическими?

**318.** 1) Являются ли функции **секанс** ( $y = \sec x$ ) и **косеканс** ( $y = \operatorname{cosec} x$ ) чётными, если:

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x}?$$

2) Изобразите эскизы графиков этих функций.



### Контрольные вопросы и задания

- Изобразите график функции  $y = \sin x$  и перечислите основные свойства этой функции.
- Сравните  $\sin 305^\circ$  и  $\sin 215^\circ$ .
- По графику функции  $y = \sin x$  найдите:  
 $\sin (-0,5)$ ,  $\sin 1,5$  и  $\sin 2,5$ .

## 19. Свойства и график функции $y = \cos x$

Задачу построения графика функции  $y = \cos x$  можно свести к построению графика функции  $y = \sin x$ . Действительно, поскольку  $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ , график функции  $y = \cos x$  можно получить из графика функции  $y = \sin x$  сдвигом последнего вдоль оси абсцисс влево на  $\frac{\pi}{2}$  (рис. 98).




Рис. 98




Рис. 99

Полученный график является графиком функции  $y = \cos x$  (рис. 99) и называется *косинусоидой*.

### Основные свойства функции $y = \cos x$

1. Аргумент функции может принимать любые значения.
2. Функция принимает любые значения от  $-1$  до  $1$ .
3. Функция  $y = \cos x$  чётная, так как для любого значения  $x$  выполняется условие  $\cos(-x) = \cos x$ .

График функции  $y = \cos x$  симметричен относительно оси ординат.

4. Функция  $y = \cos x$  периодическая. Её наименьшим периодом является число  $2\pi$ .

5. а) Функция возрастает на промежутках  $[-\pi + 2\pi n; 2\pi n]$ , где  $n$  — любое целое число. Например, при  $n = 0$  получаем промежуток возрастания  $[-\pi; 0]$ , а при  $n = 1$  — промежуток  $[\pi; 2\pi]$ .

б) Функция убывает на промежутках  $[2\pi n; \pi + 2\pi n]$ , где  $n$  — любое целое число. Так, при  $n = 0$  получаем промежуток  $[0; \pi]$ , а при  $n = -1$  — промежуток  $[-2\pi; -\pi]$ .

6. а) Функция принимает своё наибольшее значение, равное  $1$ , при  $x = 2\pi n$ , где  $n$  — любое целое число.

б) Функция принимает своё наименьшее значение, равное  $-1$ , при  $x = \pi + 2\pi n$ , где  $n$  — любое целое число.

7. Функция  $y = \cos x$  принимает значение, равное нулю, при  $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$ , где  $n$  — любое целое число.



**Пример 1.** Сравнить значения  $\cos \frac{2\pi}{3}$  и  $\cos \frac{5\pi}{4}$ .

**Решение.** На промежутке от 0 до  $\frac{\pi}{2}$  функция  $y = \cos x$  убывает. Приведём данные выражения к косинусам углов из этого промежутка:

$$\cos \frac{2\pi}{3} = \cos \left( \pi - \frac{\pi}{3} \right) = -\cos \frac{\pi}{3};$$

$$\cos \frac{5\pi}{4} = \cos \left( \pi + \frac{\pi}{4} \right) = -\cos \frac{\pi}{4}.$$

В силу убывания функции  $y = \cos x$  на промежутке от 0 до  $\frac{\pi}{2}$  имеем:

$$\cos \frac{\pi}{4} > \cos \frac{\pi}{3}, \text{ отсюда } -\cos \frac{\pi}{4} < -\cos \frac{\pi}{3}.$$

**Ответ:**  $\cos \frac{2\pi}{3} > \cos \frac{5\pi}{4}.$

**Пример 2.** Решить неравенство  $2 \cos \left( 3\phi - \frac{\pi}{4} \right) < -1$ .

**Решение.** Обозначим аргумент косинуса буквой  $x$ , т. е.  $3\phi - \frac{\pi}{4} = x$ . Разделим обе части неравенства на 2:

$$\cos x < -\frac{1}{2}.$$

Отметим какую-нибудь часть графика функции  $y = \cos x$ , точки которой имеют ординаты, меньшие  $-\frac{1}{2}$ , и обозначим границы промежутка абсцисс выбранной части графика как  $x_1$  и  $x_2$  (рис. 100). Тогда

$$\cos x_1 = \cos x_2 = -\frac{1}{2}, \quad x_1 = \frac{2\pi}{3}, \quad x_2 = \frac{4\pi}{3}.$$




Рис. 100

Для всех  $x$  из промежутка  $\frac{2\pi}{3} < x < \frac{4\pi}{3}$  неравенство  $\cos x < -\frac{1}{2}$  справедливо. Любой из промежутков, состоящих из решений неравенства  $\cos x < -\frac{1}{2}$ , отстоит от данного промежутка на целое число периодов:  $\frac{2\pi}{3} + 2\pi n < x < \frac{4\pi}{3} + 2\pi n$ ,  $n \in \mathbf{Z}^1$ . В виде такого двойного неравенства и записывают обычно множество всех решений неравенства  $\cos x < -\frac{1}{2}$ .

Вернёмся теперь к переменной  $\phi$ :

$$\frac{2\pi}{3} + 2\pi n < 3\phi - \frac{\pi}{4} < \frac{4\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbf{Z};$$

$$\frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{4} + 2\pi n < 3\phi < \frac{4\pi}{3} + \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbf{Z};$$

$$\frac{11\pi}{12} + 2\pi n < 3\phi < \frac{19\pi}{12} + 2\pi n, n \in \mathbf{Z};$$

$$\frac{11\pi}{36} + \frac{2}{3}\pi n < \phi < \frac{19\pi}{36} + \frac{2}{3}\pi n, n \in \mathbf{Z}.$$

Ответ:  $\frac{11\pi}{36} + \frac{2}{3}\pi n < \phi < \frac{19\pi}{36} + \frac{2}{3}\pi n, n \in \mathbf{Z}$ .




Рис. 101

**Примечание.** Для решения простейшего неравенства  $\cos x < -\frac{1}{2}$  можно было использовать тригонометрическую окружность (рис. 101).

## Упражнения

**319.** Используя график функции  $y = \cos x$ , ответьте на вопросы и выполните задания.

1) Промежутку возрастания или убывания принадлежит точка: а)  $\frac{13\pi}{6}$ ; б)  $-\frac{5\pi}{6}$ ; в) 5?

2) Укажите какое-нибудь значение  $x > 4$ , принадлежащее одновременно и промежутку возрастания, и промежутку убывания.

<sup>1</sup> Буквой  $\mathbf{Z}$  обозначают множество целых чисел, поэтому запись « $n \in \mathbf{Z}$ » ( $n$  — элемент множества  $\mathbf{Z}$ ) часто используется в том же смысле, что и « $n$  — любое целое число».

3) Как по графику определить чётность функции?

4) Назовите наибольшее и наименьшее значения функции.

5) Назовите несколько значений аргумента, при которых функция  $y = \cos x$  принимает значение, равное 1, -1. Задайте общей формулой корни уравнения  $|\cos x| = 1$ .

6) Решите уравнение  $\cos x = 0$ .

7) Найдите приближённое значение:

a)  $\cos \frac{\pi}{3}$ ;      б)  $\cos (-3)$ ;      в)  $\cos 1$ ;      г)  $\cos \frac{5\pi}{6}$ .

**320.** 1) Постройте график функции  $y = \cos x$  и выделите карандашом одного цвета те его точки, ординаты которых положительны, а другим цветом — точки с отрицательными ординатами.

2) На каких промежутках функция  $y = \cos x$  принимает положительные значения и на каких — отрицательные?

**321.** 1) Постройте график функции  $y = \cos x$  на промежутке от 0 до  $2\pi$ , взяв за единицу 2,5 см. Выделите цветными карандашами те точки графика, ординаты которых:

a) равны:  $0; \frac{1}{2}; -\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ;

б) больше:  $-\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}$ ; в) меньше:  $\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}$ .

2) • Каковы абсциссы выделенных точек?

**322.** Сравните значения:

$$1) \cos 0,8\pi \text{ и } \cos 0,7\pi; \quad 3) \cos \frac{15\pi}{8} \text{ и } \cos \frac{11\pi}{5};$$

$$2) \cos \frac{11\pi}{9} \text{ и } \cos \frac{7\pi}{6}; \quad 4) \cos 218^\circ \text{ и } \sin 230^\circ.$$

**323.** Решите неравенство:

$$1) \cos x < 1:$$

$$3) \cos x \leq -\sqrt{2} ;$$

$$2) \cos x \geq -1:$$

$$4) \cos x > \sqrt{3},$$

**324.** 1) Постройте график функции  $y = \cos x$  и проведите несколько его осей симметрии. 

2) Напишите общий вид уравнения оси симметрии графика функции  $y = \cos x$ .

**325. 1)** Постройте график функции  $y = \cos x$  и укажите несколько центров симметрии этого графика.

2) Укажите общий вид абсцисс центров симметрии графика функции  $y = \cos x$ .

326. Докажите, что число  $\pi$  является периодом функции:  
 1)  $y = \operatorname{tg} x$ ;      2)  $y = \operatorname{ctg} x$ .

327. Укажите наибольшее и наименьшее значения выражения:

$$1) \frac{1 - \cos x}{5};$$

$$3) \frac{1}{2 + \cos x};$$

$$2) \frac{2 - 5 \cos x}{10};$$

$$4) \frac{1}{3 - 2 \cos x}.$$

328. 1) В одной системе координат постройте графики функций:

$$a) y = \cos x;$$

$$b) y = \cos 2x;$$

$$b) y = \frac{1}{2} \cos x;$$

$$g) y = \cos \left( x + \frac{\pi}{2} \right).$$

2) Укажите наименьшие периоды данных функций.

329. 1) С помощью каких преобразований графика функции  $y = \sin x$  можно получить график функции

$$y = 2 \sin \left( x + \frac{\pi}{4} \right)?$$

2) С помощью каких преобразований графика функции  $y = \cos x$  можно получить график функции

$$y = \frac{1}{2} \cos \left( x - \frac{\pi}{4} \right)?$$

330. Найдите наименьший период функции:

$$1) y = \cos 2x;$$

$$2) y = \sin \frac{x}{2}.$$

331. Какие из функций являются:

а) чётными;

б) нечётными:

$$1) y = \cos^3 x;$$

$$4) y = \cos^3 x + \sin^5 x;$$

$$2) y = \sin \frac{x}{8};$$

$$5) y = \frac{\sin^2 x + \cos^7 x + 1}{\sin^4 x};$$

$$3) y = \sin x + \cos x;$$

$$6) y = 3 \cos^5 x + \sin^6 x?$$

332. Используя график, решите неравенство:

$$1) \sin x < \frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$3) 2 \sin x \geq -1;$$

$$2) \cos x > -\frac{\sqrt{3}}{2};$$

$$4) -2 \cos x \geq \sqrt{2}.$$

**333.** Решите неравенство:

$$1) 2 \sin 2x - 1 \geqslant 0;$$

$$3) \sin\left(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{4}\right) \geqslant 0;$$

$$2) 2 \sin\left(3x + \frac{\pi}{2}\right) \leqslant -1;$$

$$4) -2 \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) < \sqrt{2}.$$

## ! Контрольные вопросы и задания

- Постройте график функции  $y = \cos x$  и перечислите её основные свойства.
- Сравните значения  $\cos \frac{7\pi}{6}$  и  $\cos \frac{5\pi}{6}$ .
- Найдите по графику функции  $y = \cos x$  следующие значения:  $\cos 1$ ,  $\cos 2,5$  и  $\cos(-2)$ .

## 20. Свойства и графики функций $y = \operatorname{tg} x$ и $y = \operatorname{ctg} x$

Область определения функции  $y = \operatorname{tg} x$  включает в себя все числа, кроме чисел вида  $\frac{\pi}{2} + \pi n$ , где  $n \in \mathbb{Z}$ . Как и при построении синусоиды, сначала постараемся получить график функции  $y = \operatorname{tg} x$  на промежутке  $[0; \frac{\pi}{2})$ .

В левом конце этого промежутка тангенс равен нулю, а при приближении к правому концу значения тангенса не-




Рис. 102




Рис. 103




Рис. 104

ограниченно увеличиваются (рис. 102). Графически это выглядит так, как будто график функции  $y = \operatorname{tg} x$  прижимается к прямой  $x = \frac{\pi}{2}$ , уходя вместе с ней неограниченно вверх.

Вы уже встречались с таким свойством графика функции  $y = \frac{k}{x}$  ( $k \neq 0$ ): при приближении аргумента  $x$  к нулю кривая как бы прижимается к оси ординат, а при увеличении аргумента — к оси абсцисс (рис. 103). Ось абсцисс называют *горизонтальной асимптотой*, а ось ординат — *вертикальной асимптотой* графика функции  $y = \frac{k}{x}$ .

Аналогично, прямая  $x = \frac{\pi}{2}$  — вертикальная асимптота графика функции  $y = \operatorname{tg} x$ .

▼ Несколько сложнее выяснить, как выглядит график функции  $y = \operatorname{tg} x$  при приближении точек к началу координат.

Здесь снова придёт на помощь ось тангенсов. На рисунке 104 с последовательным увеличением показана зона точки касания оси тангенсов и тригонометрической окружности (каждый следующий рисунок показывает ту часть предыдущего, которая находится внутри прямоугольной рамки).

Мы видим, что при достаточно большом увеличении дуга окружности в зоне точки касания сливаются с касательной. Это значит, что при достаточно малых значениях  $x$  имеем практически  $\operatorname{tg} x \approx x$ . Поэтому график функции  $y = \operatorname{tg} x$  при малых значениях  $x$  сливается с прямой  $y = x$ . То же самое, кстати, происходит и с графиком функции  $y = \sin x$ . На рисунке 105 изображены части графиков функций  $y = \operatorname{tg} x$ ,  $y = x$  и  $y = \sin x$ . △




Рис. 105




Рис. 106

Получить график функции  $y = \operatorname{tg} x$  на промежутке  $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right]$  можно с помощью равенства  $\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x$ , говорящего о симметрии графика относительно начала координат (рис. 106).

И наконец, равенство

$$\operatorname{tg} x = \operatorname{tg}(x + \pi n), n \in \mathbb{Z}$$




Рис. 107

позволяет размножить построенную на промежутке  $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$  часть графика, сдвигая её вдоль оси абсцисс на  $\pi$ ,  $2\pi$ ,  $3\pi$  и т. д. влево и вправо (рис. 107).

График функции  $y = \operatorname{tg} x$  называют *тангенсоидой*.

### Основные свойства функции $y = \operatorname{tg} x$

- Аргумент функции может принимать любые значения, кроме  $\frac{\pi}{2} + \pi n$ , где  $n \in \mathbb{Z}$ .
- Функция может принимать любые значения.

3. Функция  $y = \operatorname{tg} x$  нечётная, так как для любого значения  $x$  из области определения  $\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x$ .

График функции  $y = \operatorname{tg} x$  симметричен относительно начала координат.

4. Функция  $y = \operatorname{tg} x$  периодическая. Её наименьшим периодом является число  $\pi$ .

5. Функция возрастает на интервалах  $\left(-\frac{\pi}{2} + \pi n; \frac{\pi}{2} + \pi n\right)$ , где  $n \in \mathbf{Z}$ . Так, при  $n = 0$  получаем промежуток возрастания  $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ , а при  $n = 1$  — промежуток  $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$ .

6. Функция  $y = \operatorname{tg} x$  принимает значение, равное нулю, при  $x = \pi n$ , где  $n \in \mathbf{Z}$ .

7. График функции  $y = \operatorname{tg} x$  имеет вертикальные асимпто-ты, уравнения которых имеют вид  $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$ , где  $n \in \mathbf{Z}$ .

Получить график функции  $y = \operatorname{ctg} x$  можно с помощью преобразования тангенсоиды, так как  $\operatorname{ctg} x = -\operatorname{tg}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ .

При этом сначала, сдвигая график функции  $y = \operatorname{tg} x$  вдоль оси абсцисс на  $\frac{\pi}{2}$  вправо, получаем график функции  $y = \operatorname{tg}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ , а затем выполняем симметрию полученного графика относительно оси абсцисс. В результате получается график функции  $y = \operatorname{ctg} x$  — **котангенсоида** (рис. 108).




Рис. 108

**✓ Пример 1.** Сравнить  $\operatorname{tg} 8$  и  $\operatorname{tg} 12$ .

**Решение.** Приведём данные тангенсы к углам от  $-\frac{\pi}{2}$

до  $\frac{\pi}{2}$ :

$$\operatorname{tg} 8 = \operatorname{tg}(8 - 3\pi), \operatorname{tg} 12 = \operatorname{tg}(12 - 4\pi).$$

Сравним  $8 - 3\pi$  и  $12 - 4\pi$ :

$$8 - 3\pi - (12 - 4\pi) = \pi - 4 < 0,$$

значит,

$$8 - 3\pi < 12 - 4\pi.$$

Поскольку на промежутке  $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$  функция  $y = \operatorname{tg} x$  возрастает, имеем

$$\operatorname{tg} 8 = \operatorname{tg}(8 - 3\pi) < \operatorname{tg}(12 - 4\pi) = \operatorname{tg} 12.$$

**Ответ:**  $\operatorname{tg} 8 < \operatorname{tg} 12$ .

**✓ Пример 2.** Найти наименьший период функции  $f(x) = \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{ctg} x$ .

**Решение.** Чтобы найти наименьший период функции  $f(x)$ , заметим, что её область определения включает в себя все числа, кроме  $\frac{\pi n}{2}$ , где  $n \in \mathbb{Z}$ . Поэтому для любого положительного  $T$ , меньшего, чем  $\frac{\pi}{2}$ , требование 1) из определения периода не выполняется, так как  $x = \frac{\pi}{2} - T$  входит в область определения, а  $x + T = \left(\frac{\pi}{2} - T\right) + T = \frac{\pi}{2}$  — не входит. С другой стороны, для  $T = \frac{\pi}{2}$  значения  $x$ ,  $x - T$  и  $x + T$  одновременно входят или не входят в область определения для любого  $x$ .

При любом значении  $x$  из области определения  $f(x)$  имеем  $f\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = f(x) = f\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ . Таким образом, наименьшим периодом функции  $f(x) = \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{ctg} x$  является  $\frac{\pi}{2}$ .

**Ответ:**  $\frac{\pi}{2}$ .

## Упражнения

**334.** Верны ли утверждения?

1) Функции  $y = \operatorname{tg} x$  и  $y = \operatorname{ctg} x$  нечётные.

2) Большему значению аргумента соответствует большее значение тангенса. Рассмотрите данное утверждение при следующих значениях аргумента:

$$\text{а)} x = \frac{\pi}{3}; \quad \text{б)} x = \pi; \quad \text{в)} x = \frac{2\pi}{3}; \quad \text{г)} x = 2\pi.$$

3) Большему значению аргумента соответствует меньшее значение котангенса. Рассмотрите данное утверждение при следующих значениях аргумента:

$$\text{а)} x = \frac{\pi}{3}; \quad \text{б)} x = \pi; \quad \text{в)} x = \frac{2\pi}{3}; \quad \text{г)} x = 2\pi.$$

**335.** Выполните задания, используя график функции  $y = \operatorname{tg} x$ .

1) Найдите приближённое значение:

$$\text{а)} \operatorname{tg} \frac{\pi}{6}; \quad \text{б)} \operatorname{tg} 1; \quad \text{в)} \operatorname{tg} 2; \quad \text{г)} \operatorname{tg} (-1).$$

2) Сравните значения:

$$\text{а)} \operatorname{tg} \left(-\frac{\pi}{7}\right) \text{ и } \operatorname{tg} \left(-\frac{\pi}{8}\right); \quad \text{в)} \operatorname{tg} 1 \text{ и } \operatorname{tg} 2;$$

$$\text{б)} \operatorname{tg} \frac{\pi}{3} \text{ и } \operatorname{tg} \frac{5\pi}{6}; \quad \text{г)} \operatorname{tg} (-1) \text{ и } \operatorname{tg} (-2).$$

3) Запишите промежутки, на которых функция  $y = \operatorname{tg} x$  принимает:

а) положительные значения;

б) отрицательные значения. 

**336.** Выполните задания, используя график функции  $y = \operatorname{ctg} x$ . 

1) Найдите приближённое значение:

$$\text{а)} \operatorname{ctg} \frac{\pi}{6}; \quad \text{б)} \operatorname{ctg} 1; \quad \text{в)} \operatorname{ctg} 2; \quad \text{г)} \operatorname{ctg} (-1).$$

2) Сравните значения:

$$\text{а)} \operatorname{ctg} \frac{\pi}{11} \text{ и } \operatorname{ctg} \frac{\pi}{12}; \quad \text{б)} \operatorname{ctg} \frac{\pi}{7} \text{ и } \operatorname{ctg} \frac{8\pi}{7}; \quad \text{в)} \operatorname{ctg} 1 \text{ и } \operatorname{ctg} 2.$$

3) Запишите промежутки, на которых функция  $y = \operatorname{ctg} x$  принимает: а) положительные значения; б) отрицательные значения.

- 337.** 1) Постройте график функции  $y = \operatorname{tg} x$  и выделите разными цветами те точки графика, ординаты которых:  
 а) равны 1, больше 1, меньше 1;  
 б) равны  $-2$ , больше  $-2$ , меньше  $-2$ .

2) Запишите абсциссы выделенных точек.

- 338.** 1) Постройте график функции  $y = \operatorname{ctg} x$  и выделите разными цветами те точки графика, ординаты которых:  
 а) равны 1, больше 1, меньше 1;  
 б) равны  $-3$ , больше  $-3$ , меньше  $-3$ .

2) Запишите абсциссы выделенных точек.

- 339.** Решите графически неравенство:

$$\begin{array}{lll} 1) \operatorname{tg} x < \sqrt{3}; & 3) \operatorname{tg} x \leq -1; & 5) \operatorname{tg} x > 3; \\ 2) \operatorname{tg} x > -\sqrt{3}; & 4) \operatorname{ctg} x < \frac{\sqrt{3}}{3}; & 6) \operatorname{ctg} x \leq -3. \end{array}$$

- 340.** Докажите, что:

$$\begin{aligned} 1) \operatorname{tg}\left(-\frac{3\pi}{4}\right) &= \operatorname{tg}\frac{\pi}{4} = \operatorname{tg}\frac{5\pi}{4}; \\ 2) \operatorname{tg}(\alpha + \pi) &= \operatorname{tg}(\alpha - 2\pi). \end{aligned}$$

- 341.** Установите, какие из следующих функций чётные, какие нечётные, а какие не являются ни чётными, ни нечётными:

$$\begin{array}{lll} 1) y = x + \sin x; & 5) y = \operatorname{tg} x \cdot |x|; \\ 2) y = \operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x; & 6) y = \cos \frac{x^2 - x}{x - 1}; \\ 3) y = x^2 \cos x; & 7) y = \operatorname{ctg} x - \cos x; \\ 4) y = \operatorname{tg}^2 x + \sin x; & 8) y = \sin \frac{x^{23} - x^{21}}{x^2 - 1}. \end{array}$$

- 342.** С помощью каких преобразований из графика функции  $y = \operatorname{tg} x$  можно получить графики функций

$y = \operatorname{tg} x + 2$  и  $y = \operatorname{tg}\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ ? Постройте в одной системе координат графики функций:

$$y = \operatorname{tg} x, \quad y = \operatorname{tg} x + 2 \quad \text{и} \quad y = \operatorname{tg}\left(x + \frac{\pi}{2}\right).$$

- 343.** Как с помощью преобразования графика функции  $y = \operatorname{ctg} x$  получить график функции:

$$1) y = \operatorname{ctg} x - 1; \quad 2) y = \operatorname{ctg}(-x); \quad 3) y = \operatorname{ctg}(x - 1)?$$

**344.** Сравните с помощью графика:

- |  |  |
|--|--|
| 1) $\operatorname{tg} 1$ и $\operatorname{tg} 2$ ;       | 4) $\operatorname{ctg} (-2)$ и $\operatorname{ctg} (-3)$ ; |
| 2) $\operatorname{tg} (-1)$ и $\operatorname{tg} (-2)$ ; | 5) $\operatorname{tg} 3$ и $\operatorname{ctg} 3$ ;        |
| 3) $\operatorname{ctg} 2$ и $\operatorname{ctg} 3$ ;     | 6) $\operatorname{ctg} 1$ и $\cos 1$ .                     |

**345.** 1) Постройте график функции:

a)  $y = |\operatorname{tg} x|$ ;      б)  $y = |\operatorname{ctg} x|$ ;      в)  $y = \operatorname{tg} |x|$ .

2) Является ли каждая функция периодической?

**346.** Найдите корни уравнения:

1)  $\operatorname{tg} x = 1$  на промежутке:

a)  $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ ;      б)  $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$ ;      в)  $(2\pi; 4\pi)$ ;

2)  $\operatorname{ctg} x = \sqrt{3}$  на промежутке:

a)  $(0; \pi)$ ;      б)  $(\pi; 2\pi)$ ;      в)  $(2\pi; 4\pi)$ ;

3)  $\operatorname{tg} x = 2$  на промежутке:

a)  $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ ;      б)  $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$ ;      в)  $(2\pi; 4\pi)$ .

**347.** При каких значениях  $x$  выполняется равенство:

1)  $\operatorname{tg} x = \operatorname{ctg} x$ ;

2)  $\operatorname{tg} x = -\operatorname{ctg} x$ ;

3)  $|\operatorname{tg} x| = |\operatorname{ctg} x|$ ?

**348.** Укажите, если возможно, промежутки возрастания функции:

1)  $y = \sin x$ ;      3)  $y = \sqrt{x}$ ;      5)  $y = x^3$ ;

2)  $y = \operatorname{tg} x$ ;      4)  $y = \operatorname{ctg} x$ ;      6)  $y = 2x + 3$ .

**349.** Найдите промежутки возрастания и промежутки убывания функции:

1)  $y = \cos \left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ ;      3)  $y = \operatorname{tg} \left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ ;

2)  $y = \sin \frac{x}{2}$ ;      4)  $y = \operatorname{ctg} \left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ .

**350.** Найдите наименьший период функции:

1)  $y = \operatorname{tg} 2x$ ;      3)  $y = \operatorname{ctg}^2 x$ ;

2)  $y = \operatorname{tg}^2 x$ ;      4)  $y = \frac{1}{\sin^2 x}$ .

**351.** На промежутке  $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$  решите графически неравенство:

$$1) \operatorname{tg} x < x;$$

$$2) \operatorname{tg} x > 1 - x^2.$$



## ! Контрольные вопросы и задания

- Сформулируйте основные свойства функции  $y = \operatorname{ctg} x$ . Какие из этих свойств имеет функция  $y = \operatorname{tg} x$ ?
- С помощью каких преобразований графика функции  $y = \operatorname{tg} x$  можно получить график функции  $y = -\operatorname{tg}(2x - \pi)$ ?

## 21. Зависимости между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента

Равенства  $\operatorname{tg} \varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi}$  и  $\operatorname{ctg} \varphi = \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi}$  выражают соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента  $\varphi$ . С их помощью, зная синус и косинус некоторого угла, можно найти его тангенс и котангенс. Из этих равенств легко получить, что тангенс и котангенс связаны между собой следующим равенством.

$$\operatorname{tg} \varphi \cdot \operatorname{ctg} \varphi = 1$$

Познакомимся с некоторыми другими зависимостями между тригонометрическими функциями.

Уравнение единичной окружности с центром в начале координат  $x^2 + y^2 = 1$  связывает абсциссу и ординату любой точки этой окружности.

### Основное тригонометрическое тождество

$$\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1$$

Основное тригонометрическое тождество часто используется при преобразовании тригонометрических выражений.



**Пример 1.** Упростить выражение  $(1 - \sin \alpha)(1 + \sin \alpha)$ .

**Решение.**

$$(1 - \sin \alpha)(1 + \sin \alpha) = \\ = 1 - \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha.$$

Здесь мы заменили единицу суммой квадратов синуса и косинуса.

$$1 - \sin^2 \varphi = \cos^2 \varphi$$

$$1 - \cos^2 \varphi = \sin^2 \varphi$$

Эти равенства, которые получены из основного тригонометрического тождества, также являются тождествами.

Разделив почленно основное тригонометрическое тождество на  $\cos^2 \varphi$ , получим:

$$\frac{\cos^2 \varphi}{\cos^2 \varphi} + \frac{\sin^2 \varphi}{\cos^2 \varphi} = \frac{1}{\cos^2 \varphi}, \text{ т. е. } 1 + \operatorname{tg}^2 \varphi = \frac{1}{\cos^2 \varphi}.$$

$$1 + \operatorname{tg}^2 \varphi = \frac{1}{\cos^2 \varphi}$$

Аналогично, делением основного тригонометрического тождества на  $\sin^2 \varphi$  получаем следующую формулу.

$$\operatorname{ctg}^2 \varphi + 1 = \frac{1}{\sin^2 \varphi}$$

Зависимости между тригонометрическими функциями позволяют по значению одной из функций находить значения остальных тригонометрических функций при том же значении аргумента.



**Пример 2.** Найти  $\cos \alpha$ ,  $\operatorname{tg} \alpha$  и  $\operatorname{ctg} \alpha$ , если известно, что

$$\sin \alpha = \frac{5}{13} \text{ и } \frac{\pi}{2} < \alpha < 2\pi.$$

**Решение.** Из равенства  $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$  получаем

$$|\cos \alpha| = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}.$$

Условие  $\frac{\pi}{2} < \alpha < 2\pi$  говорит о том, что  $\alpha$  может являться углом II, III или IV четверти. Однако синус угла  $\alpha$  в данной задаче положителен, значит,  $\alpha$  — угол II четверти.

Косинусы углов II четверти отрицательны, поэтому

$$\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha}.$$

Подставим в это равенство данное в условии значение  $\sin \alpha$ :

$$\begin{aligned}\cos \alpha &= -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2} = \\ &= -\sqrt{1 - \frac{25}{169}} = -\sqrt{\frac{144}{169}} = -\frac{12}{13}.\end{aligned}$$

Далее имеем:  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\frac{5}{13}}{-\frac{12}{13}} = -\frac{5}{12}$ ,  $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = -\frac{12}{5}$ .

**Ответ:**  $\cos \alpha = -\frac{12}{13}$ ,  $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{5}{12}$ ,  $\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{12}{5}$ .

**Пример 3.** Найти  $\sin \alpha$ ,  $\cos \alpha$  и  $\operatorname{ctg} \alpha$ , если

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{8}{15} \text{ и } \frac{\pi}{2} < \alpha < 2\pi.$$

**Решение.** Можно сразу найти  $\operatorname{ctg} \alpha$ :  $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{15}{8}$ .

Из равенства  $1 + \operatorname{tg}^2 \varphi = \frac{1}{\cos^2 \varphi}$  следует, что

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} = \frac{1}{1 + \frac{64}{225}} = \frac{225}{289}.$$

Поскольку в данной задаче  $\frac{\pi}{2} < \alpha < 2\pi$  и  $\operatorname{tg} \alpha$  положителен, то  $\alpha$  является углом III четверти (тангенсы углов II и IV четвертей отрицательны).

Учитывая, что косинусы углов III четверти отрицательны, получаем:

$$\cos \alpha = -\sqrt{\frac{225}{289}} = -\frac{15}{17}.$$

Найдём  $\sin \alpha$  из равенства  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ :

$$\sin \alpha = \cos \alpha \cdot \operatorname{tg} \alpha = -\frac{15}{17} \cdot \frac{8}{15} = -\frac{8}{17}.$$

Ответ:  $\sin \alpha = -\frac{8}{17}$ ,  $\cos \alpha = -\frac{15}{17}$ ,  $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{15}{8}$ .



**Пример 4.** Доказать тождество

$$\operatorname{ctg}^2 \alpha - \cos^2 \alpha = \cos^2 \alpha \cdot \operatorname{ctg}^2 \alpha.$$

**Решение.** Преобразуем левую часть равенства:

$$\begin{aligned}\operatorname{ctg}^2 \alpha - \cos^2 \alpha &= \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} - \cos^2 \alpha = \cos^2 \alpha \left( \frac{1}{\sin^2 \alpha} - 1 \right) = \\ &= \cos^2 \alpha \left( \frac{1 - \sin^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} \right) = \cos^2 \alpha \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} = \cos^2 \alpha \cdot \operatorname{ctg}^2 \alpha,\end{aligned}$$

что и требовалось доказать.

## Упражнения

**352.** Могут ли синус и косинус одного и того же аргумента быть равными соответственно:

$$1) \frac{5}{13} \text{ и } \frac{12}{13}; \quad 2) \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \text{ и } \frac{-b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, |a| + |b| \neq 0?$$

**353.** Найдите значения тригонометрических функций угла  $\alpha$ , если:

$$1) \sin \alpha = \frac{56}{65} \text{ и } 0 < \alpha < \frac{\pi}{2};$$

$$2) \sin \alpha = \frac{80}{89} \text{ и } \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi;$$

$$3) \cos \alpha = -\frac{12}{37} \text{ и } 0 < \alpha < \pi;$$

$$4) \cos \alpha^\circ = -\frac{40}{41} \text{ и } 180^\circ < \alpha^\circ < 360^\circ;$$

$$5) \operatorname{tg} \alpha = \frac{24}{7} \text{ и } \pi < \alpha < 2\pi;$$

$$6) \operatorname{tg} \alpha^\circ = -\frac{11}{60} \text{ и } 180^\circ < \alpha^\circ < 360^\circ;$$

7)  $\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{5}{12}$  и  $\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ ;

8)  $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{12}{35}$  и  $\pi < \alpha < 2\pi$ .

**354.** Упростите выражение:

1)  $1 - \sin^2 \alpha$ ;

9)  $\frac{\operatorname{tg}^2 \beta - \sin^2 \beta}{\operatorname{ctg}^2 \beta - \cos^2 \beta}$ ;

2)  $\cos^2 \beta - 1$ ;

10)  $\frac{\sin^2 \alpha}{1 - \sin^2 \alpha} \cdot \operatorname{ctg} \alpha$ ;

3)  $\cos \alpha \operatorname{tg} \alpha$ ;

11)  $\frac{\sin \beta}{1 - \cos \beta} + \frac{\sin \beta}{1 + \cos \beta}$ ;

4)  $\sin \alpha \operatorname{ctg} \alpha$ ;

12)  $\frac{\cos \beta}{1 - \sin \beta} + \frac{\cos \beta}{1 + \sin \beta}$ ;

5)  $\frac{\cos^2 \beta}{1 + \sin \beta}$ ;

13)  $\frac{\sin \beta}{1 + \cos \beta} + \operatorname{ctg} \beta$ ;

6)  $\frac{1 - \cos \alpha}{\sin^2 \alpha}$ ;

14)  $\frac{\cos \beta}{1 - \sin \beta} - \operatorname{tg} \beta$ ;

7)  $\cos^4 \alpha - \sin^4 \alpha$ ;

15)  $\sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} + \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}}$ ;

8)  $(1 - \cos \alpha)(1 + \cos \alpha)$ ;

16)  $\sqrt{\frac{1 + \sin \alpha}{1 - \sin \alpha}} + \sqrt{\frac{1 - \sin \alpha}{1 + \sin \alpha}}$ .

**355.** Найдите значение выражения:

1)  $\frac{4 \sin \alpha - 5 \cos \alpha}{2 \sin \alpha - \cos \alpha}$  при  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{2}{3}$ ;

2)  $\frac{5 \sin \alpha + 2 \cos \alpha}{3 \sin \alpha - 4 \cos \alpha}$  при  $\operatorname{tg} \alpha = -0,4$ .

**356.** Докажите тождество:

1)  $\frac{\sin \varphi}{1 + \cos \varphi} = \frac{1 - \cos \varphi}{\sin \varphi}$ ;

2)  $\frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha} = \frac{\operatorname{tg} \alpha - 1}{\operatorname{tg} \alpha + 1}$ ;

3)  $\sin^4 \beta + \sin^2 \beta \cos^2 \beta + \cos^2 \beta = 1$ ;

4)  $\sin^2 \alpha + \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + \cos^4 \alpha = 1$ ;

5)  $\cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha \operatorname{ctg}^2 \alpha = \operatorname{ctg}^2 \alpha$ ;

6)  $\sin^2 \alpha + \sin^2 \alpha \operatorname{tg}^2 \alpha = \operatorname{tg}^2 \alpha$ ;

7)  $1 + \sin x + \cos x + \operatorname{tg} x = (1 + \cos x)(1 + \operatorname{tg} x)$ ;

8)  $1 + \cos \beta - \sin \beta - \operatorname{tg} \beta = (1 + \cos \beta)(1 - \operatorname{tg} \beta)$ ;

$$9) \frac{\sin^3 \alpha + \cos^3 \alpha}{1 - \sin \alpha \cos \alpha} = \sin \alpha + \cos \alpha;$$

$$10) \frac{\sin^3 \alpha - \cos^3 \alpha}{1 + \sin \alpha \cos \alpha} = \cos \alpha - \sin \alpha;$$

$$11) \operatorname{tg}^2 \alpha - \operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} - \frac{1}{\sin^2 \alpha};$$

$$12) (\operatorname{tg}^2 \alpha - \sin^2 \alpha) \operatorname{ctg}^2 \alpha = \sin^2 \alpha;$$

$$13) \frac{1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha}{\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha} = \frac{\operatorname{tg} \alpha + 1}{\operatorname{tg} \alpha - 1};$$

$$14) \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{ctg} \alpha = \frac{1 - 2 \cos^2 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha}.$$

**357.** Упростите выражение:

$$1) \sin 165^\circ + \cos 195^\circ \operatorname{ctg} 255^\circ;$$

$$2) \cos 320^\circ - \sin 220^\circ \operatorname{tg} 130^\circ;$$

$$3) \operatorname{tg} 110^\circ \operatorname{tg} 100^\circ \operatorname{tg} 45^\circ \operatorname{ctg} 70^\circ \operatorname{ctg} 80^\circ;$$

$$4) \operatorname{ctg} 135^\circ \operatorname{ctg} 125^\circ \operatorname{ctg} 115^\circ \operatorname{ctg} 35^\circ \operatorname{ctg} 25^\circ;$$

$$5) \frac{\operatorname{tg} 205^\circ}{1 - \operatorname{ctg}^2 155^\circ} \cdot \frac{\operatorname{tg}^2 65^\circ - \operatorname{tg} 45^\circ}{\operatorname{ctg} 295^\circ};$$

$$6) \frac{\operatorname{tg} 144^\circ}{1 + \operatorname{tg}^2 216^\circ} : \frac{\operatorname{tg}^2 126^\circ}{1 + \operatorname{ctg}^2 324^\circ}.$$

**358.** Решите уравнение:

$$1) \textcircled{1} (\sin x + \cos x)^2 - 1 = 0;$$

$$2) \textcircled{2} (\sin x + \cos x)^2 = 1 + \sin x \cos x;$$

$$3) \textcircled{3} 8 \sin^2 x - 18 \sin x + 7 = 0;$$

$$4) \textcircled{4} 4 \cos^2 x - 4 \cos x - 3 = 0;$$

$$5) \textcircled{5} (\sin x + 1)^2 = \sin^2 x + 1;$$

$$6) \textcircled{6} \cos^2 x + \cos x = -\sin^2 x;$$

$$7) \textcircled{7} 3 \sin x = 2 \cos^2 x;$$

$$8) \textcircled{8} 3 \cos x = -2 \sin x;$$

$$9) \textcircled{9}^* \sin x + \cos x = 1,4;$$

$$10) \textcircled{10}^* \sin x - \cos x = \frac{7}{13}.$$

**359.**  $\textcircled{1}$  Докажите, что значение выражения не зависит от переменной  $x$ :

$$(a \sin x + b \cos x)^2 + (b \sin x - a \cos x)^2.$$

**360.**  $\textcircled{2}$  Известно, что  $\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{ctg} \alpha = 3$ . Найдите:

$$1) \operatorname{tg}^2 \alpha + \operatorname{ctg}^2 \alpha;$$

$$2) \operatorname{tg}^4 \alpha + \operatorname{ctg}^4 \alpha.$$

**361.** Известно, что  $\alpha$  — угол I четверти. Могут ли при одном и том же  $\alpha$  оказаться верными неравенства:

$$1) \sin \alpha < \frac{1}{2} \text{ и } \cos \alpha < \frac{1}{2}; \quad 2) \operatorname{tg} \alpha < 2 \text{ и } \operatorname{ctg} \alpha < 2?$$

**362.** Докажите, что для любого острого угла:

- 1) сумма его синуса и косинуса больше 1;
- 2) сумма его тангенса и котангенса не меньше 2.



### Контрольные вопросы и задания

1. Как, зная синус угла, найти тангенс этого угла? Как решить обратную задачу: зная тангенс угла, найти синус этого угла?
2. Найдите  $\sin \alpha$ ,  $\operatorname{tg} \alpha$  и  $\operatorname{ctg} \alpha$ , если  $\cos \alpha = -\frac{15}{17}$  и  $\alpha$  — угол III четверти.
3. Упростите выражение  $\frac{\cos^2 \alpha}{1 - \cos^2 \alpha} \cdot \operatorname{tg} \alpha$ .
4. Найдите значение выражения:
  - a)  $\lg \operatorname{tg} 3^\circ \cdot \lg \operatorname{tg} 6^\circ \cdot \lg \operatorname{tg} 9^\circ \cdot \dots \cdot \lg \operatorname{tg} 87^\circ$ ;
  - b)  $\lg \operatorname{tg} 3^\circ + \lg \operatorname{tg} 6^\circ + \lg \operatorname{tg} 9^\circ + \dots + \lg \operatorname{tg} 87^\circ$ .

## 22. Синус и косинус суммы и разности двух углов

Точки  $P_{\alpha+\beta}$ ,  $P_\alpha$  и  $P_{-\beta}$  — конечные точки поворотов на углы  $\alpha + \beta$ ,  $\alpha$  и  $-\beta$  (рис. 109). Хорда  $P_{\alpha+\beta}P_0$  единичной окружности при повороте на угол  $-\beta$  вокруг начала координат совпадает с хордой  $P_\alpha P_{-\beta}$ , значит, длины отрезков  $P_{\alpha+\beta}P_0$  и  $P_\alpha P_{-\beta}$  равны.

Выразим длины этих отрезков, используя формулу расстояния между точками  $A(x_1; y_1)$  и  $B(x_2; y_2)$  координатной плоскости:

$$AB = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$




Рис. 109

Подставляя в эту формулу координаты точек  $P_0$ ,  $P_{\alpha+\beta}$ ,  $P_\alpha$ ,  $P_{-\beta}$ , получим:

$$P_0P_{\alpha+\beta} = \sqrt{(\cos(\alpha + \beta) - 1)^2 + (\sin(\alpha + \beta) - 0)^2},$$

$$P_\alpha P_{-\beta} = \sqrt{(\cos \alpha - \cos(-\beta))^2 + (\sin \alpha - \sin(-\beta))^2}.$$

Так как длины отрезков равны, то

$$\begin{aligned} & \sqrt{(\cos(\alpha + \beta) - 1)^2 + \sin^2(\alpha + \beta)} = \\ & = \sqrt{(\cos \alpha - \cos \beta)^2 + (\sin \alpha + \sin \beta)^2}. \end{aligned}$$

Возведём обе части этого равенства в квадрат:

$$\begin{aligned} & (\cos(\alpha + \beta) - 1)^2 + \sin^2(\alpha + \beta) = \\ & = (\cos \alpha - \cos \beta)^2 + (\sin \alpha + \sin \beta)^2. \end{aligned}$$

Преобразуем левую часть полученного равенства:

$$\begin{aligned} & (\cos(\alpha + \beta) - 1)^2 + \sin^2(\alpha + \beta) = \\ & = \cos^2(\alpha + \beta) - 2 \cos(\alpha + \beta) + 1 + \sin^2(\alpha + \beta) = \\ & = 2 - 2 \cos(\alpha + \beta). \end{aligned}$$

Теперь преобразуем правую часть равенства:

$$\begin{aligned} & (\cos \alpha - \cos \beta)^2 + (\sin \alpha + \sin \beta)^2 = \\ & = \cos^2 \alpha - 2 \cos \alpha \cos \beta + \cos^2 \beta + \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \sin \beta + \sin^2 \beta = \\ & = 2 - 2(\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$2 - 2 \cos(\alpha + \beta) = 2 - 2(\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta).$$

Отсюда

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta.$$

### Формула косинуса суммы

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Заменяя в этой формуле  $\beta$  на  $-\beta$ :

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos(-\beta) - \sin \alpha \sin(-\beta),$$

получим  $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ .

### Формула косинуса разности

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

С помощью формул приведения выведем формулу синуса суммы:

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right) = \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \cos \beta + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \sin \beta = \\ &= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta.\end{aligned}$$

### Формула синуса суммы

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

Заменяя в этой формуле  $\beta$  на  $-\beta$ :

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos(-\beta) + \cos \alpha \sin(-\beta),$$

получим  $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$ .

### Формула синуса разности

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$



**Пример 1.** Доказать тождество

$$\frac{\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)}{\sin(\alpha + \beta) - \sin \alpha \cos \beta} = 2 \operatorname{tg} \alpha.$$

**Доказательство.** Преобразуем левую часть равенства:

$$\begin{aligned}&\frac{\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)}{\sin(\alpha + \beta) - \sin \alpha \cos \beta} = \\ &= \frac{\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta - (\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta)}{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta - \sin \alpha \cos \alpha} = \\ &= \frac{2 \sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \sin \beta} = 2 \operatorname{tg} \alpha,\end{aligned}$$

что и требовалось доказать.



**Пример 2.** Упростить выражение

$$\frac{\cos 75^\circ \cos 65^\circ - \sin 75^\circ \sin 65^\circ}{\sin 85^\circ \cos 35^\circ - \cos 85^\circ \sin 35^\circ}.$$

В числителе дроби замечаем правую часть формулы косинуса суммы, а в знаменателе — синуса разности:

$$\frac{\cos 75^\circ \cos 65^\circ - \sin 75^\circ \sin 65^\circ}{\sin 85^\circ \cos 35^\circ - \cos 85^\circ \sin 35^\circ} = \frac{\cos(75^\circ + 65^\circ)}{\sin(85^\circ - 35^\circ)} = \\ = \frac{\cos 140^\circ}{\sin 50^\circ} = \frac{\cos(90^\circ + 50^\circ)}{\sin 50^\circ} = \frac{-\sin 50^\circ}{\sin 50^\circ} = -1.$$

## Упражнения

**363.** Найдите длину хорды единичной окружности:

$$1) P_0P_{\frac{\pi}{2}}; \quad 2) P_{\frac{\pi}{2}}P_{2\pi}; \quad 3) P_0P_{-\frac{\pi}{2}}; \quad 4) P_\alpha P_\beta.$$

**364.** Преобразуйте выражение, используя формулы синуса и косинуса суммы и разности:

1) $\cos(\alpha^\circ + 70^\circ)$ ;	9) $\sin\left(\varphi - \frac{\pi}{2}\right)$ ;
2) $\cos(20^\circ + \beta^\circ)$ ;	10) $\sin\left(\frac{3\pi}{2} - \beta\right)$ ;
3) $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$ ;	11) $\cos\left(\varphi - \frac{3\pi}{2}\right)$ ;
4) $\cos\left(\frac{\pi}{3} - \beta\right)$ ;	12) $\cos\left(\frac{5\pi}{4} + \beta\right)$ ;
5) $\cos\left(\frac{\pi}{4} + \gamma\right)$ ;	13) $\cos(\alpha + \alpha)$ ;
6) $\cos\left(\beta - \frac{\pi}{2}\right)$ ;	14) $\cos\left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right)$ ;
7) $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ ;	15) $\sin\left(\beta + \frac{\pi}{3}\right)$ ;
8) $\sin\left(\frac{3\pi}{4} + \alpha\right)$ ;	16) $\sin(\alpha + \alpha)$ .

**365.** Найдите:

1)  $\sin(\alpha + \beta)$ , если  $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ ,  $\sin \beta = \frac{24}{25}$ ,

$$0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \text{ и } 0 < \beta < \frac{\pi}{2};$$

2)  $\sin(\alpha - \beta)$ , если  $\sin \alpha = \frac{20}{29}$ ,  $\cos \beta = \frac{7}{25}$ ,

$$0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \text{ и } 0 < \beta < \frac{\pi}{2};$$

3)  $\cos(\alpha + \beta)$ , если  $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$ ,  $\cos \beta = -\frac{12}{13}$ ,

$0 < \alpha < \pi$  и  $0 < \beta < \pi$ ;

4)  $\cos(\alpha - \beta)$ , если  $\sin \alpha = -\frac{21}{29}$ ,  $\sin \beta = \frac{7}{25}$ ,

$\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$  и  $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$ ;

5)  $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ , если  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{7}{24}$ ,  $0 < \alpha < \pi$ ;

6)  $\cos\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right)$ , если  $\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{3}{4}$  и  $0 < \alpha < \pi$ .

**366.** Используя известные значения синусов и косинусов углов  $30^\circ$ ,  $45^\circ$  и  $60^\circ$ , найдите синус и косинус угла:

1)  $15^\circ$ ;                    2)  $75^\circ$ ;                    3)  $105^\circ$ .

**367.** 1) Синусы двух углов остроугольного треугольника равны  $\frac{5}{13}$  и  $\frac{8}{17}$ . Найдите синус третьего угла.

2) Синусы двух углов некоторого треугольника равны 0,5 и 0,6. Каким может быть синус его третьего угла?  
3) Чем отличаются задачи 1) и 2)?

**368.** Найдите косинус третьего угла треугольника, если косинусы двух его углов равны:

1)  $-\frac{7}{25}$  и  $\frac{12}{13}$ ;                    2) 0,8 и  $\frac{20}{29}$ .

**369.** Упростите выражение (выявите закономерность на первых двух заданиях и примените её к остальным):

1)  $\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$ ;

2)  $\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)$ ;

3)  $\cos\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) + \cos\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)$ ;

4)  $\sin\left(\beta + \frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\beta - \frac{\pi}{6}\right)$ .

**370.** 1) Упростите выражение (выявите закономерность на первых двух примерах и примените её к остальным):

a)  $\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)$ ;

b)  $\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)$ ;

v)  $\cos\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) - \cos\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)$ ;

г)  $\sin\left(\beta + \frac{\pi}{6}\right) - \sin\left(\beta - \frac{\pi}{6}\right)$ .

2) Сравните закономерности, выявленные в заданиях 369 и 370.

371. Сравните значения выражений:

1)  $\frac{\cos 50^\circ \cos 20^\circ - \sin 50^\circ \sin 20^\circ}{\cos 85^\circ \cos 15^\circ + \sin 85^\circ \sin 15^\circ}$

и  $\frac{\cos 70^\circ \cos 40^\circ - \sin 70^\circ \sin 40^\circ}{\cos 50^\circ \cos 20^\circ - \sin 50^\circ \sin 20^\circ}$ ;

2)  $\frac{\sin 48^\circ \cos 52^\circ + \sin 52^\circ \cos 48^\circ}{\cos 75^\circ \cos 5^\circ - \sin 5^\circ \sin 75^\circ}$

и  $\frac{\cos 75^\circ \cos 85^\circ - \sin 75^\circ \sin 85^\circ}{\sin 32^\circ \cos 12^\circ - \cos 32^\circ \sin 12^\circ}$ ;

3)  $\frac{\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)}{\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)}$  и  $\frac{\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)}{\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)}$ .

372. Упростите выражение:

1)  $\frac{\sin 48^\circ - \sin 23^\circ \cos 25^\circ}{\sin 2^\circ + \sin 23^\circ \cos 25^\circ}$ ;      2)  $\frac{\cos 40^\circ + \sin 24^\circ \sin 16^\circ}{\sin 24^\circ \sin 16^\circ - \cos 8^\circ}$ .

373. Найдите значение выражения:

1)  $\sin 50^\circ \cos 5^\circ - \sin 5^\circ \cos 50^\circ$ ;

2)  $\cos 32^\circ \cos 28^\circ - \sin 32^\circ \sin 28^\circ$ ;

3)  $\sin 85^\circ \cos 65^\circ + \sin 65^\circ \cos 85^\circ$ ;

4)  $\cos 160^\circ \cos 25^\circ + \sin 160^\circ \sin 25^\circ$ .

374. Упростите выражение

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right) \cos x + \sin 2x \cdot \sin(\pi + x)$$

и укажите все  $x$ , при которых его значение равно  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ .

375. Укажите наименьшее положительное число  $x$ , при котором значение выражения  $\cos 30^\circ \cos x^\circ - \sin 30^\circ \sin x^\circ$

равно  $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ .

376. Докажите тождество:

1)  $\frac{2 \sin(\alpha^\circ + 30^\circ) - \cos \alpha^\circ}{2 \cos(\alpha^\circ - 30^\circ) - \sqrt{3} \cos \alpha^\circ} = \sqrt{3}$ ;

2)  $\frac{\sqrt{2} \sin(\beta^\circ - 45^\circ) + \cos \beta^\circ}{\sqrt{2} \cos(\beta^\circ + 45^\circ) + \sin \beta^\circ} = \operatorname{tg} \beta^\circ$ .

**377.** Докажите тождество

$$\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) = \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta.$$

**378.** Докажите одну из формул приведения, используя формулы данного пункта.

**379.** Докажите, что  $\cos 15^\circ - \sin 15^\circ = \sin 45^\circ$ .

**380.** Докажите, что:

1) если  $\sin \alpha = \frac{4\sqrt{3}}{13}$ ,  $\sin \beta = \frac{11}{13}$ ,  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$  и  $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$ ,

то  $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$ ;

2) если  $\sin \alpha = \frac{2}{3}$ ,  $\cos \beta = -\frac{\sqrt{5}}{3}$ ,  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$  и  $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$ ,

то  $\alpha + \beta = \pi$ .

**381.** Решите уравнение:

1)  $\sin 2x \cos x + \cos 2x \sin x = 0$ ;

2)  $\cos 2x \cos x - \sin 2x \sin x = 1$ ;

3)  $\cos 3x \cos \frac{\pi}{6} + 0,5 = \sin 3x \sin \frac{\pi}{6}$ ;

4)  $\sin \frac{3\pi}{2} \cos 2x = \cos \frac{3\pi}{2} \sin 2x - 1$ .



## Контрольные вопросы и задания

- Напишите формулу длины отрезка с концами в точках  $P_\alpha$  и  $P_\beta$  — конечных точках поворотов на углы  $\alpha$  и  $\beta$ . Найдите по этой формуле длину отрезка  $P_{\frac{\pi}{2}} P_{\frac{\pi}{6}}$ .
- Найдите  $\sin(\alpha + \beta)$ , если:  
 $\sin \alpha = \frac{40}{41}$ ,  $\cos \beta = -\frac{3}{5}$ ,  $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$  и  $\pi < \beta < 2\pi$ .
- Упростите выражение  $\frac{\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)}$ .

## 23. Тангенс суммы и тангенс разности двух углов

Тангенс суммы двух углов можно выразить через синусы и косинусы данных углов:

$$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}.$$

Чтобы выразить тангенс суммы двух углов через тангенсы этих углов, разделим числитель и знаменатель дроби на произведение  $\cos \alpha \cos \beta$  (если существуют тангенсы углов  $\alpha$  и  $\beta$ , то произведение косинусов этих углов отлично от нуля):

$$\frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta} = \frac{\frac{\sin \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} + \frac{\cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}}{1} = \frac{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\sin \beta}{\cos \beta}}{1 - \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}} = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}.$$

### Формула тангенса суммы

$$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}$$

Заметим, что если  $\operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta = 1$ , то  $\operatorname{tg}(\alpha + \beta)$  не существует.

Такая ситуация наблюдается с острыми углами прямоугольного треугольника. Их сумма равна  $90^\circ$ , и тангенса у неё нет.

Формулу тангенса разности получаем, заменяя в формуле тангенса суммы  $\beta$  на  $-\beta$ :

$$\operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg}(-\beta)}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg}(-\beta)} = \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{(1 + t)\operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}.$$

### Формула тангенса разности

$$\operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}$$



**Пример 1.** Доказать, что если  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{5}{8}$ ,  $\operatorname{tg} \beta = \frac{3}{13}$ ,

$$0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \text{ и } 0 < \beta < \frac{\pi}{2}, \text{ то } \alpha + \beta = \frac{\pi}{4}.$$

**Доказательство.** Найдём тангенс суммы углов  $\alpha$  и  $\beta$ :

$$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta} = \frac{\frac{5}{8} + \frac{3}{13}}{1 - \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{13}} = 1.$$

Сложив почленно неравенства  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$  и  $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$ , получим  $0 < \alpha + \beta < \pi$ .

Единственным углом в промежутке от 0 до  $\pi$ , тангенс которого равен 1, является угол  $\frac{\pi}{4}$ . Значит,  $\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$ , что и требовалось доказать.

### Пример 2. Упростить выражение

$$\frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{\operatorname{tg}(\alpha + \beta)} + \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{\operatorname{tg}(\alpha - \beta)}.$$

Решение.

$$\begin{aligned} \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{\operatorname{tg}(\alpha + \beta)} + \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{\operatorname{tg}(\alpha - \beta)} &= \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{\frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}} + \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{\frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}} = \\ &= 1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta + 1 + \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta = 2. \end{aligned}$$

Ответ: 2.

## Упражнения

382. При  $\operatorname{tg} \alpha^\circ = 1,5$  и  $\operatorname{tg} \beta = 1,5$  найдите:

- |   |   |
|---|---|
| 1) $\operatorname{tg}(\alpha^\circ + 60^\circ)$ ; | 3) $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{6} - \beta\right)$ ;  |
| 2) $\operatorname{tg}(45^\circ - \alpha^\circ)$ ; | 4) $\operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{4} + \beta\right)$ . |

383. Используя известные значения тангенсов углов  $30^\circ$ ,  $45^\circ$  и  $60^\circ$ , найдите:

- 1)  $\operatorname{tg} 15^\circ$ ;      2)  $\operatorname{tg} 75^\circ$ ;      3)  $\operatorname{tg} 105^\circ$ .

384. Найдите: 1)  $\operatorname{tg}(\alpha + \beta)$ ; 2)  $\operatorname{tg}(\alpha - \beta)$ , если:

- a)  $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{1}{5}$ ,  $\operatorname{tg} \beta = \frac{4}{3}$ ;
- б)  $\operatorname{tg} \alpha = 1,2$ ,  $\sin \beta = -0,8$  и  $-\frac{\pi}{2} < \beta < 0$ ;
- в)  $\sin \alpha = \frac{8}{17}$ ,  $\cos \beta = -\frac{12}{13}$  и  $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ ,  $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$ .

**385.** Найдите  $\operatorname{tg} \beta$ , если:

- 1)  $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \beta\right) = 2$ ;
- 3)  $\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = 3$  и  $\operatorname{tg} \alpha = 2$ ;
- 2)  $\operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{4} - \beta\right) = -2$ ;
- 4)  $\operatorname{tg}(\alpha - \beta) = 2,5$  и  $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{1}{3}$ .

**386.** Найдите тангенс третьего угла треугольника, если тангенсы двух его углов равны:

- 1)  $\frac{5}{4}$  и  $0,9$ ;
- 2)  $\frac{1}{3}$  и  $0,4$ .

**387.** Тангенсы двух углов треугольника равны  $\frac{2}{3}$  и  $1,5$ . Найдите третий угол треугольника.

**388.** Найдите значение выражения:

- 1)  $\frac{\operatorname{tg} 23^\circ + \operatorname{tg} 22^\circ}{1 - \operatorname{tg} 22^\circ \operatorname{tg} 23^\circ}$ ;
- 3)  $\frac{1 + \operatorname{tg} 273^\circ \operatorname{tg} 63^\circ}{\operatorname{tg} 273^\circ - \operatorname{tg} 63^\circ}$ ;
- 2)  $\frac{\operatorname{tg} 73^\circ - \operatorname{tg} 43^\circ}{1 + \operatorname{tg} 73^\circ \operatorname{tg} 43^\circ}$ ;
- 4)  $\frac{1 - \operatorname{tg} 161^\circ \operatorname{tg} 139^\circ}{\operatorname{tg} 161^\circ + \operatorname{tg} 139^\circ}$ .

**389.** Какое из следующих выражений имеет значение  $\frac{1}{\sqrt{3}}$ :

- 1)  $\sin 23^\circ \cos 37^\circ - \cos 23^\circ \sin 37^\circ$ ;
- 2)  $\sin 54^\circ \cos 24^\circ - \cos 54^\circ \sin 24^\circ$ ;
- 3)  $\frac{\operatorname{tg} 18^\circ + \operatorname{tg} 12^\circ}{1 - \operatorname{tg} 18^\circ \operatorname{tg} 12^\circ}$ ?

**390.** Верно ли, что значение данного выражения равно 1:

- 1)  $\sin 126^\circ \cos 36^\circ - \cos 126^\circ \sin 36^\circ$ ;
- 2)  $\cos 152^\circ \cos 28^\circ - \sin 152^\circ \sin 28^\circ$ ;
- 3)  $\frac{\operatorname{tg} 14^\circ + \operatorname{tg} 31^\circ}{1 - \operatorname{tg} 14^\circ \operatorname{tg} 31^\circ}$ ?

**391.** Докажите тождество:

- 1)  $1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta = \frac{\cos(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta}$ ;
- 2)  $\frac{\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{\operatorname{ctg} \alpha - \operatorname{tg} \beta} = \frac{\cos(\alpha - \beta)}{\cos(\alpha + \beta)}$ ;
- 3)  $\frac{\operatorname{tg}(\alpha + \beta) - \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{\operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg}(\alpha + \beta)} = \operatorname{tg} \beta$ ;
- 4)  $\frac{\operatorname{tg}(\beta - \alpha) \operatorname{tg} \beta}{\operatorname{tg}(\alpha - \beta) - (\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta)} = \operatorname{ctg} \alpha$ .

**392.** Решите уравнение:

$$1) \frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} 2x}{1 - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} 2x} = \sqrt{3};$$

$$4) \frac{\operatorname{tg} \frac{\pi}{6} - \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg} \frac{\pi}{6} \operatorname{tg} x} = 0;$$

$$2) \frac{\operatorname{tg} 3x - \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg} 3x \operatorname{tg} x} = -1;$$

$$5) \frac{\operatorname{tg} \frac{\pi}{2} + \operatorname{tg} 2x}{1 - \operatorname{tg} \frac{\pi}{2} \operatorname{tg} 2x} = -\frac{\sqrt{3}}{3};$$

$$3) \operatorname{tg} x + 4 \operatorname{ctg} x = 4;$$

$$6) \operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg} x - 6 = 0.$$

**393.** Докажите одну из формул приведения, воспользовавшись формулами данного пункта.

**394.** Упростите выражение:

$$1) \frac{\operatorname{tg}^2 50^\circ - \operatorname{tg}^2 5^\circ}{1 - \operatorname{tg}^2 50^\circ \operatorname{tg}^2 5^\circ};$$

$$2) \frac{1 - \operatorname{tg}^2 35^\circ \operatorname{tg}^2 25^\circ}{\operatorname{tg}^2 35^\circ - \operatorname{tg}^2 25^\circ}.$$

**395.** Укажите две пары чисел  $\alpha$  и  $\beta$  таких, что  $0 < \alpha < \pi$ ,  $0 < \beta < \pi$ , причём:

$$1) \operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta;$$

$$2) \operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta.$$

**396.** 1) Докажите, что:

а) угол между прямыми  $y = 2x$  и  $y = \frac{1}{3}x$  равен  $45^\circ$ ;

б) прямые  $y = 0,4x$  и  $y = -2,5x$  взаимно перпендикулярны.

2) Как связаны между собой угловые коэффициенты  $k_1$  и  $k_2$  двух взаимно перпендикулярных прямых?



## Контрольные вопросы и задания

1. Выведите формулу тангенса разности, заменив тангенс частным синуса и косинуса.
2. Найдите  $\operatorname{tg}(135^\circ + \alpha^\circ)$ , если  $\operatorname{tg} \alpha^\circ = -\frac{1}{3}$ .
3. Упростите выражение  $\operatorname{tg}\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) \operatorname{tg}\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$ .

## 24. Тригонометрические функции двойного угла

**Задача.** Тангенс вписанного угла  $ABC$  равен  $\frac{5}{4}$  (рис. 110). Найти тангенс центрального угла  $AOC$ .

**Решение.** Обозначим величину вписанного угла  $ABC$  буквой  $\alpha$ , тогда величина центрального угла  $AOC$  равна  $2\alpha$ .

Для вычисления  $\operatorname{tg} 2\alpha$  воспользуемся формулой тангенса суммы:

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} 2\alpha &= \operatorname{tg}(\alpha + \alpha) = \\ &= \frac{2\operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha} = \frac{2 \cdot \frac{5}{4}}{1 - \left(\frac{5}{4}\right)^2} = -\frac{40}{9}.\end{aligned}$$

Ответ:  $-\frac{40}{9}$ .




Рис. 110

### Формула тангенса двойного угла

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

Подобным же образом из формул синуса и косинуса суммы получаем формулы двойного угла:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha, \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha.$$

**Пример 1.** Найти  $\sin 2\alpha$ , если  $\sin \alpha = \frac{20}{29}$  и  $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ .

**Решение.** Учитывая, что  $\alpha$  — угол второй четверти, имеем:

$$\begin{aligned}\cos \alpha &= -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \\ &= -\sqrt{1 - \left(\frac{20}{29}\right)^2} = -\sqrt{\frac{29^2 - 20^2}{29^2}} = -\frac{\sqrt{9 \cdot 49}}{29} = -\frac{21}{29}.\end{aligned}$$

Применяя формулу синуса двойного угла, получим:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \frac{20}{29} \cdot \left(-\frac{21}{29}\right) = -\frac{840}{841}.$$

Ответ:  $-\frac{840}{841}$ .

Косинус двойного угла можно выразить через косинус или через синус одинарного угла:

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha - 2 \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha,$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - (1 - \cos^2 \alpha) = 2 \cos^2 \alpha - 1.$$

$$\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha \quad \cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

Из формулы косинуса двойного угла можно выразить косинус и синус угла, в 2 раза меньшего.

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \quad \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

**Пример 2.** Решить уравнение  $\sin^4 x + \cos^4 x = \frac{5}{8}$ .

$$\text{Решение. } \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^2 + \left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right)^2 = \frac{5}{8},$$

$$1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x + 1 + 2 \cos 2x + \cos^2 2x = \frac{5}{2},$$

$$2 + 2 \cos^2 2x = \frac{5}{2}.$$

Понизим степень ещё раз:

$$2 + 1 + \cos 4x = \frac{5}{2}, \cos 4x = \frac{5}{2} - 3, \cos 4x = -\frac{1}{2}.$$

$$4x_1 = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, 4x_2 = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbf{Z},$$

$$x_1 = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{2}, x_2 = -\frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbf{Z}.$$

Ответ:  $x_1 = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{2}, x_2 = -\frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbf{Z}$ .



**Пример 3.** Доказать тождество  $\cos 2\alpha = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}$ .

**Решение.** Преобразуем правую часть равенства:

$$\begin{aligned}\frac{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} &= \frac{1 - \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha}}{1 + \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha}} = \frac{\frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha}}{\frac{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha}} = \\ &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos 2\alpha,\end{aligned}$$

что и требовалось доказать.

### Упражнения

**397.** Преобразуйте по формулам двойного угла выражение:

1)  $\sin 22^\circ$ ;

8)  $\sin \frac{2\pi}{5}$ ;

15)  $\sin 3\alpha$ ;

2)  $\sin 42^\circ$ ;

9)  $\cos \frac{\pi}{7}$ ;

16)  $\cos \frac{\alpha}{2}$ ;

3)  $\cos 14^\circ$ ;

10)  $\cos \frac{3\pi}{8}$ ;

17)  $\sin(\alpha + \beta)$ ;

4)  $\cos 66^\circ$ ;

11)  $\operatorname{tg} 0,3\pi$ ;

18)  $\cos(\alpha - \beta)$ ;

5)  $\operatorname{tg} 26^\circ$ ;

12)  $\operatorname{tg} \frac{3\pi}{7}$ ;

19)  $\sin\left(\frac{\pi}{4} - \varphi\right)$ ;

6)  $\operatorname{tg} 51^\circ$ ;

13)  $\sin \alpha$ ;

20)  $\cos\left(\frac{\pi}{4} + \varphi\right)$ ;

7)  $\sin 0,2\pi$ ;

14)  $\cos \alpha$ ;

21)  $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \varphi\right)$ .

**398.** Найдите значение:

1)  $\sin 2\alpha$ , если  $\sin \alpha = 0,8$  и  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ ;

2)  $\sin 2\alpha$ , если  $\cos \alpha = -0,96$  и  $0 < \alpha < \pi$ ;

3)  $\cos 2\alpha$ , если  $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{4}$ ;

4)  $\cos 2\alpha$ , если  $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ;

5)  $\operatorname{tg} 2\beta$ , если  $\operatorname{tg} \beta = -0,75$ ;

6)  $\operatorname{tg} 2\beta$ , если  $\operatorname{tg} \beta = \frac{3}{7}$ .

**399.** В какой четверти находится угол  $\alpha$ , если:

- 1)  $\sin \alpha > 0, \sin 2\alpha > 0;$       3)  $\sin \alpha < 0, \sin 2\alpha > 0;$   
 2)  $\sin \alpha > 0, \sin 2\alpha < 0;$       4)  $\sin \alpha < 0, \sin 2\alpha < 0?$

**400.** Преобразуйте в синус, косинус или тангенс некоторого угла выражение:

- 1)  $2 \sin \alpha \cos \alpha;$       10)  $\cos^2 112,5^\circ - \sin^2 112,5^\circ;$   
 2)  $2 \sin 2\alpha \cos 2\alpha;$       11)  $\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2};$   
 3)  $2 \sin 12^\circ \cos 12^\circ;$       12)  $\cos^2 \frac{\alpha - \beta}{2} - \sin^2 \frac{\alpha - \beta}{2};$   
 4)  $2 \cos 12^\circ \sin 12^\circ;$       13)  $2 \sin \left( \frac{\pi}{4} - \alpha \right) \cos \left( \frac{\pi}{4} - \alpha \right);$   
 5)  $2 \cos 67,5^\circ \sin 67,5^\circ;$       14)  $2 \sin \left( \frac{\pi}{4} + \alpha \right) \cos \left( \frac{\pi}{4} + \alpha \right);$   
 6)  $2 \cos 105^\circ \sin 105^\circ;$       15)  $\frac{2 \operatorname{tg} 10^\circ}{1 - \operatorname{tg}^2 10^\circ};$   
 7)  $\cos^2 70^\circ - \sin^2 70^\circ;$       16)  $\frac{2 \operatorname{tg} 70^\circ}{1 - \operatorname{tg}^2 70^\circ};$   
 8)  $\cos^2 75^\circ - \sin^2 75^\circ;$       17)  $\frac{2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{4}}{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{4}};$   
 9)  $\cos^2 22,5^\circ - \sin^2 22,5^\circ;$       18)  $\frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha + \beta}{2}}{2 \operatorname{tg} \frac{\alpha + \beta}{2}}.$

**401.** Сократите дробь, используя формулы двойного угла и формулы приведения:

- 1)  $\frac{\sin 66^\circ}{2 \sin 33^\circ};$       5)  $\frac{2 \sin 160^\circ}{\sin 40^\circ};$   
 2)  $\frac{\sin 50^\circ}{\sin 25^\circ};$       6)  $\frac{2 \sin 153^\circ}{\cos 36^\circ};$   
 3)  $\frac{\cos 20^\circ}{\sin 10^\circ + \cos 10^\circ};$       7)  $\frac{\cos^2 40^\circ - \sin^2 40^\circ}{2 \sin 5^\circ};$   
 4)  $\frac{\cos 18^\circ - \sin 18^\circ}{\cos 36^\circ};$       8)  $\frac{\sin 40^\circ}{\sin 25^\circ + \cos 25^\circ}.$

**402. 1)** Упростите выражение, используя формулу синуса двойного угла:

- a)  $2 \sin 10^\circ \cos 10^\circ;$   
 б)  $2 \sin 10^\circ \cos 10^\circ \cos 20^\circ;$

- в)  $\cos 10^\circ \cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$ ;
- г)  $\cos \alpha \cos 2\alpha \cos 4\alpha \cos 8\alpha \cos 16\alpha$ .
- 2) Сколько раз вы использовали формулу синуса двойного угла в каждом случае?
- 3) В чём вы видите усложнение каждого следующего выражения?

**403.** Вычислите координаты точек пересечения графиков функций:

1)  $y = \sin^2 x$  и  $y = \cos^2 x$ ;      2)  $y = 3 \cos x$  и  $y = 6 \sin 2x$ .

**404.** Укажите наименьшее положительное число  $x$ , при котором:

1)  $\sin x^\circ = \sin^2 75^\circ - 2 \sin 75^\circ \cos 75^\circ + \cos^2 75^\circ$ ;

2)  $\cos x^\circ = \cos^2 105^\circ - \sin^2 105^\circ$ .

**405.** Решите уравнение, применяя формулы двойного аргумента:

1)  $2 \sin x \cos x = 1$ ;      3)  $4 \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} - \sqrt{3} = 0$ ;

2)  $\cos^2 x - \sin^2 x = \frac{1}{2}$ ;      4)  $\sin^2 \frac{x}{2} - \cos^2 \frac{x}{2} - 1 = 0$ .

**406.** Решите уравнение, понижая его степень с помощью формул:

1)  $\sin^4 x + \cos^4 x = 1$ ;      2)  $* \sin^6 x + \cos^6 x = 1$ .

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

**407.** Докажите тождество:

1)  $\cos^4 \alpha - \sin^4 \alpha = \cos 2\alpha$ ;

2)  $\sin \alpha \cos \alpha \cos 2\alpha = \frac{1}{4} \sin 4\alpha$ ;

3)  $\left( \sin \frac{\alpha}{2} + \cos \frac{\alpha}{2} \right)^2 = 1 + \sin \alpha$ ;

4)  $\left( \sin \frac{\beta}{4} - \cos \frac{\beta}{4} \right)^2 = 1 - \sin \frac{\beta}{2}$ ;

5)  $1 - 8 \sin^2 \frac{\alpha}{4} \cos^2 \frac{\alpha}{4} = \cos \alpha$ ;

6)  $\cos^2 \frac{\beta}{2} - 4 \sin^2 \frac{\beta}{4} \cos^2 \frac{\beta}{4} = \cos \beta$ ;

7)  $\sin 2\alpha - \operatorname{tg} \alpha = \cos 2\alpha \operatorname{tg} \alpha$ ;

8)  $\operatorname{ctg} \frac{\beta}{2} - \sin \beta = \operatorname{ctg} \frac{\beta}{2} \cos \beta$ .

**408.** Проверьте равенство:

1)  $\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos \alpha}} = \sin \frac{\alpha}{4}$ , если  $\pi < \alpha < 2\pi$ ;

2)  $\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos \alpha}} = \cos \frac{\alpha}{4}$ , если  $\pi < \alpha < 2\pi$ .

**409.** Докажите тождество

$$\sin 2\alpha = \frac{2\operatorname{tg} \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}.$$

**410.** Может ли при каком-либо значении  $x$  быть верным равенство:

1)  $\sin x^\circ \cos x^\circ = \sin 24^\circ$ ;

2)  $\sin x^\circ \cos x^\circ = \sin 34^\circ$ ;

3)  $\cos^2 x^\circ - \sin^2 x^\circ = 2 \cos 100^\circ$ ;

4)  $\sin^2 x^\circ - \cos^2 x^\circ = 2 \cos 130^\circ$ ?

**411.** Докажите, что  $\sin 3\alpha = \sin \alpha (3 - 4 \sin^2 \alpha)$ .

**412.** При каких значениях аргумента функция  $y$  принимает наибольшее значение, а при каких — наименьшее? Каковы эти значения?

1)  $y = \sin 2x$ ;

4)  $y = \cos^2 x - \sin^2 x$ ;

2)  $y = \cos 2x$ ;

5)  $y = \sin x \cos x \cos 2x$ ;

3)  $y = \sin x \cos x$ ;

6)  $y = \sin 2x (\sin^2 x - \cos^2 x)$ .

**413.** 1) Докажите тождество

$$\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 60^\circ \cos 80^\circ = \frac{1}{16}.$$

2) Попытайтесь придумать аналогичные тождества.



### Контрольные вопросы и задания

1. Выведите формулы синуса и косинуса двойного угла.

2. Найдите  $\cos \alpha$ , если  $\sin \frac{\alpha}{2} = -0,6$ .

3. Докажите тождество  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{\sin 2\alpha}$ .

## 25. Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму.

### Обратное преобразование

Формулы сложения, с которыми вы познакомились в предыдущих пунктах, отличаются знаком в правых частях равенства:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta;$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta;$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta;$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta.$$

Это наводит на мысль о почленном сложении или вычитании указанных пар равенств. Сложим первые два равенства:

$$\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) = 2 \cos \alpha \cos \beta.$$

Делением обеих частей этого равенства на 2 получим формулу, позволяющую переходить от произведения к сумме косинусов

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)).$$

**Формула перехода от произведения косинусов к их сумме**

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta))$$

Обозначим теперь в формуле

$\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) = 2 \cos \alpha \cos \beta$  буквой  $x$  сумму  $\alpha + \beta$ , а буквой  $y$  разность  $\alpha - \beta$ :

$$\begin{cases} \alpha + \beta = x, \\ \alpha - \beta = y. \end{cases}$$

Из этой системы, сначала складывая её уравнения, а затем, вычитая из первого уравнения второе, найдём, что

$$\alpha = \frac{x + y}{2}, \quad \beta = \frac{x - y}{2}.$$

Подставим введённые обозначения в формулу

$$\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) = 2 \cos \alpha \cos \beta.$$

**Формула перехода от суммы косинусов  
к их произведению**

$$\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

Подобным же образом из формул сложения можно получить и следующие формулы перехода.

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta))$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta))$$

$$\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

Заменяя в последней формуле  $y$  на  $-y$ :

$$\sin x + \sin(-y) = \sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2},$$

получим ещё одну формулу.

$$\sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2}$$

**Пример 1.** Упростить выражение

$$\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 80^\circ.$$

**Решение.**

$$\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 80^\circ =$$

$$= \frac{1}{2} (\cos 20^\circ - \cos 60^\circ) \cdot \cos 10^\circ =$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \cos 20^\circ \cos 10^\circ - \frac{1}{4} \cos 10^\circ = \\
 &= \frac{1}{4} (\cos 10^\circ + \cos 30^\circ) - \frac{1}{4} \cos 10^\circ = \frac{1}{4} \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{8}.
 \end{aligned}$$

Ответ:  $\frac{\sqrt{3}}{8}$ .



**Пример 2.** Доказать тождество

$$\frac{\sin \alpha + \sin 3\alpha + \sin 5\alpha}{\cos \alpha + \cos 3\alpha + \cos 5\alpha} = \operatorname{tg} 3\alpha.$$

**Доказательство.**

$$\begin{aligned}
 \frac{\sin \alpha + \sin 3\alpha + \sin 5\alpha}{\cos \alpha + \cos 3\alpha + \cos 5\alpha} &= \frac{(\sin \alpha + \sin 5\alpha) + \sin 3\alpha}{(\cos \alpha + \cos 5\alpha) + \cos 3\alpha} = \\
 &= \frac{2 \sin 3\alpha \cos 2\alpha + \sin 3\alpha}{2 \cos 3\alpha \cos 2\alpha + \cos 3\alpha} = \frac{\sin 3\alpha(2 \cos 2\alpha + 1)}{\cos 3\alpha(2 \cos 2\alpha + 1)} = \operatorname{tg} 3\alpha,
 \end{aligned}$$

что и требовалось доказать.



**Пример 3.** Решить уравнение  $\sin x - \cos 3x = 0$ .

**Решение 1.** Среди формул перехода от суммы или разности к произведению нет соответствующей формулы, поэтому с помощью формулы приведения заменим  $\sin x$  на  $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ :

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - \cos 3x = 0,$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{4} + x\right) \sin\left(\frac{\pi}{4} - 2x\right) = 0.$$

Произведение в левой части уравнения равно нулю, когда хотя бы один из сомножителей равен нулю:

$$\sin\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = 0 \text{ или } \sin\left(\frac{\pi}{4} - 2x\right) = 0;$$

$$\frac{\pi}{4} + x = \pi n \text{ или } \frac{\pi}{4} - 2x = \pi n, n \in \mathbb{Z},$$

$$x = \pi n - \frac{\pi}{4} \text{ или } x = \frac{\pi}{8} - \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ:  $\pi n - \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{8} - \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$ .

**Решение 2.** Можно было воспользоваться условием равенства синуса и косинуса, заметив, что  $\sin \alpha = \cos \beta$  только в двух случаях:

$$1) \alpha + \beta = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$$

$$2) \alpha - \beta = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \text{ (рис. 111).}$$

Тогда

$$1) 4x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$$

$$2) -2x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$




Рис. 111

## Упражнения

**414.** Прочтите выведенные в этом пункте формулы, используя слова «полусумма» и «полуразность».

**415.** Преобразуйте выражение в произведение тригонометрических функций и, где возможно, упростите его:

$$1) \cos 75^\circ + \cos 15^\circ; \quad 7) \sin 3\alpha - \sin 5\alpha;$$

$$2) \sin 152^\circ + \sin 28^\circ; \quad 8) \cos 2\alpha + \cos 4\alpha;$$

$$3) \sin 78^\circ - \sin 42^\circ; \quad 9) \frac{1}{2} + \cos 40^\circ;$$

$$4) \cos 48^\circ - \cos 12^\circ; \quad 10) \frac{\sqrt{2}}{2} - \sin \alpha;$$

$$5) \sin \frac{\pi}{10} + \sin \frac{\pi}{12}; \quad 11) \frac{3}{4} - \cos^2 \alpha;$$

$$6) \cos \frac{\pi}{8} - \cos \frac{\pi}{18}; \quad 12) \frac{1}{4} - \sin^2 \alpha.$$

**416.** Упростите выражение:

$$1) \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta);$$

$$2) \cos\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) - \cos\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right).$$

**417. 1)** Упростите выражение:

$$\text{а)} \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta);$$

$$\text{б)} \sin\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right).$$

2) Попытайтесь сформулировать словами особенности выражений, приведённых в заданиях 416 и 417.

**418.** Вычислите, не пользуясь калькулятором:

$$1) \cos 37,5^\circ \cos 7,5^\circ; \quad 2) \sin 52,5^\circ \sin 7,5^\circ.$$

**419.** Докажите тождество:

$$1) \frac{\sin x - \sin y}{\cos x + \cos y} = \operatorname{tg} \frac{x-y}{2};$$

$$2) \frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta} = \frac{\sin \frac{\alpha+\beta}{2}}{\sin \frac{\alpha-\beta}{2}};$$

$$3) \operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta};$$

$$4) \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta = \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta};$$

$$5) \operatorname{ctg} \alpha \pm \operatorname{ctg} \beta = \frac{\sin(\beta \pm \alpha)}{\sin \alpha \sin \beta};$$

$$6) \frac{\sin \alpha + \sin 3\alpha}{\cos \alpha + \cos 3\alpha} = \operatorname{tg} 2\alpha;$$

$$7) \sin \alpha + \cos \alpha = \sqrt{2} \cos \left( \alpha - \frac{\pi}{4} \right);$$

$$8) \sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt{2} \sin \left( \alpha - \frac{\pi}{4} \right).$$

**420.** Преобразуйте произведение в сумму и упростите:

$$1) \sin 45^\circ \sin 15^\circ;$$

$$3) \cos \frac{2\pi}{5} \cos \frac{3\pi}{5};$$

$$2) \cos 75^\circ \cos 15^\circ;$$

$$4) \sin \frac{\pi}{24} \sin \frac{5\pi}{24}.$$

**421.** Вычислите:

$$1) \sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 60^\circ \sin 80^\circ;$$

$$2) \operatorname{tg} 20^\circ \operatorname{tg} 40^\circ \operatorname{tg} 60^\circ \operatorname{tg} 80^\circ.$$

**422.** Решите уравнение, используя формулы суммы и разности тригонометрических функций:

$$1) \sin x + \sin 3x = 0; \quad 3) \sin 5x = \sin x;$$

$$2) \cos 4x + \cos x = 0;$$

$$4) \sin 3x = \cos 2x - \cos x;$$

$$5) \sin \left( \frac{\pi}{6} + x \right) + \sin \left( \frac{\pi}{6} - x \right) = \frac{1}{2};$$

$$6) \sin(x + \alpha) + \sin(x - \alpha) = \cos \alpha \ (\cos \alpha \neq 0).$$

**423.** Решите уравнение, используя разложение на множители (сгруппируйте члены, к которым будет применяться формула суммы или разности):

- $\sin x + \sin 2x + \sin 3x = 0;$
- $\cos x + \cos 2x + \cos 3x = 0;$
- $\cos x - \sin 3x = \cos 5x;$
- $\cos(x - \alpha) - \cos(x + \alpha) = \sin \alpha.$

**424.** 1) Упростите выражение:

- $\sin \alpha (\sin \alpha + \sin 3\alpha + \sin 5\alpha + \sin 7\alpha);$
- $\sin \alpha (\sin 2\alpha + \sin 4\alpha + \sin 6\alpha + \sin 8\alpha);$
- $\sin 2\alpha (\sin \alpha + \sin 5\alpha + \sin 9\alpha + \sin 13\alpha).$

2) В чём особенность аргументов синусов, стоящих в скобке? Какая связь между аргументами синусов, стоящих в скобках, и аргументом синуса вне скобок?

**425.** 1) Упростите выражение:

- $\sin \alpha (\cos \alpha + \cos 3\alpha + \cos 5\alpha + \cos 7\alpha);$
- $\sin \alpha (\cos 2\alpha + \cos 4\alpha + \cos 6\alpha + \cos 8\alpha);$
- $\sin 2\alpha (\cos \alpha + \cos 5\alpha + \cos 9\alpha + \cos 13\alpha).$

2) В чём особенность аргументов косинусов, стоящих в скобке? Какая связь между аргументами косинусов, стоящих в скобках, и аргументом синуса за скобками?  
3) Сравните закономерности, полученные в данном и предыдущем заданиях, и сделайте общий вывод.

**426.** 1) Вычислите, используя закономерности, найденные в двух предыдущих заданиях:

- $\sin 10^\circ (\sin 10^\circ + \sin 30^\circ + \sin 50^\circ);$
- $\sin 20^\circ (\cos 10^\circ + \cos 50^\circ + \cos 90^\circ + \cos 130^\circ);$
- $\sin 30^\circ (\sin 10^\circ + \sin 70^\circ + \sin 130^\circ).$

2) Составьте самостоятельно несколько примеров, используя данные закономерности.

**427.** 1) Докажите тождество:

$$a) \sin \alpha + \sin 3\alpha + \sin 5\alpha + \sin 7\alpha = \frac{\sin^2 4\alpha}{\sin \alpha};$$

$$b) \cos \alpha + \cos 3\alpha + \cos 5\alpha + \cos 7\alpha = \frac{\sin 8\alpha}{2 \sin \alpha};$$

$$v) \cos 2\alpha + \cos 6\alpha + \cos 10\alpha + \cos 14\alpha = \frac{\sin 6\alpha}{2 \sin 2\alpha}.$$

2) Попытайтесь придумать аналогичное тождество.

**428.** Найдите абсциссы точек пересечения графиков функций:  
 1)  $y = \sin 2x$  и  $y = \sin 4x$ ;      2)  $y = \cos 7x$  и  $y = \cos 3x$ .

**429.** На промежутке  $[-\pi; \pi]$  найдите все решения уравнения:  
 1)  $\sin x + \sin 3x = 0$ ;      2)  $\cos 3x + \cos x = 0$ .



## Контрольные вопросы и задания

- Как преобразовать разность косинусов в произведение?
- Выполните преобразование  $\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$ .
- Вычислите:
  - $\cos 78^\circ - \cos 42^\circ$
  - $\log_{\frac{1}{2}} \sin 70^\circ + \log_{\frac{1}{2}} \sin 50^\circ + \log_{\frac{1}{2}} \sin 10^\circ$ .



## 26. Решение

### тригонометрических уравнений

В предыдущих пунктах вы уже встречались с тригонометрическими уравнениями. В большинстве случаев исходное уравнение в процессе решения сводится к простейшим тригонометрическим уравнениям. Однако для тригонометрических уравнений не существует единого метода решения. В каждом конкретном случае успех зависит от знания тригонометрических формул и от умения выбрать из них нужные. При этом обилие различных формул иногда делает этот выбор довольно трудным.

Рассмотрим несколько основных типов тригонометрических уравнений.

### Уравнения, сводящиеся к квадратным



**Пример 1.** Решить уравнение  $2 \cos^2 x + 3 \sin x = 0$ .

**Решение.** С помощью основного тригонометрического тождества это уравнение можно свести к квадратному относительно  $\sin x$ :

$$2 \cos^2 x + 3 \sin x = 0, \quad 2(1 - \sin^2 x) + 3 \sin x = 0,$$

$$2 - 2 \sin^2 x + 3 \sin x = 0, \quad 2 \sin^2 x - 3 \sin x - 2 = 0.$$

Введём новую переменную  $y = \sin x$ , тогда уравнение примет вид:  $2y^2 - 3y - 2 = 0$ .

Корни этого уравнения  $y_1 = 2$ ,  $y_2 = -0,5$ .

Возвращаемся к переменной  $x$  и получаем простейшие тригонометрические уравнения:

1)  $\sin x = 2$  — это уравнение не имеет корней, так как  $\sin x < 2$  при любом значении  $x$ ;

$$2) \sin x = -0,5, x_1 = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, x_2 = \frac{7\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ:  $-\frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{7\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ .

Сравнивая серии корней

$$x_1 = \arcsin a + 2\pi n \text{ и } x_2 = -\arcsin a + \pi(2n+1)$$

уравнения  $\sin x = a$  при  $0 < |a| < 1$ , можно заметить, что знак «минус» появляется перед арксинусом, когда прибавляется нечётное число  $\pi$ . А при прибавлении чётного числа  $\pi$  арксинус берётся со знаком «плюс». Такое чередование знаков арксинуса можно обеспечить, домножив его на выражение  $(-1)^n$ .

Получится объединённая формула

$$x = (-1)^n \arcsin a + \pi n, \text{ где } n \text{ — любое целое число.}$$

Применяя эту формулу к рассмотренному в примере 1 уравнению, получим:

$$(-1)^n \cdot \left(-\frac{\pi}{6}\right) + \pi n = (-1)^n \cdot (-1) \cdot \frac{\pi}{6} + \pi n,$$

$$x = (-1)^{n+1} \cdot \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Ещё проще можно объединить серии корней уравнения

$$\cos x = a, x_1 = \arccos a + 2\pi n \text{ и } x_2 = -\arccos a + 2\pi n$$

при  $0 < |a| < 1$ :

$$x = \pm \arccos a + 2\pi n, \text{ где } n \text{ — любое целое число.}$$

Объединённые формулы корней позволяют записывать ответы более компактно, однако в некоторых случаях, например при отборе корней, принадлежащих некоторому числовому промежутку, удобнее работать с каждой серией корней отдельно.

**Однородные тригонометрические уравнения****Пример 2.** Решить уравнение

$$2 \sin^2 x - 3 \sin x \cos x - 5 \cos^2 x = 0.$$

**Решение.** Рассмотрим два случая:

1)  $\cos x = 0$  и 2)  $\cos x \neq 0$ .

**Случай 1.** Если  $\cos x = 0$ , то уравнение принимает вид  $2 \sin^2 x = 0$ , откуда  $\sin x = 0$ . Но это равенство не удовлетворяет условию  $\cos x = 0$ , так как ни при каком  $x$  косинус и синус одновременно в нуль не обращаются.

**Случай 2.** Если  $\cos x \neq 0$ , то можно разделить уравнение на  $\cos^2 x$  и получить  $2 \operatorname{tg}^2 x - 3 \operatorname{tg} x - 5 = 0$ .

Вводя новую переменную  $y = \operatorname{tg} x$ , получаем квадратное уравнение  $2y^2 - 3y - 5 = 0$ .

Корни этого уравнения  $y_1 = -1$ ,  $y_2 = 2,5$ .

Возвращаемся к переменной  $x$ .

$$\operatorname{tg} x = -1, \quad x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z};$$

$$\operatorname{tg} x = 2,5,$$

$$x = \operatorname{arctg} 2,5 + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

**Ответ:**  $-\frac{\pi}{4} + \pi n, \operatorname{arctg} 2,5 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ .

**Примечание.** Обозначив в исходном уравнении  $\sin x$  буквой  $u$ , а  $\cos x$  буквой  $v$ , получим уравнение вида  $au^2 + buv + cv^2 = 0$ .

Уравнение, левая часть которого — многочлен, каждый член которого имеет вторую степень, а правая — нуль, называют **однородным уравнением второй степени относительно переменных  $u$  и  $v$** .

Делением на  $v^2$  такое уравнение сводится к квадратному относительно  $\frac{u}{v}$ .

**Пример 3.** Решить уравнение

$$5 \sin^2 x - 3 \sin x \cos x - 2 \cos^2 x - 3 = 0.$$

**Решение.** Данное уравнение можно свести к однородному тригонометрическому уравнению второй степени отно-

сительно  $\sin x$  и  $\cos x$ . Представим с помощью основного тригонометрического тождества число 3 как  $3 \sin^2 x + 3 \cos^2 x$ :

$$5 \sin^2 x - 3 \sin x \cos x - 2 \cos^2 x - 3 \sin^2 x - 3 \cos^2 x = 0.$$

Приведя подобные члены, получим уравнение

$$2 \sin^2 x - 3 \sin x \cos x - 5 \cos^2 x = 0$$

из примера 2.

**Пример 4.** Решить уравнение

$$3 \sin 2x + 7 \cos 2x + 3 = 0.$$

**Решение.** Это уравнение тоже можно свести к однородному. Применяя формулы синуса и косинуса двойного угла и основное тригонометрическое тождество, получим:

$$6 \sin x \cos x + 7 (\cos^2 x - \sin^2 x) + 3 (\cos^2 x + \sin^2 x) = 0,$$

$$6 \sin x \cos x + 10 \cos^2 x - 4 \sin^2 x = 0,$$

$$2 \sin^2 x + 3 \sin x \cos x - 5 \cos^2 x = 0.$$

Снова пришли к однородному уравнению второй степени, рассмотренному в примере 2.

**Примечание.** В этом примере сами аргументы синуса и косинуса наталкивали на мысль о применении формул двойного угла. Но точно так же можно решить и уравнение  $3 \sin x + 7 \cos x + 3 = 0$ , если рассматривать  $x$  как двойной угол:  $x = 2 \cdot \frac{x}{2}$ .

В рассмотренных примерах были тригонометрические функции одного аргумента. Если же аргументы разные, то уравнение стараются или привести к одному аргументу, или свести его к виду  $f(x) \cdot g(x) = 0$ .

**Пример 5.** Решить уравнение  $\sin^4 x - \cos^4 x = \sin 2x$ .

**Решение.** Применим в левой части уравнения формулу разности квадратов:

$$\sin^4 x - \cos^4 x = \sin 2x,$$

$$(\sin^2 x - \cos^2 x)(\sin^2 x + \cos^2 x) = \sin 2x,$$

$$-\cos 2x = \sin 2x.$$

Отметим на единичной окружности углы, синус и косинус которых противоположны (рис. 112).




Рис. 112

Имеем:  $2x = -\frac{\pi}{4} + \pi n$ , где  $n \in \mathbb{Z}$ .

Ответ:  $-\frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{2}$ , где  $n \in \mathbb{Z}$ .

**Примечание 1.** Можно было, конечно, отнестись к уравнению  $-\cos 2x = \sin 2x$  как к однородному уравнению первой степени и рассмотреть два случая:

1) если  $\cos 2x = 0$ , то  $\sin 2x = 0$  (эти два равенства не могут быть верными одновременно);

2) если  $\cos 2x \neq 0$ , то, разделив обе части на  $\cos 2x$ , получим:

$$\operatorname{tg} 2x = -1, 2x = -\frac{\pi}{4} + \pi n \text{ и } x = -\frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{2}, \text{ где } n \in \mathbb{Z}.$$

**Примечание 2.** Запишем уравнение  $-\cos 2x = \sin 2x$  в виде  $\sin 2x + \cos 2x = 0$  и преобразуем его левую часть, вводя **вспомогательный угол**. Для этого умножим обе части уравнения на  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  и

воспользуемся тем, что  $\sin \frac{\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ :

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2x + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos 2x = \cos \frac{\pi}{4} \sin 2x + \sin \frac{\pi}{4} \cos 2x = \sin \left(2x + \frac{\pi}{4}\right).$$

Получим:

$$\sin \left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = 0, 2x + \frac{\pi}{4} = \pi n,$$

$$2x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, x = -\frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{2}, \text{ где } n \in \mathbb{Z}.$$

▼ Приём введения вспомогательного угла всегда позволяет заменить синусом или косинусом выражение  $a \sin x + b \cos x$ . Для этого надо добиться, чтобы коэффициенты синуса и косинуса являлись соответственно косинусом и синусом некоторого угла, т. е. чтобы сумма их квадратов оказалась равной 1:

$$\begin{aligned} a \sin x + b \cos x &= \sqrt{a^2 + b^2} \left( \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin x + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos x \right) = \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} (\cos \varphi \sin x + \sin \varphi \cos x) = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi), \end{aligned}$$

$$\text{где } \varphi = \arccos \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \arcsin \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Введение вспомогательного угла особенно удобно, когда вспомогательный угол табличный, т. е. равен  $\pm \frac{\pi}{6}$ ,  $\pm \frac{\pi}{4}$  и т. п.

Например, при решении уравнения  $\cos x - \sqrt{3} \sin x = 1$  имеем:  $\sqrt{1+3} = 2$ ,

$$\frac{1}{2} \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x = \cos \frac{\pi}{3} \cos x - \sin \frac{\pi}{3} \sin x = \cos \left( x + \frac{\pi}{3} \right),$$

$$\cos \left( x + \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{2}, x + \frac{\pi}{3} = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n,$$

$$x_1 = 2\pi n, x_2 = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \text{ где } n \in \mathbf{Z}. \quad \Delta$$



### Пример 6. Решить уравнение $\sin x + \sin 3x = 4 \cos^2 x$ .

**Решение.** Перенесём все члены в левую часть и преобразуем её:

$$\begin{aligned} \sin x + \sin 3x - 4 \cos^2 x &= 2 \sin 2x \cos x - 4 \cos^2 x = \\ &= 2 \cos x (\sin 2x - 2 \cos x) = 2 \cos x (2 \sin x \cos x - 2 \cos x) = \\ &= 4 \cos^2 x (\sin x - 1). \end{aligned}$$

Уравнение приобрело вид:  $4 \cos^2 x (\sin x - 1) = 0$ .

Поскольку левая часть уравнения имеет смысл при всех значениях  $x$ , получаем два случая:  $\cos x = 0$  или  $\sin x - 1 = 0$ ,

$$\sin x = 1; x = \frac{\pi}{2} + \pi n \text{ или } x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \text{ где } n \in \mathbf{Z}.$$

Поскольку вторая серия корней полностью содержится в первой, её в ответе не указываем.

Ответ:  $\frac{\pi}{2} + \pi n$ , где  $n \in \mathbf{Z}$ .

## Упражнения

**430.** Решите уравнение:

- 1)  $2 \cos x + \sqrt{3} = 0$ ;      3)  $(\sin x - \cos x)^2 - 1 = 0$ ;  
 2)  $\cos^2 x + \cos x = -\sin^2 x$ ;      4)  $\sin^2 x - 6 \sin x = 0$ .

**431.** 1) Решите уравнение, сведя его к квадратному:

- а)  $2 \cos^2 x + \cos x - 1 = 0$ ;  
 б)  $2 \sin^2 x - 3 \sin x - 2 = 0$ ;  
 в)  $6 - \operatorname{tg} x = \operatorname{tg}^2 x$ ;  
 г)  $2 \operatorname{tg} x - 5 \operatorname{ctg} x = 3$ ;  
 д)  $\cos x - \sin^2 x = 1$ ;

- е)  $\sin x = 5 + \cos^2 x$ ;  
 ж)  $2 \cos^2 x + 4 = -\sin x$ ;  
 з)  $8 \cos^4 x - 6 \sin^2 x + 1 = 0$ .

2) Выделите особенности уравнений, сводящихся к квадратным.

**432.** 1) Решите однородное уравнение:

- а)  $\sin x + \cos x = 0$ ;  
 б)  $\sin^2 x - \sqrt{3} \sin x \cos x = 0$ ;  
 в)  $\sin^2 x + \sin x \cos x - 2 \cos^2 x = 0$ ;  
 г)  $\sin^2 x \cos^2 x - 3 \cos^4 x = 0$ .

2) Выделите особенности данных уравнений.

3) ● Какими ещё способами можно решить данные уравнения?

**433.** 1) Решите уравнение, сведя его к однородному:

- а)  $6 \sin^2 x + \sin x \cos x - \cos^2 x = 2$ ;  
 б)  $3 \sin^2 x + 4 \sin x \cos x - 3 \cos^2 x - 2 = 0$ .

2) Чем отличаются эти уравнения от однородных уравнений?

**434.** 1) Используя формулы, решите уравнение:

- а)  $\cos^2 x - \sin^2 x = -1$ ;  
 в)  $\cos^4 x + \sin^4 x = 1$ ;  
 б)  $\cos^4 x - \sin^4 x = 1$ ;  
 г)  $\cos^6 x + \sin^6 x = 1$ .

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \quad \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

2) Какие уравнения решаются с помощью формул понижения степени?

**435.** 1) Решите уравнение с помощью разложения на множители:

- а)  $(\cos x - 1)^2 = \cos^2 x - 1$ ;  
 б)  $\cos x - \cos 2x = 1$ ;  
 в)  $\sin x + \sin 2x + \sin 3x = 0$ ;  
 г) ●  $\cos x + \cos 2x + \cos 3x + \cos 4x = 0$ .

2) ● Укажите, в каком задании при разложении на множители использовались: способ группировки, вынесение за скобки, формулы сокращённого умножения.

**436.** Используя условия равенства одноимённых функций, решите уравнение:

$$1) \sin 4x = \sin 7x;$$

$$4) \operatorname{ctg} 5x - \operatorname{ctg} x = 0;$$

$$2) \cos 4x - \cos 5x = 0;$$

$$5) \sin\left(6x - \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right);$$

$$3) \operatorname{tg} 3x = \operatorname{tg} 5x;$$

$$6) \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = -\cos\frac{x}{2}.$$

$\sin \alpha = \sin \beta: \alpha = \beta + 2\pi n$  или  $\alpha = -\beta + (2n + 1)\pi, n \in Z;$

$\cos \alpha = \cos \beta: \alpha = \pm\beta + 2\pi n, n \in Z;$

$\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} \beta, \operatorname{ctg} \alpha = \operatorname{ctg} \beta: \alpha = \beta + \pi n, n \in Z$

**437.** Запишите условия, при которых выполняются равенства  $\sin \alpha = \cos \beta$  и  $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{ctg} \beta$ . Используя полученные условия, решите уравнение:

$$1) \sin 3x = \cos 4x;$$

$$2) \operatorname{tg} 2x = \operatorname{ctg} 5x.$$

**438.** Докажите, что если  $x^2 + y^2 = 1$ , то существует такое число  $\phi$ , что одновременно  $\sin \phi = x$  и  $\cos \phi = y$ .

**439.** Докажите, что не имеет корней уравнение

$$(\sin x + \sqrt{3} \cos x) \sin 4x = 2.$$

**440.** Определите, если возможно, тип уравнения. Составьте план решения и выполните его.

$$1) \sin^2 2x + 2 \cos^2 2x = \frac{7}{4};$$

$$2) 3 \cos^2 x + 4 \sin x = 4;$$

$$3) \sin 2x - \sin x = 2 \cos x - 1;$$

$$4) \sin^2 x - \sqrt{3} \sin x \cos x = 0;$$

$$5) \cos^2 (45^\circ + x^\circ) - \cos^2 (45^\circ - x^\circ) = -1;$$

$$6) \sin^3 x \cos x - \sin x \cos^3 x = \frac{1}{4};$$

$$7) \cos x + \sqrt{3} \sin x = 1;$$

$$8) \cos 3x = \cos 5x;$$

$$9) \sin^2 x - 10 \sin x \cos x + 21 \cos^2 x = 0;$$

$$10) 1 + \cos 3x + \cos 7x + \cos 10x = 0;$$

$$11) 2 \sin^2 x = 4 - 5 \cos x;$$

$$12) 7 \sin^2 x = 8 \sin x \cos x - \cos^2 x;$$

$$13) \sin 2x \cos 3x + \cos 2x \sin 3x = 1;$$

14)  $3 \sin^2 x + 2 \sin x \cos x = 2;$

15)  $\sin(x + \pi) = \cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right);$

16)  $\sqrt{3} \cos x - \sin x = 1;$

17)  $\cos^4 2x - \sin^4 2x = \frac{1}{2};$

18)  $1 + \sin x + \cos x + \sin 2x + \cos 2x = 0.$

**441.** Найдите наименьший положительный корень уравнения

$$4 \sin 3x \sin x - 2 \cos 2x + 1 = 0.$$

**442.** Найдите на отрезке  $[-\pi; \pi]$  все корни уравнения

$$\cos 2x + \sin^2 x = \cos x.$$

**443.** Найдите на отрезке  $[-\pi; \pi]$  все корни уравнения

$$\frac{2 \cos^2 x + \cos x}{2 \cos x + 7 \sin^2 x} = -\frac{1}{2}.$$

**444.** Найдите все решения уравнения:1)  $\sin 2x + \cos x + 2 \sin x = -1$ , удовлетворяющие условию  $0 < x < 5$ ;2)  $\sqrt{3} \sin x + 2 \cos x = \sqrt{3} + \sin 2x$ , удовлетворяющие условию  $0 < x < 2$ .**445.** При каких значениях  $a$  наибольшее значение функции  $y = a \sin x + \cos x$  равно 5?**446.** Решите уравнение:

1)  $4^{\sin x} = 2;$

$$\frac{\sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right)}{\sqrt{2}\cos x}$$

2)  $5 + 2^{\operatorname{tg} x} = 3 \cdot 4^{\sqrt{2}\cos x};$

3)  $81^{(\sin 2x - 1)\cos 3x} - 9^{(\sin x - \cos x)^2} = 0;$

4)  $\operatorname{ctg} 2x = \operatorname{tg} 2x + 2 \operatorname{tg} 2x + 1.$

**Контрольные вопросы и задания**

- Какие способы решения тригонометрических уравнений вы знаете?
- Решите уравнение:
  - $\operatorname{tg}^2 x - 3 = 0$ ;
  - $\sin^2 x - \sin 2x = 0$ ;
  - $6 \sin^2 x - \cos x = 5$ ;
  - $\sqrt{3} \cos^2 x - \sin x \cos x = 0$ .

# ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И КОМБИНАТОРИКИ

## 27. Понятие о вероятности

Каждому из нас хотелось бы, конечно, уметь предвидеть события будущего. Так, зная, какие задания достанутся на ЕГЭ, можно подготовить верные ответы и получить много баллов. К сожалению, во многих случаях неизвестно, какое из возможных событий произойдёт, а какое — нет. Вместе с тем, ожидать одних событий обычно бывает больше оснований, чем других. Так, например, вытаскивая карту из хорошо перетасованной колоды, лучше рассчитывать на то, что эта карта не окажется тузом, чем на то, что будет вытащен туз. Хотя оба события возможны, но их возможности имеют как бы разную степень. Для оценки этой степени математики разработали понятие вероятности. Так, в примере с картами вероятность вытащить туза меньше, чем вероятность вытащить какую-нибудь другую карту, а вероятности вытащить туза и короля равны.

Пусть некоторое действие (эксперимент) обязательно приводит к одному из  $n$  равновероятных результатов (исходов), и в  $m$  из них происходит интересующее нас событие  $A$  (эти исходы будем называть благоприятными для  $A$ ).

**Вероятность события  $A$**  равна отношению числа благоприятных исходов к числу всех равновероятных исходов.

$$P(A) = \frac{m}{n}^1.$$

Напомним, что если для  $A$  благоприятны все исходы, то событие  $A$  *достоверное* и его вероятность равна 1. Если же исходов, благоприятных для события, нет, то его вероятность равна 0, и событие называют *невозможным*.

<sup>1</sup> Иногда вероятность выражают в процентах, принимая число 1 за 100%.



**Пример 1.** Найти вероятность вытащить туз из карточной колоды, в которой 36 карт.

**Решение.** При вытаскивании карты ею с равной вероятностью может оказаться любая из 36 карт колоды, значит, всего это действие имеет 36 равновероятных исходов. В каждой из четырёх карточных мастей есть свой туз, значит, в колоде четыре туза, и четыре из всех исходов благоприятны.

Вероятность вытащить туз:  $P_{\text{туз}} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$ .

**Ответ:**  $\frac{1}{9}$ .

Использование формулы вероятности возможно только тогда, когда все возможные исходы эксперимента равновероятны и, кроме того, их множество конечно. Однако часто эти условия не выполняются.



**Пример 2.** Какова вероятность того, что подброшенная вверх пуговица упадёт и останется лежать выпуклой стороной вверх?

**Решение.** В отличие от монеты, симметрия которой даёт основания считать равновероятными выпадение орла и решки, у пуговицы стороны по форме разные. С другой стороны, понятно, что искомая вероятность существует. На помощь в её поиске приходит *статистический эксперимент*. Будем подбрасывать пуговицу и считать, сколько раз она ляжет выпуклой стороной вверх (можно сократить время эксперимента, если подбрасывать одновременно несколько одинаковых пуговиц). Результаты такого эксперимента занесены в таблицу.



Число бросков ( $n$ )	10	50	100	200	300
Выпуклость вверх ( $m$ )	7	31	59	122	178
Отношение $m$ к $n$ $\left( \frac{m}{n} \right)$	0,7	0,62	0,59	0,61	0,59

<sup>1</sup> Математическая статистика — наука, изучающая методы обработки результатов наблюдения.

Отношение числа случаев, когда пуговица оказывается выпуклостью вверх, к общему числу случаев называют **частотой** соответствующего исхода. Можно заметить, что частота падения пуговицы выпуклостью вверх с увеличением числа  $n$  меняется незначительно, оставаясь приближённо равной 0,6. То есть пуговица падает выпуклой стороной вверх в среднем 6 раз из 10. Значит, вероятность того, что подброшенная пуговица упадёт выпуклой стороной вверх, приближённо равна 0,6:

$$P_{\text{выпуклость вверх}} \approx 0,6.$$

Понятно, что для другой пуговицы значение вероятности может оказаться иным.

Из 33 букв русского алфавита некоторые буквы используются чаще, чем другие. Какая из них самая «трудолюбивая»?

 **Пример 3.** Какова вероятность того, что выбранная наугад буква в первом абзаце этого пункта окажется буквой «а»?

**Решение.** Всего в первом абзаце 654 буквы, буква «а» среди них встречается 52 раза, значит, вероятность того, что выбранная наугад в первом абзаце буква является буквой «а», равна  $\frac{54}{647}$ , т. е. примерно 8%.

## Упражнения

447. Какова вероятность того, что карта, наугад вытащенная из карточной колоды, в которой 36 карт, окажется: 1) червой; 2) картинкой; 3) валетом или королём?
448. Какова вероятность того, что число очков при броске игральной кости окажется: 1) больше 2; 2) простым числом; 3) числом, кратным 3?
449. Какова вероятность того, что наудачу выбранное: 1) целое число от 40 до 70 является кратным 6; 2) целое число от 1 до 30 является кратным 3; 3) двузначное число окажется кратным либо 3, либо 5, либо тому и другому одновременно?
450. Лотерейные билеты пронумерованы целыми числами от 1 до 200 включительно. Какова вероятность того, что номер наудачу взятого билета кратен 7 или 5?

- 451.** В НИИ работает 120 человек, из них 80 знают английский язык, 60 — немецкий, а 50 — знают оба. Какова вероятность того, что выбранный наугад сотрудник не знает ни одного из этих языков?
- 452.** В семье двое детей. Какова вероятность того, что они оба мальчики, если:
- 1) старший ребёнок мальчик;
  - 2) один из них мальчик?
- (Считать, что вероятности рождения мальчика и девочки одинаковы.)
- 453.** Вычисляя вероятность выпадения хотя бы одной решки при бросании двух монет, Таня рассуждала так: «Выпадение хотя бы одной решки складывается из двух возможностей — выпадение решки на первой монете и выпадение решки на второй монете. Вероятность выпадения решки для любой из монет равна  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ . Значит, выпадение хотя бы одной решки — событие достоверное, т. е., как ни бросай две монеты, а хоть одна решка да выпадет!»
- 1) В каком месте своих рассуждений Таня допустила ошибку?
  - 2) Как надо было рассуждать в данном случае и чему в действительности равна вероятность выпадения хотя бы одной решки?
- 454.** В коробке находятся две карточки. Обе стороны одной из них белые, а у другой одна сторона белая, а другая чёрная. Из коробки наугад вытаскивают одну карточку и кладут её на стол так, что цвет её нижней стороны не виден. Если цвет верхней стороны карточки окажется белым, то какова вероятность, что у этой карточки нижняя сторона чёрная?
- 455.** Проведите статистический эксперимент и найдите приближённое значение вероятности того, что подброшенная канцелярская кнопка упадёт острём вверх.
- 456.** С какой вероятностью выбранная наугад буква в первом абзаце этого пункта окажется буквой: 1) «р»; 2) «е»?
- 457.** В 1838 г. изобретателем электрического телеграфа американцем Морзе для передачи телеграмм была придумана специальная азбука. Каждая буква азбуки Морзе записывается в виде последовательности точек и тире. Объясните, почему в азбуке Морзе буква «е» передаётся одной точкой, а буква «э» набором из пяти символов «..—..».

- 458.** В примере 3 и в задании № 451 были найдены вероятности того, что наугад выбранная буква абзаца этого пункта окажется буквой «а», «р», «е». Выполните аналогичные расчёты, взяв страницу своей любимой книги и заполнив таблицу.

Буква	a	p	e
Сколько раз она встретилась на странице ( $m$ )			
$P \approx \frac{m}{n}$ , где $n$ — число всех букв на странице			

Выберите наугад букву (закрыв глаза и ткнув пальцем). Повторите этот эксперимент 100 раз. Сколько раз вы попали в букву «а», букву «р», букву «е»? Подтверждается ли найденная вами оценка вероятности?

- 459.** Как вы думаете, почему буквы на клавиатуре компьютера расположены не в алфавитном порядке? Почему в разных местах расположена на русской и английской клавиатуре буква «о», одинаковая в этих двух алфавитах?
- 460.** При контрольной оценке всхожести зёрен пшеницы из 1000 зёрен 27 оказались невсхожими. Какова вероятность, что наугад взятое зерно из этой же партии окажется всхожим?
- 461.** Из коробки, в которой лежат десять шаров, наугад вынули один шар, а затем положили его обратно в коробку и перемешали шары. Этот эксперимент проделали 100 раз, и в результате 72 раза был вытащен белый, а 28 раз чёрный шар. Как вы думаете, сколько в коробке чёрных шаров?



## Контрольные вопросы и задания

- На чемпионате мира по фигурному катанию в сильнейшей подгруппе женской произвольной программы выступают 6 спортсменок: по одной из России и США, по две из Канады и Японии. Порядок выступлений определяется жребием. Какова вероятность, что последней будет выступать спортсменка из Японии?
- Приведите пример достоверного события, которое не складывается из равновероятных возможностей.
- Подброшенный над столом спичечный коробок, упав, иногда остаётся стоять на своей грани, покрытой серой. Найдите экспериментально приближённое значение вероятности такого события.

## 28. Вычисление числа вариантов

Во многих случаях нахождение как числа всех возможных, так и числа благоприятных исходов сводится к подсчёту числа комбинаций, которые можно составить из элементов одного или нескольких множеств. Решением таких задач занимается специальный раздел математики — **комбинаторика**. С ним вы начали знакомиться в основной школе.

Одно из основных правил комбинаторики — *правило произведения*. Его можно сформулировать следующим образом.

### Правило произведения

Если один из элементов комбинации можно выбрать  $n$  способами, каждому из которых соответствует  $m$  возможностей выбрать другой, то существует  $nm$  способов выбора этих двух элементов.



**Пример 1.** Из города  $A$  в город  $B$  можно доехать на поезде или на автобусе, а также можно долететь на самолёте. Из города  $B$  в город  $C$  идут поезда, автобусы и теплоходы. Считая все маршруты равновероятными, найдите вероятность поездки из  $A$  в  $C$  на одном виде транспорта.

**Решение.** Есть всего две возможности добраться из  $A$  в  $C$ , не меняя вида транспорта: на поезде или на автобусе.

Поездка из  $A$  в  $C$  состоит из двух этапов. И на первом, и на втором этапе есть по три возможности выбора вида транспорта. По правилу произведения находим число различных маршрутов:  $3 \cdot 3 = 9$ .

По условию задачи все маршруты равновероятны, значит, вероятность поездки из  $A$  в  $C$  на одном виде транспорта равна  $\frac{2}{9}$ . Ответ:  $\frac{2}{9}$ .

При подсчёте числа комбинаций необходимо знать, важен ли порядок, в котором размещаются элементы в комбинации, или комбинации различаются только составом своих элементов.

**Пример 2.** Сколько пятизначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4 и 5 так, чтобы цифры в записи числа не повторялись?

**Решение.** При записи пятизначного числа важно, в каком порядке идут его цифры. Первой можно записать любую из данных пяти цифр, вторую цифру можно присоединить к первой четырьмя способами, так как одну из данных цифр уже использовали. По правилу произведения выбор первых двух цифр можно осуществить  $5 \cdot 4$  способами. Каждому из них соответствует 3 варианта присоединения третьей цифры, значит, первые три цифры можно записать  $5 \cdot 4 \cdot 3$  способами. Четвёртой цифрой может оказаться любая из двух оставшихся, т. е. первые 4 цифры можно выбрать  $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2$  способами. Выбор последней пятой цифры предопределён выбором предшествующих, когда из пяти цифр выбрали четыре, осталась единственная цифра. Всего получилось  $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$  разных пятизначных чисел.

Заметим, что каждое из этих чисел получается, например, из числа 12345 перестановкой его цифр.

**Ответ:** 120 чисел.

Комбинации, которые получаются при перестановке элементов некоторого набора, так и называют *перестановками*. А число всех перестановок, состоящих из  $n$  различных элементов, обозначают как  $P_n$ .

В задаче  $P_5 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$ , а вообще, формула числа перестановок имеет следующий вид.

**Формула числа перестановок из  $n$  элементов**

$$P_n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n - 1) \cdot n = n!$$

**Пример 3.** Сколько пятизначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 так, чтобы цифры в записи числа не повторялись?

**Решение.** Рассуждаем так же, как в примере 2. Первой можно записать любую из данных 7 цифр. Вторую цифру можно присоединить к первой 6 способами, так как после выбора первой осталось шесть цифр. По правилу произведения выбор первых двух цифр можно осуществить  $7 \cdot 6$  способами.

Каждому из них соответствует 5 вариантов присоединения третьей цифры, значит, первые три цифры можно записать  $7 \cdot 6 \cdot 5$  способами. Четвёртой цифрой может оказаться любая из 4 оставшихся, т. е. первые 4 цифры можно выбрать  $7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4$  способами. Последнюю пятую цифру выбираем из оставшихся трёх. Всего получилось  $7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 2520$  разных пятизначных чисел.

По сути дела, при записи пятизначного числа размещались по определённым местам 5 из 7 данных элементов. Полученные при этом комбинации элементов так и называют *размещениями*.

Число всех размещений из 7 различных элементов по 5 обозначают  $A_7^5$  (читают: а из семи по пять).

$$A_7^5 = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1} = \frac{7!}{(7 - 5)!}.$$

### Формула числа размещений из $n$ по $m$

$$A_n^m = \frac{n!}{(n - m)!}$$

**Замечание.** Размещение из  $n$  элементов по  $n$  является перестановкой этих  $n$  элементов, поэтому  $A_n^n = P_n = n!$ . Однако при  $m = n$  в знаменателе правой части формулы числа размещений получается выражение  $0!$  Чтобы равенство  $\frac{n!}{0!} = n!$  было верным, принято считать, что  $0! = 1$ .

### Определение факториала

$$n! = \begin{cases} 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n, & \text{при } n = 2, 3, 4, \dots, \\ 1, & \text{при } n = 0, 1 \end{cases}$$

К решению задачи примера 3 можно подойти иначе. Вместо того, чтобы выбирать по одной цифре из 7, выберем сначала сразу все 5 цифр числа, не важно, в каком порядке, и будем затем их переставлять. Обозначим число вариантов, которыми можно выбрать 5 цифр из 7, как  $C_7^5$ . Тогда каждому из этих вариантов соответствует  $P_5$  перестановок выбранных цифр, а всего из данных 7 цифр можно будет составить  $C_7^5 \cdot P_5$  пятизначных чисел. Как видно в примере 2, должно

получиться число размещений из 7 по 5:  $C_7^5 \cdot P_5 = A_7^5$ . Отсюда получаем число вариантов выбора 5 элементов из 7:

$$C_7^5 = \frac{A_7^5}{P_5} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21.$$

Выбирая 5 цифр из 7 данных, обращаем внимание не на порядок выбора, а только на сочетание элементов, т. е. на то, какие элементы выбирали. Результат такого выбора называют *сочетанием*. Число сочетаний из  $n$  элементов по  $m$  имеет вид

$$C_n^m = \frac{A_n^m}{P_m}.$$

Подставив выражения для  $A_n^m$  и  $P_m$ , получим формулу числа сочетаний.

### Формула числа сочетаний из $n$ элементов по $m$

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

**Пример 4.** Из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 составляются все возможные пятизначные числа, цифры в которых не повторяются. Найти вероятность того, что случайным образом выбранное из них число окажется кратным 3.

**Решение.** Кратность трём определяется суммой цифр числа и не зависит от их порядка в его записи. Все выборки пяти цифр из семи равновероятны и являются сочетаниями. Всего таких сочетаний  $C_7^5 = 21$ . Выберем из этих сочетаний те, сумма цифр которых кратна 3. Таких сочетаний 7: 12345, 12567, 12357, 14367, 12456, 23457 и 24567.

По формуле вероятности получим  $P = \frac{7}{21} = \frac{1}{3}$ .

**Ответ:**  $\frac{1}{3}$ .

**Пример 5.** Привести к многочлену стандартного вида выражение  $(a+b)^4$ .

**Решение.** Представим четвёртую степень двучлена как произведение двучленов:

$$(a+b)^4 = (a+b)(a+b)(a+b)(a+b).$$

После раскрытия скобок (до приведения подобных слагаемых) должен получиться многочлен, каждый из членов которого является произведением четырёх множителей, выбираемых по одному из каждой скобки. При этом может получиться 5 различных одночленов:  $a^4$ ,  $a^3b$ ,  $a^2b^2$ ,  $ab^3$  и  $b^4$ . Если во всех скобках выбрать первый член, то получится  $a^4$ , если же первый член выбрать только в третьей скобке, а в остальных трёх скобках — второй, то получится  $ab^3$ . Такие же одночлены получатся, если выбрать  $a$  только в первой, только во второй или только в четвёртой скобке. Значит, после раскрытия скобок образуется четыре одинаковых одночлена  $ab^3$ . После приведения подобных они образуют член  $4ab^3$ . Коэффициент этого члена равен числу способов выбора одной скобки, в которой выбирается  $a$  из четырёх.

Аналогично, коэффициент одночлена с буквенной частью  $a^2b^2$  окажется равным числу способов выбора двух скобок из четырёх.

Порядок выбора скобок роли не играет, важно лишь, из скольких скобок в одночлен идёт множитель  $a$ . Таким образом, речь идёт о сочетаниях. Как мы уже говорили, одночлен  $a^4$  получается при выборе всех четырёх скобок из четырёх, одночлен  $ab^3$  — при выборе одной скобки из четырёх и т. д. Член  $b^4$  получится, если ни в одной из скобок не брать  $a$ . После приведения подобных слагаемых каждый коэффициент многочлена стандартного вида окажется равным числу соответствующих сочетаний из четырёх элементов:

$$(a+b)^4 = C_4^4 a^4 + C_4^3 a^3b + C_4^2 a^2b^2 + C_4^1 ab^3 + C_4^0 b^4.$$

По формуле числа сочетаний:

$$C_4^4 = \frac{4!}{4! \cdot 0!} = 1; \quad C_4^3 = \frac{4!}{3! \cdot 1!} = \frac{4 \cdot 3!}{3! \cdot 1} = 4;$$

$$C_4^2 = \frac{4!}{2! \cdot (4-2)!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{2 \cdot 2} = 6.$$

Заметим, что  $C_n^m = C_n^{n-m}$ , так как при замене  $m$  на  $n-m$  в формуле числа сочетаний меняется только порядок сомножителей в знаменателе дроби  $\frac{n!}{m!(n-m)!}$ .

Значит,  $C_4^1 = C_4^{4-1} = C_4^3 = 4$  и  $C_4^0 = C_4^{4-0} = C_4^4 = 1$ .

Окончательно имеем:

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4.$$

В общем виде это равенство называют **формулой бинома Ньютона**, а коэффициенты многочлена в правой её части называют **биномиальными**.

### Формула бинома Ньютона

$$(a+b)^n = C_n^n a^n + C_n^{n-1} a^{n-1} b + C_n^{n-2} a^{n-2} b^2 + \dots \\ \dots + C_n^2 a^2 b^{n-2} + C_n^1 a b^{n-1} + C_n^0 b^n$$

## Упражнения

- 462.** Из пункта  $A$  в пункт  $B$  ведут четыре дороги, а из пункта  $B$  в пункт  $C$  — три дороги. Сколько различных маршрутов, проходящих через  $B$ , ведёт из пункта  $A$  в пункт  $C$ ?
- 463.** Из пяти букв разрезной азбуки составлено слово «книга». Ребёнок, не умеющий читать, рассыпал эти буквы, а затем собрал их в произвольном порядке. Найдите вероятность того, что у него снова получится слово «книга».
- 464.** Из карточной колоды, в которой 52 карты, наугад вынимают две карты. Какова вероятность того, что:
- 1) только одна из карт: а) бубна; б) туз; в) картинка;
  - 2) обе эти карты: а) бубны; б) тузы; в) картинки;
  - 3) хотя бы одна из карт: а) бубна; б) туз; в) картинка?
- 465.** Какова вероятность того, что при 5 бросаниях монеты она 3 раза упадёт гербом вверх?
- 466.** Сколько способами можно:
- 1) выбрать 2 из 6 разных открыток;
  - 2) расставить на полке 7 разных книг;
  - 3) из 10 кандидатов выбрать четырёх на четыре различные должности;
  - 4) из 12 кандидатов выбрать трёх на конференцию;
  - 5) из цифр 0, 2, 4, 6, 8 составить различные пятизначные числа, чтобы в каждом числе не было одинаковых цифр;
  - 6) выбрать две гласные буквы из слова «комбинаторика»?
- 467.** Игральная кость бросается два раза. Какова вероятность, что сумма выпавших очков окажется:
- 1) простым числом; 2) чётным числом; 3) числом, кратным 3; 4) числом, кратным 5?
- 468.** 1) В урне находится 6 шаров, из которых 3 белых. Начиная с вынимают два шара. Вычислите вероятность того, что оба шара не окажутся одного цвета.

- 2) В урне находится 10 белых и 6 чёрных шаров. Найдите вероятность того, что три наудачу вынутых один за другим шара не окажутся одного цвета.
469. На почте имеется 18 видов красочных открыток. Сколькоими способами можно выбрать из них 3 разных открытки?
470. В автобусе 20 мест.
- Сколькоими способами:
  - три пассажира могут занять места в этом автобусе;
  - 20 пассажиров можно рассадить в этом автобусе?
- 2) С какой вероятностью при случайной рассадке пассажиров в автобусе Саша и Коля окажутся соседями, если места в автобусе сгруппированы по 2?
471. Сколькоими способами можно разложить 5 поздравлений:
- по 5 конвертам;
  - по 6 конвертам?
472. В четыре подписанных конверта случайным образом кладут четыре письма. Найдите вероятность того, что:
- все письма окажутся в «правильных» конвертах;
  - письмо г-ну Иванову окажется в «правильном» конверте;
  - только одно из писем окажется в «правильном» конверте;
  - два письма окажутся в «правильных» конвертах, а два других — нет.
473. Николай, Александр и ещё 9 юношей случайным образом выстраиваются в линейку. С какой вероятностью Николай и Александр окажутся соседями?
474. На плоскости отмечено 5 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Сколько существует треугольников с вершинами в этих точках?
475. Сколько существует точек пересечения диагоналей выпуклого 17-угольника, если никакие три из диагоналей не проходят через одну точку?
476. Сколькоими способами четыре девушки могут разбиться на команды для парной игры в теннис?
477. Сколькоими способами 22 ученика спортивной школы могут разбиться на команды для игры в футбол (в каждой команде должно быть по 11 игроков)?
478. Сколькоими способами 22 ученика спортивной школы могут разбиться на команды для игры в футбол, если только двое могут стоять в воротах?

- 479.** Сколькими способами 6 школьников можно разделить:

  - 1) на две равные по численности группы;
  - 2) на группы, в одной из которых 2, а в другой 4 школьника?

**480.** Сколькими способами 10 школьников можно разделить:

  - 1) на две равные по численности группы;
  - 2) на три группы, в одной из которых 5, в другой — 3, а в третьей 2 школьника?

**481.** Из колоды в 36 карт случайным образом вытаскивают сначала одну карту, а затем другую. Какова при этом вероятность того, что:

  - 1) обе карты будут одной масти;
  - 2) обе карты будут одного достоинства;
  - 3) вторая карта окажется «старше» первой?

**482.** Из колоды в 36 карт случайным образом берут 6 карт.

  - 1) Сколько при этом существует различных вариантов?
  - 2) Найдите вероятность того, что среди этих 6 карт будет:
 

а) только один туз;	в) все четыре туза;
б) хотя бы один туз;	г) хотя бы одна бубна.

**483.** Среди 25 учеников класса разыгрываются 15 билетов в театр. Найдите вероятность того, что:

  - 1) Коле достанется билет;
  - 2) Коле и Саше достанутся билеты;
  - 3) ни Коле, ни Саше билетов не достанется.

**484.** Вычислите:

1) $A_7^3$ ;	3) $C_6^4$ ;	5) $A_{12}^7$ ;
2) $P_5$ ;	4) $P_6$ ;	6) $C_6^4$ .

**485.** Запишите формулой и упростите:

  - 1) число размещений из  $n + 1$  элементов по  $k - 1$ ;
  - 2) число сочетаний из  $k + 2$  элементов по  $k - 1$ ;
  - 3) число перестановок из  $m - 2$  элементов.

**486.** Верны ли равенства:

1) $C_9^3 = C_9^6$ ;	3) $C_6^4 + C_6^2 = C_7^4$ ;
2) $C_{12}^7 = C_{12}^5$ ;	4) $C_{10}^6 + C_{10}^4 = C_{11}^6$ ?

**487.** По формуле

$$(a+b)^n = C_n^n a^n + C_n^{n-1} a^{n-1} b + C_n^{n-2} a^{n-2} b^2 + \dots + C_n^2 a^2 b^{n-2} + C_n^1 a b^{n-1} + C_n^0 b^n$$

представьте в виде многочлена стандартного вида:

$$1) (c+d)^6; \quad 3) (2k-3n)^4;$$

$$2) (b+2c)^5; \quad 4) (m+n)^7.$$

- 488.** Используя формулу бинома Ньютона, определите, какой коэффициент будет иметь член многочлена  $(x+2)^{10}$ , содержащий седьмую степень переменной  $x$ .

- 489.** Преобразуйте в многочлен стандартного вида степени двучленов:

$$1) (x-2)^6; \quad 3) (3+y)^7; \quad 5) (x+2)^6 + (x-2)^6;$$

$$2) (x+2)^6; \quad 4) (3-y)^7; \quad 6) (3+y)^7 - (3-y)^7.$$

- 490.** Докажите равенство:

$$1) C_5^0 + C_5^1 + C_5^2 + C_5^3 + C_5^4 + C_5^5 = 2^5;$$

$$2) C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - C_n^3 + \dots + (-1)^k C_n^k + \dots$$

$$\dots + (-1)^{n-1} C_n^{n-1} + (-1)^n C_n^n = 0.$$

- 491.** Не приводя к многочлену стандартного вида выражение  $(x-3)^{12}$ , найдите:

1) член этого многочлена:

а) содержащий  $x^8$ ; б) содержащий  $x^{10}$ ;

в) не содержащий  $x$  (т. е. свободный член);

2) сумму коэффициентов многочлена стандартного вида, к которому приводится данное выражение.

- 492.** Найдите шестой член разложения  $(y^3+x^5)^n$ , если коэффициент третьего члена равен 45.

- 493.** Решите уравнение:

$$1) A_x^3 = \frac{1}{20} A_x^4; \quad 3) \frac{x}{A_x^2} = \frac{1}{12}; \quad 5) 20 A_{x-2}^3 = A_x^5.$$

$$2) 30x = A_x^2; \quad 4) \frac{12}{7} C_{x+2}^{x-1} = A_x^3;$$

### ! Контрольные вопросы и задания

- Сколько разных составов может иметь родительский комитет из двух мужчин и трёх женщин, если его избирают из 5 мужчин и 7 женщин? Если все составы равновероятны, то какова вероятность, что и папа, и мама Коли, вошедшие в число кандидатов, будут избраны в комитет?
- Сколькими способами 6 учеников можно разбить: а) на две; б) на три равные по численности группы? Какова вероятность, что Коля и Саша окажутся при этом в одной группе?
- Сколькими способами можно расставить 12 белых и 12 чёрных шашек на 32 чёрных клетках шахматной доски?

## Глава 6

# ПОВТОРЕНИЕ

Заключительная глава учебника состоит из двух пунктов. В первом — систематизируются знания о свойствах функций и преобразованиях их графиков. Вы познакомитесь также с обратными тригонометрическими функциями — последним классом функций, изучаемых в школьном курсе математики.

Второй пункт посвящён уравнениям и неравенствам. При этом основное внимание в нём удалено причинам появления посторонних решений, а также оформлению решений с использованием математической символики.

## 29. Функции и графики

Понятие функции начало складываться ещё в XVII в. В начале функциями называли обычные алгебраические выражения с переменными — собственно, это сегодня они обычные, а тогда Декарт только-только ввёл само понятие переменной. Впрочем, и сейчас никто из математиков не удивится, услышав выражения типа «функция  $x^2$ » или «сумма функций  $\sin x$  и  $\cos x$ », — всем понятно, что в первом случае речь идёт о функции  $y = x^2$ , а во втором — о сумме функций  $y = \sin x$  и  $y = \cos x$ , т. е. о функции  $y = \sin x + \cos x$ .

Существенное развитие понятие функции получило в XX в. в связи с разработкой теории множеств — стали рассматриваться не только знакомые вам числовые функции, но и функции, в которых переменные  $y$  и  $x$  принимают значения из произвольных множеств.

### Область определения функции

За время изучения математики вы познакомились с различными функциями. Каждая функция имеет *область определения* — множество значений, которые может принимать её аргумент. Наиболее часто приходится находить *естественную область определения* функции, заданной аналитически, т. е.

с помощью математического выражения  $f(x)$ . Естественная область определения функции  $y = f(x)$  состоит из всех значений  $x$ , при которых выражение  $f(x)$  имеет смысл.

## Упражнения

- 494.** Найдите область определения функции  $y = f(x)$ , если  $f(x)$  равно:

$$\begin{array}{ll} 1) \frac{x-1}{x^2-2x+1}; & 4) (4x^2-7x+3)^{\frac{3}{5}}; \\ 2) \frac{x^2-1}{x^2+2x+1}; & 5) \log_{x-0,5}(4x-x^2-2); \\ 3) \sqrt{5x^2+13x+8}; & 6) \log_{\sin x+0,5} \cos x. \end{array}$$

## Область значений функции

Каждому значению аргумента из области определения соответствует единственное значение функции. Все значения, которые принимает функция, составляют её *область значений* (иногда можно встретиться с термином *область изменения функции* или *множество значений функции*).

## Упражнения

- 495.** Укажите область значений функций:

$$\begin{array}{ll} 1) y = \frac{5}{x}; & 6) y = 2 \sin^2 x + \sin x - 1; \\ 2) y = 2x - 17; & 7) y = 12 \cos x - 4 \cos^2 x - 5; \\ 3) y = \sqrt{x} + 2; & 8) y = 0,5^{x^2-4x+3}; \\ 4) y = x^2 - 14x + 33; & 9) y = 2\sqrt{3-2x-x^2}; \\ 5) y = 10x - x^2 - 21; & 10) y = 3^x + 3^{-x}. \end{array}$$

## Непрерывность функции

Важным свойством, которым обладают многие функции, является *непрерывность*. Известно, что функция непрерывна, если её график можно провести, не отрывая карандаш от бумаги.

Графики некоторых функций состоят из нескольких непрерывных ветвей. Говорят, что такие функции непрерывны на соответствующих числовых промежутках.

## Упражнения

**496.** Укажите промежутки непрерывности функции:

1)  $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x + 1};$

3) ○  $y = \sqrt{\sin x};$

2) ○  $y = \frac{1}{5 - 5^{\sin x}};$

4) ●  $y = [x] + \{2x\}.$

Изученные вами функции  $y = f(x)$ , в записи которых нет ни целой, ни дробной части, задают функции, называемые **элементарными**. Полезно знать, что любая элементарная функция непрерывна на любом промежутке из её области определения.

Важное свойство непрерывных функций — сохранение знака на промежутках области определения, на которых она не обращается в нуль. На этом свойстве непрерывных функций основано решение неравенств методом интервалов.

## Упражнения

**497.** Решите неравенство:

1)  $\frac{2x + 1}{(x + 3)(x - 5)} > 0;$

4) ○  $\frac{4 - 2^{3-x}}{x^2 - 1} \geqslant 0;$

2)  $\frac{4x^2 - 1}{x + 3} < 0;$

5) ●  $\frac{0,5^x - 2}{\cos x} > 0;$

3) ○  $\frac{\log_{0,5} x + 2}{(x - 3)(x + 5)} \geqslant 0;$

6) ●  $\frac{\sin x}{3^{2x-1} - 1} < 0.$

## Монотонность функции

Часто при решении неравенств используют свойство монотонности, т. е. возрастания или убывания функции.

Некоторые функции возрастают или убывают на всей своей области определения — их называют, соответственно,




Рис. 113

возрастающими или убывающими. На рисунке 113 изображены эскизы возрастающей (113, а) и убывающей (113, б) функций.

### Упражнения

**498.** Решите неравенство:

- 1)  $3^{x^2+x-1} < \left(\frac{1}{3}\right)^{4+3x-x^2};$
- 2)  $\log_{0,5}(x+1) > \log_{0,25}(x^2-x+4);$
- 3)  $\log_x \frac{x+4}{2x-1} > 1;$
- 4)  $\log_{\frac{x+4}{x+1}}(x-5) < 1.$

Большинство изученных выше функций на одних промежутках возрастают, а на других убывают (рис. 114).




Рис. 114


### Упражнения

**499.** Укажите промежутки возрастания и убывания функции, заданной графиком:


- 1) рис. 114;      2) рис. 115, а;      3) рис. 115, б.

Знание свойств конкретных функций часто позволяет сделать вывод о монотонности более сложных функций.

Докажем, например, что функция  $y = x^2 - \log_{0,5} x - 7$  возрастает на всей своей области определения, т. е. на промежутке  $(0; +\infty)$ .



a)



б)

Рис. 115

Пусть  $0 < x_1 < x_2$ , тогда:

1) в силу возрастания функции  $y = x^2$  на промежутке  $(0; +\infty)$ :

$$x_1^2 < x_2^2; \quad (1)$$

2) по правилам действий с неравенствами вычтем из обеих частей верного неравенства (1) число 7:

$$x_1^2 - 7 < x_2^2 - 7; \quad (2)$$

3) в силу убывания логарифмической функции с основанием 0,5 имеем:

$$\log_{0,5} x_1 > \log_{0,5} x_2; \quad (3)$$

4) по правилам действий с неравенствами умножим верное неравенство (3) на -1:

$$-\log_{0,5} x_1 < -\log_{0,5} x_2; \quad (4)$$

5) по правилам действий с неравенствами сложим верные неравенства одного смысла (2) и (4):

$$x_1^2 - 7 - \log_{0,5} x_1 < x_2^2 - 7 - \log_{0,5} x_2.$$

Таким образом, при  $0 < x_1 < x_2$  выполняется неравенство  $y(x_1) < y(x_2)$ , а значит, функция возрастает, что и требовалось доказать.

## Упражнения

- 500.** Докажите, что функция  $y = -\frac{2}{5^{2-x}}$  является убывающей.

**501.** Среди следующих функций укажите возрастающие и убывающие. Объясните, как вы сделали свой вывод:

- 1)  $y = 0,5^{5-x} + \sqrt{x-2}$ ;
- 2)  $y = \log_2(3-x) + \frac{1}{\sqrt{x+7}}$ ;
- 3)  $y = (x+1)\sqrt{x-1}$ ;
- 4)  $y = (x-1)\sqrt{x-1}$ ;
- 5)  $y = x^2 + \lg(-2-x)$ ;
- 6)  $y = (x^2 - 16) \cdot \lg(-2-x)$ .

**502.** Укажите промежутки возрастания и убывания следующих функций. Найдите их наибольшие и наименьшие значения, если они существуют:

- 1)  $y = \frac{8}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}}$ ;
- 2)  $y = 0,2^{x^2 - 4x + 2}$ ;
- 3)  $y = -\frac{3}{\sqrt{4 - 3x - x^2}}$ ;
- 4)  $y = \log_7(x^2 + 6x + 11)$ ;
- 5)  $y = 3^{1 - \cos x}$ ;
- 6)  $y = 0,3^{\cos^2 x - \sin^2 x}$ .

**503\*.** Функция  $y = f(x)$  задана своим графиком:

- 1) рис. 115, а;
- 2) рис. 115, б.

Зная, что  $g(x) = \sqrt{f(x)}$  и  $h(x) = \frac{1}{\lg f(x)}$ , найдите:

- а) область определения функций  $y = g(x)$  и  $y = h(x)$ ;
- б) область значений функций  $y = g(x)$  и  $y = h(x)$ ;
- в) промежутки возрастания и убывания функций  $y = g(x)$  и  $y = h(x)$ ;
- г) наибольшие и наименьшие значения функций  $y = g(x)$  и  $y = h(x)$ , если они существуют.

**504.** Подберите корень уравнения и докажите, что он единственный:

- 1)  $\log_5(5^x - 4) = 1 - x$ ;
- 2)  $\log_4(4^{-x} + 3) = x + 1$ ;
- 3)  $0,5^{x+1} - \sqrt{x+7} = x + 5$ ;
- 4)  $\sqrt{x-10} + \sqrt{14+x} = \frac{12}{x-9}$ ;

5)  $\log_{\frac{1}{3}}(x+2) - \sqrt{3x+1} = x-4;$

6)  $\sqrt{x+2} + \sqrt{x-1} = 11 + 2x - 3x^2;$

7)  $\sin \frac{\pi x}{2} = x^2 - 2x + 2;$

8)  $\log_2 x + \log_x 2 = 2 - \sqrt{x-2};$

9)  $5^x + 5^{-x} = 2 \cos \left( \frac{5x^2 - 4x}{9} \right).$

## Обратимость функции

Равенство  $y = f(x)$ , задающее функцию  $y$ , удобно для нахождения значения  $y$  по данному значению  $x$ . Часто, однако, приходится решать *обратную* задачу — находить значения аргумента, при которых функция принимает то или иное значение.

Если каждое своё значение функция  $y$  принимает по одному разу, т. е. только при каком-то одном значении аргумента  $x$ , то, выражая  $x$  из равенства  $y = f(x)$ , мы получим равенство  $x = g(y)$ , задающее функцию  $x$ .

Однако в школьной математике функцию обычно обозначают буквой  $y$ , поэтому переменные в равенстве  $x = g(y)$  переименовывают и получают функцию  $y = g(x)$ , *обратную* для функции  $y = f(x)$ .

С этим переименованием связано свойство симметрии графиков *взаимно обратных* функций относительно прямой  $y = x$ . Действительно, функция  $x = g(y)$  имеет тот же самый график, что и функция  $y = f(x)$ , а графики  $x = g(y)$  и  $y = g(x)$  симметричны относительно прямой  $y = x$  (рис. 116).

Функцию, имеющую обратную, называют *обратимой*. Так, например, обратна каждая из взаимно обратных функций  $y = a^x$  и  $y = \log_a x$ .

Чтобы функция была *обратимой*, каждое своё значение она должна принимать один раз. Так, **обратима любая монотонная функция**, поскольку каждое своё значение она принимает один раз.




Рис. 116

Некоторые функции не обладают свойством обратимости, поскольку одно и то же значение принимают при различных значениях аргумента. Так, например, значение 1 функция  $y = x^2$  принимает при двух значениях аргумента:  $x = 1$  и  $x = -1$ , а функция  $y = \sin x$  при любом  $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$ , где  $n \in \mathbb{Z}$ .

Чтобы получить функцию, обратную функции  $y = x^2$ , последнюю рассматривают на промежутке  $[0; +\infty)$ , на котором она, во-первых, принимает все свои значения и, во-вторых, монотонна, и, следовательно, обратима. Как вы знаете, обратной функцией для неё является функция  $y = \sqrt{x}$ .

Точно так же, ограничивая область определения функции  $y = x^n$  при чётном  $n$ , получают обратную ей функцию  $y = \sqrt[n]{x}$ .

## Обратные тригонометрические функции

### Функция $y = \arcsin x$

Чтобы сделать обратимой функцию  $y = \sin x$ , нужно рассмотреть её на промежутке, где она, во-первых, принимает все свои значения и, во-вторых, монотонна.

Естественно взять наиболее близкий к нулю промежуток  $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ . На этом промежутке функция  $y = \sin x$  имеет обратную функцию  $y = \arcsin x$  (рис. 117).

Перечислим её свойства:

1) область определения — отрезок  $[-1; 1]$ ;

2) область значений — отрезок  $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ ;

3) функция непрерывна и является возрастающей.

### Функция $y = \arccos x$

Функция  $y = \cos x$  убывает и принимает все свои значения на промежутке  $[0; \pi]$ . Здесь она имеет обратную функцию  $y = \arccos x$  (рис. 118), которая определена, непрерывна и убывает на промежутке  $[-1; 1]$ . Область значений функции  $y = \arccos x$  — отрезок  $[0; \pi]$ .

### Функция $y = \operatorname{arctg} x$

Функция  $y = \operatorname{tg} x$  возрастает и принимает все свои значения на промежутке  $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ . Здесь она имеет обратную функцию

цию  $y = \arctg x$  (рис. 119), которая определена, непрерывна и возрастает на всей числовой прямой. Область значений функции  $y = \arctg x$  — интервал  $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$ .

### Функция $y = \arctg x$

Функция  $y = \operatorname{ctg} x$  убывает и принимает все свои значения на промежутке  $(0; \pi)$ . Здесь она имеет обратную функцию  $y = \operatorname{arcctg} x$  (рис. 120), которая определена, непрерывна и убывает на всей числовой прямой. Область значений функции  $y = \operatorname{arcctg} x$  — интервал  $(0; \pi)$ .




Рис. 117




Рис. 118




Рис. 119




Рис. 120

**Свойства взаимно обратных функций:**

- 1) область определения одной из них является областью значений другой;
- 2) если одна из них возрастающая (убывающая), то и другая, соответственно, возрастающая (убывающая);
- 3) если прямая  $x = a$  служит вертикальной асимптотой одной, то другая имеет горизонтальную асимптоту  $y = a$ .

**Упражнения**

**505.** Найдите значение функции:

1)  $y = \arcsin x$ , если  $x$  равен:

а) 0,5;    б)  $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ;    в)  $\sin \frac{5\pi}{7}$ ;    г)  $\sin 10$ ;    д)  $\cos 2$ ;

2)  $y = \arccos x$ , если  $x$  равен:

а) -0,5;    б)  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ;    в)  $\cos \frac{5\pi}{4}$ ;    г)  $\cos 10$ ;    д)  $\sin 1$ ;

3)  $y = \operatorname{arctg} x$ , если  $x$  равен:

а)  $\sqrt{3}$ ;    б) -1;    в)  $\operatorname{tg} \frac{4\pi}{5}$ ;    г)  $\operatorname{tg} 7$ ;    д)  $\operatorname{ctg} 1$ ;

4)  $y = \operatorname{arcctg} x$ , если  $x$  равен:

а)  $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ;    б) 1;    в)  $\operatorname{ctg} \frac{8\pi}{5}$ ;    г)  $\operatorname{ctg} 7$ ;    д)  $\operatorname{tg} 2$ .

**506.** Решите неравенство:

1)  $-\frac{\pi}{6} < \arcsin(x^2 - 1,5x) \leqslant \frac{\pi}{6}$ ;

2)  $6 \arccos^2 x + 7 \arccos x < 3$ .

**Чётность и нечётность функции**

Иногда преобразование переводит график функции сам в себя. Так, например, поскольку значение чётной функции не изменяется при перемене знака у аргумента:

$$f(-x) = f(x),$$

график чётной функции оказывается симметричен относительно оси ординат.

Значение нечётной функции при перемене знака у аргумента свой знак меняет:

$$f(-x) = -f(x),$$

поэтому график нечётной функции симметричен относительно начала координат.

Понятно, что область определения и чётной, и нечётной функции должна быть симметрична относительно нуля.

## Упражнения

- 507.** Задайте аналитически какую-нибудь функцию, имеющую тот же самый график, что и обратная ей. Может ли возрастающая функция, отличная от функции  $y = x$ , иметь тот же самый график, что и обратная ей?
- 508.** Определите, какие из следующих функций чётные, какие нечётные, а какие не являются ни чётными, ни нечётными:
- 1)  $y = x + \sin x;$
  - 2)  $y = \sin x \cdot \cos x;$
  - 3)  $y = x^2 + \cos x;$
  - 4)  $y = x \cdot \operatorname{arctg} x.$
- Какие можно сделать выводы о чётности или нечётности:
- а) суммы двух чётных функций;
  - б) суммы двух нечётных функций;
  - в) произведения двух чётных функций;
  - г) произведения двух нечётных функций;
  - д) произведения чётной и нечётной функций с одинаковыми областями определения?
- 509.** Дополните графики на рисунке 121 так, чтобы они стали задавать: 1) чётные; 2) нечётные функции.





Рис. 121

## Периодичность функции


Если при сдвигах графика функции параллельно оси абсцисс вправо и влево на некоторое расстояние он переходит сам в себя, то функция является *периодической*. Расстояние, на которое переносится график, называют *периодом* функции.

Рассматривая периодические функции, обычно указывают их наименьший период. Тригонометрические функции  $y = \sin x$  и  $y = \cos x$  имеют период  $2\pi$ , период функций  $y = \operatorname{tg} x$  и  $y = \operatorname{ctg} x$  равен  $\pi$ . Периодична также и функция  $y = \{x\}$  — её наименьший период равен 1.


### Упражнения

**510.** Достройте график функции, зная, что:

- 1) её период равен 2 (рис. 122, а);
- 2) её период равен 2, и она чётная (рис. 122, б).



а)



б)

Рис. 122

## Преобразование графиков

Симметрии и параллельный перенос, о которых упоминалось в связи со свойствами чётности, нечётности и периодичности функций, вместе с некоторыми другими преобразованиями часто используются при построении графиков функций и графиков уравнений. Для графика уравнения отсутствие различных точек с одинаковыми абсциссами не является обязательным, например, окружность с центром в начале координат и радиусом, равным 2, не является графиком функции, но является графиком уравнения  $x^2 + y^2 = 4$ .

## Основные преобразования графиков

№	Переход		Описание преобразования
	от графика	к графику	
1	$y = f(x)$	$y = f(x) + b$	Перенос параллельно оси ординат на $b$
2	$y = f(x)$	$y = f(x - a)$	Перенос параллельно оси абсцисс на $a$
3	$y = f(x)$	$y = kf(x), k > 0$	Растяжение от оси абсцисс в $k$ раз
4	$y = f(x)$	$y = f(kx), k > 0$	Сжатие к оси ординат в $k$ раз
5	$y = f(x)$	$y = -f(x)$	Симметрия относительно оси абсцисс
6	$y = f(x)$	$y = -f(-x)$	Симметрия относительно начала координат
7	$y = f(x)$	$y = f(-x)$	Симметрия относительно оси ординат
8	$y = f(x)$	$x = f(y)$	Симметрия относительно прямой $y = x$
9	$y = f(x)$	$y =  f(x) $	Симметрия относительно оси абсцисс частей графика, расположенных в нижней полуплоскости
10	$y = f(x)$	$y = f( x )$	Уничтожение части графика слева от оси ординат и дублирование оставшейся части симметрично относительно оси ординат
11	$y = f(x)$	$ y  = f(x)$	Уничтожение части графика под осью абсцисс и дублирование оставшейся части симметрично относительно оси абсцисс

## Упражнения

**511.** 1) Какие недостатки вы видите в описании преобразований 3 и 4 в таблице (с. 229)?

2) Что происходит с расстояниями от точки графика до осей абсцисс и ординат при этих преобразованиях?

**512.** ○ Проиллюстрируйте каждое из указанных в таблице преобразований конкретными примерами построения графика функции.

**513.** 1) Какой график вы будете преобразовывать при построении графика уравнения:

а)  $y = (2x + 1)^2$ ;

в)  $y = \frac{2x - 3}{4x}$ ;

б)  $y = \frac{3 - 2x}{x}$ ;

г) ○  $y = \log_{0,5} (2 - 4|x|)$ ?

2) В каком порядке вы будете применять указанные в таблице преобразования?

**514.** ● При преобразовании графика функции  $y = f(x)$  в график функции  $y = f(2x + 3)$  один ученик сначала перенёс график на 3 единицы влево, а затем сжал его к оси ординат в 2 раза, другой сначала сжал исходный график в два раза к оси ординат, а затем выполнил перенос на 3 единицы влево, третий же ученик сначала сжал график в два раза к оси ординат, а затем выполнил перенос влево на 1,5 единицы. Верны ли решения этих учеников? Как бы вы выполнили преобразование графика  $y = f(x)$  в график функции  $y = f(2x - 3)$ ?

**515.** Преобразуйте график функции  $y = f(x)$  (рис. 123) в график уравнения:

1) ○  $y = f(|x| + 1)$ ; 4) ○  $y = |f(x) + 1|$ ;

2) ○  $y = f(|x + 1|)$ ; 5) ●  $y = \|f(x)\| - 1\|$ ;

3) ○  $y = |f(x)| - 1$ ; 6) ●  $|y| = \|f(x)\| - 1$ .




Рис. 123

**516.** ● 1) Задайте аналитически функцию, график которой получается из графика функции  $y = x^2$  в результате последовательного выполнения преобразований, указанных в таблице под номерами:

а) 1, 3, 8; б) 5, 6, 2, 8; в) 1, 6, 4, 9,

где  $b = -1$  в преобразовании 1,  $a = 2$  в преобразовании 2.

2) Выполните эскиз графика, который должен получиться в результате этих преобразований.

3) Задайте сами последовательность каких-нибудь преобразований из первых девяти, указанных в таблице.

4) Выполните для своей последовательности преобразований задания 1 и 2.

**517.** Задайте аналитически какую-нибудь функцию, график которой симметричен относительно:

1) прямой  $x = 2$ ; 2) точки  $A(-2; 3)$ .

**518.** 1) Чем отличается от графика функции  $y = \{x\}$  график кусочно-заданной функции

$$y = \begin{cases} \{x\}, & \text{если } x \text{ — не целое число,} \\ 1, & \text{если } x \text{ — целое число?} \end{cases}$$

2) Какие из указанных в таблице преобразований и в каком порядке следует применить, чтобы получить этот график из графика функции  $y = \{x\}$ ?

**519.** Используя идею преобразования графика, найдите наименьший период следующих функций:

1)  $y = \cos 3x$ ; 3)  $y = \operatorname{tg}(4x + 1)$ ;

2)  $y = \sin \frac{x}{5}$ ; 4)  $y = \{0,5x - 4\}$ . 

**520.** 1) Что произойдёт с графиком уравнения с двумя переменными, если в уравнении заменить:

а)  $x$  на  $-x$ ; в)  $x$  на  $x + 3$ ; д)  $x$  на  $2x$ ;

б)  $y$  на  $-y$ ; г)  $y$  на  $y - 3$ ; е)  $y$  на  $0,5y$ ? 

2) Проиллюстрируйте эти преобразования на примере уравнения окружности  $x^2 + y^2 = 4$ .

**521.** 1) Постройте график уравнения:  $|x| + |y| = 2$ .

2) Отметьте множество точек, координаты которых удовлетворяют неравенству  $|x| + |y| \leq 2$ .

**522.** Решите графически уравнения:

1)  $4 + 2|x| - x^2 = |x + 1|$ ; 2)  $|x + 3| + |x - 1| = 4$ . 

**523.** 1) Найдите все значения  $a$ , при которых уравнение  $|4 + 2|x| - x^2| = a$  имеет:

а) 2 корня; б) 4 корня; в) 5 корней; г) 6 корней. 

2) При каких значениях  $a$  уравнение не имеет корней?



## Контрольные вопросы и задания

- Перечислите знакомые вам свойства функций и проиллюстрируйте их эскизами графиков соответствующих функций.
- Верны ли следующие утверждения о функциях с одинаковыми областями определения: а) сумма двух возрастающих функций — возрастающая функция; б) произведение двух убывающих функций — убывающая функция; в) разность двух чётных функций — чётная функция; г) произведение двух нечётных функций — нечётная функция. Если вы считаете утверждение верным, постараитесь его обосновать, если неверным — приведите контрпример.
- Постройте график функции  $y = \left| 2 \cos \left( 0,5x + \frac{\pi}{4} \right) \right|$  с помощью преобразований. Укажите наименьший период, наибольшее и наименьшее значения, промежутки монотонности данной функции.

## 30. Уравнения и неравенства

Уравнения и неравенства люди решают с глубокой древности. Вы познакомились с уравнениями и неравенствами ещё в начальной школе и с тех пор научились решать много разных их типов. В большинстве случаев в процессе решения исходное уравнение или неравенство заменяется более простым и так далее, пока не будет приведено к простейшему виду.

При замене одного уравнения или неравенства другим могут встретиться три случая.

1. Множества решений первого и второго уравнения (неравенства) совпадают. Понятно, что эта ситуация самая благоприятная — решения второго уравнения (неравенства) можно сразу записывать в ответ.

**Уравнения (неравенства) с одним и тем же множеством решений называют равносильными.**

2. Множество решений второго уравнения (неравенства) содержит все решения первого. В этом случае второе уравнение (неравенство) называют **следствием** первого. При этом те решения второго, которые не являются решениями первого, называют **посторонними**, их стараются выявить и отбросить.

Нетрудно заметить, что если следствие не содержит никаких других решений, кроме решений первого, то оно ему равносильно.

Два уравнения (неравенства) равносильны, если каждое из них является следствием другого.

3. Множество решений второго уравнения (неравенства) содержит не все решения первого, т. е. теряются решения. Эта ситуация самая неприятная. Возможно, поэтому у неё даже нет специального названия.

Во всех трёх случаях множество решений первого уравнения (неравенства) сравнивается с множеством решений второго. Однако обычно, когда мы выполняем преобразование, решений у нас ещё нет. И сравниваем мы множества решений, анализируя сами преобразования, которые применяем. Некоторые преобразования не могут изменить множества решений, такие преобразования называют *равносильными*. Применение других может привести к посторонним решениям или к потере решений, — эти преобразования называют *неравносильными*. Так, например, к равносильным преобразованиям относится замена  $\sin^2 x$  тождественно равным ему выражением  $1 - \cos^2 x$ . А при замене  $\sin x$  выражением  $\sqrt{1 - \cos^2 x}$  будут потеряны решения (если они есть), при которых  $\sin x < 0$ , следовательно, это преобразование неравносильное.

Заметим, что неравносильное преобразование может привести и к равносильному уравнению или неравенству, но в этом нельзя быть уверенными, т. е. *неравносильное преобразование не гарантирует сохранения множества решений*.

В этом пункте мы повторим знакомые преобразования и проанализируем, как и почему следует поступать, чтобы записать в ответ все решения исходного уравнения или неравенства и не записать лишних.

Рассмотрим сначала две основные причины неравносильности преобразований.

### 1. Изменение области допустимых значений переменной (ОДЗ)

Наиболее часто изменение ОДЗ связано с применением формул. Некоторые формулы действуют на всём множестве действительных чисел, и их применение является равносильным преобразованием. Таковы, например, формулы сокращённого умножения. А вот в формуле  $\sin 2x = \frac{2 \tg x}{1 + \tg^2 x}$  замена её левой части, имеющей смысл при любом значении  $x$ , её правой частью приводит к *сужению* ОДЗ за счёт всех значений  $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$ ,  $n \in \mathbf{Z}$ , при которых не существует тангенса.

Расширение ОДЗ влечёт, например, замена суммы логарифмов  $\log_2 f(x) + \log_2 g(x)$  логарифмом произведения  $\log_2(f(x) \cdot g(x))$ , поскольку последнее выражение, в отличие от первого, имеет смысл и при отрицательных значениях  $f(x)$  и  $g(x)$ .

Расширение ОДЗ может привести к появлению посторонних решений, а сужение — к потере решений. Чтобы этого избежать, при расширении ОДЗ следует рассматривать дополнительные условия, запрещающие решениям попадать в район расширения. Если же ОДЗ сузилось, — нужно дополнительно поискать решения в районе сужения.


На следующих диаграммах (рис. 124) схематически показаны случаи расширения и сужения ОДЗ. ОДЗ исходного уравнения или неравенства изображено голубым цветом, а ОДЗ преобразованного — серым. Точками обозначены решения.

## 2. Расширение сферы действия правил

Использование правил действий с равенствами и неравенствами иногда предполагает наличие условий, при которых эти правила применимы. Так, например, вы знаете, что *обе части равенства можно умножить или разделить на отличное от нуля число*. Однако при умножении обеих частей уравнения на выражение с переменной множитель может иметь нули, которые объединяются с корнями исходного уравнения. А значит, нули множителя следует проверить отдельно — они могут оказаться посторонними решениями. Кроме того, умножение или деление на выражение с переменной может привести к сужению исходной ОДЗ, о последствиях чего уже упоминалось.

Другим примером расширения сферы действия правил является *возведение неравенства в чётную степень*. Извест-

Решения, которые находятся в районе расширения ОДЗ, следует отбросить



Следует дополнительно искать решения в районе сужения ОДЗ




Рис. 124

но, что в чётную степень можно возводить неравенство с неотрицательными частями. Выполнив такое преобразование при решении неравенства, следует дополнительно рассмотреть случаи, когда части неравенства принимают отрицательные значения и, кроме того, не забыть, что возведение в чётную степень могло расширить ОДЗ.

## Упражнения

**524.** Является ли равносильным преобразование, связанное с заменой выражения а) выражением б)?

Если преобразование неравносильно, укажите причину неравносильности. Запишите дополнительные условия, выполнение которых следует проверить, чтобы избежать появления посторонних решений, или какие случаи следует дополнительно рассмотреть, чтобы не потерять решения.

1) а)  $\frac{x^2 - 1}{x + 1}$ ;

б)  $x - 1$ ;

2) а)  $x - 1$ ;

б)  $\frac{x^2 - 1}{x + 1}$ ;

3) а)  $x + 1$ ;

б)  $\sqrt{x^2 + 1 + 2x}$ ;

4) а)  $\sqrt{x^2 + 1 + 2x}$ ;

б)  $x + 1$ ;

5) а)  $\sqrt{x^2 + 1 + 2x}$ ;

б)  $|x + 1|$ ;

6) а)  $\operatorname{tg}\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ ;

б)  $\frac{\operatorname{tg}x + \sqrt{3}}{(1 - \sqrt{3})\operatorname{tg}x}$ ;

7) а)  $\sqrt{1 - \sin^2 x}$ ;

б)  $\cos x$ ;

8) а)  $1 + \operatorname{tg}^2 x$ ;

б)  $\frac{1}{\cos^2 x}$ ;

9) а)  $f(x) - g(x)$ ;

б)  $(\sqrt{f(x)} - \sqrt{g(x)})(\sqrt{f(x)} + \sqrt{g(x)})$ ;

10) а)  $f(x) - g(x) + g(x)$ ;

б)  $f(x)$ ;

11) а)  $2 \lg f(x)$ ;

б)  $\lg f^2(x)$ ;

12) а)  $\lg f^3(x)$ ;

б)  $3 \lg f(x)$ ;

13) а)  $\ln(f(x) \cdot g(x))$ ;

б)  $\ln f(x) + \ln g(x)$ .

**525.** Является ли равносильным преобразование уравнения а) в уравнение б)?

Если преобразование неравносильно, укажите причину неравносильности. Запишите дополнительные условия,

выполнение которых следует проверить, чтобы избежать появления посторонних решений, или случаи, которые следует дополнительно рассмотреть, чтобы не потерять решения.

1) а)  $\sqrt{3x^2 + 2x - 1} = 2x - 1$ ; б)  $x^2 - 6x + 2 = 0$ ;

2) а)  $\sqrt{2x + 3} + \sqrt{x - 2} = 4$ ;

б)  $2x + 3 + x - 2 + 2\sqrt{2x + 3} \cdot \sqrt{x - 2} = 16$ ;

3) а)  $\sqrt{2x + 3} + \sqrt{x - 2} = 4$ ;

б)  $2x + 3 + x - 2 + 2\sqrt{(2x + 3)(x - 2)} = 16$ ;

4) а)  $\log_{7-x}(x^3 + 9) = \log_{7-x}((x + 3)(x - 1)^2)$ ;

б)  $x^3 + 9 = (x + 3)(x - 1)^2$ ;

5) а)  $|\sin x| \cos x = \sin^2 x$ ; б)  $\cos x = \sin x$ ;

6) а)  $\log_{\cos x} \sin x + \log_{\sin x} \cos x = 2$ ;

б)  $\log_{\cos x} \sin x + \frac{1}{\log_{\cos x} \sin x} = 2$ ;

7) а)  $\operatorname{tg}^2 x = \frac{1 - \cos x}{1 - \sin |x|}$ ;

б)  $\operatorname{tg}^2 |x| = \frac{1 - \cos |x|}{1 - \sin |x|}$ ;

8) а)  $2 \sin 2x + \cos 2x + 1 = 0$ ;

б)  $\frac{4 \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg}^2 x} + \frac{1 - \operatorname{tg}^2 x}{1 + \operatorname{tg}^2 x} + 1 = 0$ .

Завершите решения уравнений 1), 2), 4)—8).

**526.** Выразите  $x$  из равенства:

1)  $\frac{b(x - b)}{2a + b} + \frac{a(x - a)}{a + 2b} = a + b$ ;

2)  $\frac{a^2 + x}{b^2 - x} - \frac{4abx + 2a^2 - 2b^2}{b^4 - x^2} = \frac{a^2 - x}{b^2 + x}$ .

**527.** Решите уравнение:

1)  $\frac{2 - 6x}{3 - x} - \frac{3x + 4}{x - 3} = 3$ ;

2)  $\frac{x + 1}{2x + 6} - \frac{2x}{3 - x} - \frac{9(x + 5)}{2(x^2 - 9)} = 0$ ;

3)  $\frac{x - 4}{x + 4} + \frac{16}{x^2 - 16} = \frac{x + 4}{x - 4}$ ;

4)  $\frac{x^2 + 5x + 3}{x^2 + x + 2} = \frac{3}{2}$ .

**528.** Решите уравнение с модулем:

$$1) |x - 3| = 2;$$

$$3) \left| \frac{x}{2} - \frac{5}{4} \right| = x - 1;$$

$$2) |2x - 5| = x - 1;$$

$$4) |2x - 5| = 2 - x.$$

**529.** Решите систему уравнений:

$$1) \begin{cases} 3x + 5y = 14, \\ 2x - 4y = -20; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} 3x - 2y = 11, \\ 4x - 5y = 3. \end{cases}$$

**530.** Является ли равносильным преобразование неравенства а) в неравенство б)? Если преобразование неравносильно, запишите дополнительные условия, которым должны удовлетворять решения второго неравенства или какие случаи следует дополнительно рассмотреть, чтобы не потерять решения:

$$1) \text{a)} \frac{(x+5)^2}{x^2 - 9} \geqslant 0;$$

$$\text{б)} x^2 - 9 > 0;$$

$$2) \text{а)} (2x - 3)\sqrt{3x^2 - 5x + 2} > 0;$$

$$\text{б)} 2x - 3 > 0;$$

$$3) \text{а)} (2x^2 - 3x - 5)\sqrt{3x + 1} < 0;$$

$$\text{б)} 2x^2 - 3x - 5 < 0;$$

$$4) \text{а)} (6x - 5)\sqrt{2x^2 - 7x - 9} \geqslant 0;$$

$$\text{б)} 6x - 5 \geqslant 0;$$

$$5) \text{а)} (2x^2 + 9x - 11) \lg^2(x - 5) \leqslant 0;$$

$$\text{б)} 2x^2 + 9x - 11 \leqslant 0;$$

$$6) \text{а)} 5\sqrt{x^2 - 3x + 2} < 5\sqrt{x^2 - 5x + 5};$$

$$\text{б)} x^2 - 3x + 2 < x^2 - 5x + 5;$$

$$7) \text{а)} \lg(x - 2)^2 < \lg(x^2 - 4) - \lg(-x - 2);$$

$$\text{б)} 2 \lg(2 - x) < \lg(2 - x);$$

$$8) \text{а)} \log_{\sin x} \cos x > 1;$$

$$\text{б)} \cos x < \sin x.$$

Завершите решение неравенств.

**531.** Решите неравенство:

$$1) (2x + 1)^2 - 8 \geqslant (3 - 2x)^2;$$

$$3) \frac{x^2 - 2x + 3}{x^2 - 4x + 3} > -3;$$

$$2) \frac{4 - 2x}{1 - 3x} > 0;$$

$$4) (x + 4)(x - 1)(x - 5) \leqslant 0.$$

**532.** Решите систему неравенств:

$$1) \begin{cases} 5(x + 1) + 6(x + 2) > 9(x + 3), \\ 7x - 3(2x + 3) > 2(x - 18); \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} \frac{5 - x}{8} + \frac{3 - 2x}{4} > 0, \\ \frac{3x - 5}{2} - \frac{2x - 1}{3} < -2. \end{cases}$$

**533.** Решите неравенство с модулем:

1)  $|x - 2| > 1;$

3)  $2|x + 1| > x + 4;$

2)  $|x - 2| < 1;$

4)  $3|x - 1| \leq x + 3.$

Рассуждения, которые вы проводили при решении уравнений и неравенств, можно при оформлении решения заменить соответствующей математической символикой. Речь идёт об употреблении знаков равносильности « $\Leftrightarrow$ », следования « $\Rightarrow$ », системы «{» и совокупности «[».

Знак равносильности « $\Leftrightarrow$ » ставится между уравнениями или неравенствами в случае проведения равносильного преобразования, а знак следования « $\Rightarrow$ » — при неравносильном преобразовании, которое может повлечь за собой появление посторонних решений.

Знак системы «{» требует одновременного выполнения указанных с его помощью условий, а знак совокупности «[» показывает, что должно выполняться хотя бы одно из условий. Так, например, условие равенства произведения нулю можно записать символически:

$$f(x) \cdot g(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = 0, \\ g(x) = 0, \\ x \in \text{ОДЗ}. \end{cases}$$

Заметим, что, если в результате неравносильного преобразования получится равносильное уравнение или неравенство, в записи решения всё равно не следует ставить знак « $\Leftrightarrow$ ».



**Пример 1.** Решить уравнение  $\sqrt{3x - 5} = x - 1$ .

**Решение.**

$$\sqrt{3x - 5} = x - 1 \Rightarrow 3x - 5 = x^2 - 2x + 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 2, \\ x = 3. \end{cases}$$

**Проверка.** При  $x = 2$  имеем:  $x - 1 = 2 - 1$  больше нуля, следовательно, число 2 — корень данного уравнения. При  $x = 3$  имеем:  $x - 1 = 3 - 1$  больше нуля, следовательно, число 3 — корень данного уравнения.

**Ответ:** 2; 3.

**Примечание.** Как оказалось, первое и второе уравнения в цепочке преобразований равносильны. Однако в момент перехода это ещё не было известно, и, следовательно, ошибкой было бы поставить между ними знак « $\Leftrightarrow$ ». Если же нам потребуется, чтобы все

преобразования были равносильными, решение надо будет оформить, например, так:

$$\begin{aligned}\sqrt{3x-5} = x-1 &\Leftrightarrow \begin{cases} 3x-5 = x^2 - 2x + 1, \\ x-1 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 5x + 6 = 0, \\ x \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2, \\ x=3, \\ x \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2, \\ x=3. \end{cases}\end{aligned}$$

Оформим с помощью символов решение уравнения, с которым вы встречались в № 499.



### Пример 2. Решить уравнение

$$2 \sin 2x + \cos 2x + 1 = 0.$$

**Решение.** Выразим синус и косинус через тангенс половинного аргумента — приём, который называют *универсальной подстановкой*:

$$\begin{aligned}2 \sin 2x + \cos 2x + 1 = 0 &\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{4 \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg}^2 x} + \frac{1 - \operatorname{tg}^2 x}{1 + \operatorname{tg}^2 x} + 1 = 0, \\ x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}, \\ 2 \sin 2x + \cos 2x + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 4 \operatorname{tg} x + 2 = 0, \\ x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}, \\ 0 - 1 + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \pi n, \\ x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}. \end{cases}\end{aligned}$$

Ответ:  $\frac{\pi}{2} + \pi n, -\operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ .

## Упражнения

**534.** Оформите с помощью символов решение уравнений и неравенств из № 525 и 530.

**535.** Объясните, почему не нужно делать проверку корней в следующем решении иррационального уравнения:

$$\begin{aligned}\sqrt{3x-5} = x-1, 3\sqrt{3x-5} = 3x-3, 3x-5-3\sqrt{3x-5}+2=0, \\ \sqrt{3x-5}=1 \text{ или } \sqrt{3x-5}=2, \quad 3x-5=1 \text{ или } 3x-5=4, \\ x=2 \text{ или } x=3.\end{aligned}$$

Ответ: 2; 3.

**536.** Обоснуйте следующие равносильности:

$$1) \sqrt{f(x)} = g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g^2(x), \\ g(x) \geq 0; \end{cases}$$

$$2) \sqrt{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) < 0, \\ f(x) \geq 0, \\ f(x) > g^2(x); \end{cases}$$

$$3) \sqrt{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0, \\ g(x) > 0, \\ f(x) < g^2(x); \end{cases}$$

$$4) \log_{x-3} f(x) > \log_{x-3} g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} 3 < x < 4, \\ 0 < f(x) < g(x), \\ x > 4, \\ f(x) > g(x) > 0; \end{cases}$$

$$5) \lg(f(x) \cdot g(x)) = 5 \Leftrightarrow \begin{cases} \lg f(x) + \lg g(x) = 5, \\ \lg(-f(x)) + \lg(-g(x)) = 5; \end{cases}$$

$$6) \log_{g(x)} f(x) \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} (f(x) - 1)(g(x) - 1) \geq 0, \\ x \in \text{ОДЗ}; \end{cases}$$

$$7) \begin{cases} f(x) = 0, \\ g(x) = 0, \\ h(x) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = 0, \\ h(x) = 0, \\ g(x) = 0, \\ h(x) = 0. \end{cases}$$

**537.** 1) Обоснуйте равносильность

$$\log_{g(x)} f(x) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} (f(x) - 1)(g(x) - 1) > 0, \\ f(x) > 0, \\ g(x) > 0. \end{cases}$$

2) Используйте её в решении неравенств 5 и 11 из № 191.

**538.** Запишите, чему равносильно неравенство:

1)  $\log_{g(x)} f(x) < 0$  и решите с помощью этой равносильности неравенства 4 и 12 из № 191;

2)  $\sqrt{f(x)} \geq g(x)$  и решите с помощью этой равносильности неравенство 7 из № 120.

## ! Контрольные вопросы и задания

- Приведите два примера равносильных и два примера неравносильных преобразований уравнений и неравенств.
- Проанализируйте формулы на с. 312 учебника с позиций равносильности—неравносильности их применения в преобразованиях уравнений и неравенств.

математике и в других областях науки и техники, а также в жизни человека. Самые распространенные из них — это квадратичные, кубические, полиномиальные, показательные, логарифмические, тригонометрические и др.

## ДОМАШНИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

### Контрольная работа № 1 (к п. 1—4) (90 мин)

#### I уровень

1. Является ли  $y$  функцией  $x$ , если:

1)  $y$  — число учеников вашего класса, посетивших урок математики, а  $x$  — число учеников вашего класса, подготовившихся к этому уроку;

2)  $y$  — число учеников вашего класса, посетивших школу, а  $x$  — соответствующее число сентября;

3)  $x$  — натуральное число, а  $y$  — число, квадрат которого равен  $x$ ;

4)  $x$  — натуральное число, а  $y$  — квадрат числа  $x$ ?

Является ли в этих примерах  $x$  функцией  $y$ ?

2. Функция  $y = f(x)$  задана своим графиком (рис. 125). Найдите по графику:

1) область определения функции;

2) область значений функции;

3) промежутки возрастания и убывания;

4) значение  $x$ , при котором значение функции равно 3;

5)  $f(-2)$ ;

6) нули функции;

7) наибольшее и наименьшее значение функции.

Задаёт ли этот график  $x$  как функцию  $y$ ?




Рис. 125

**3.** Постройте график какой-нибудь непрерывной функции  $y = f(x)$ , если:

$D(f) = (-4; 3]$ , её наибольшее значение равно 3, а наименьшее  $-2$ , функция убывает на промежутке  $(-4; 1]$ , а возрастает на промежутке  $[1; 3]$ .

**4.** Найдите область определения функции:

$$1) y = \sqrt{\frac{x^3 - x}{x^2 + 2x - 3}}; \quad 2) y = \sqrt{1 - x} + \sqrt{x + 3}.$$

**5.** Разрывна ли кусочно-заданная функция

$$y = \begin{cases} x^2, & \text{при } x \leq 1, \\ 2 - x, & \text{при } x > 1? \end{cases}$$

Постройте её график.

**6.** С помощью каких преобразований из графика функции  $y = \frac{1}{x}$  можно получить график дробно-линейной функции  $y = \frac{2x - 1}{x + 1}$ ? Постройте её график.

## II уровень

**7.** Определите с помощью графика, сколько корней имеет уравнение  $\sqrt{1 - x} - x^2 - x + 1 = 0$ .

**8.** Решите уравнение  $\sqrt{x + 6} + \sqrt{x - 5} = 11$ .

## III уровень

**9.** Найдите наибольшее значение функции

$$y = \frac{1}{\sqrt{2x^2 + 6x + 9}}.$$

**10.** Постройте график функции  $y = x^2 - 2|x| + 4$ .

## Контрольная работа № 2 (к п. 5–8) (60 мин)

### I уровень

**1.** Докажите нечётность функции

$$y = \sqrt{x^2 - 9} \cdot (x^5 - x).$$

**2.** Постройте в одной системе координат графики функции  $y = 3 - 2x$  и функции, ей обратной.

**3.** Решите уравнение:

$$1) \sqrt[5]{x^3 + 5} = 2; \quad 2) \sqrt{2x^2 + (4x - 5)} = x - 2.$$

**4.** Решите неравенство  $\frac{\sqrt[6]{11 + 9x - 2x^2}}{x - 3} \geq 0$ .

**5.** Сравните значение выражений  $\sqrt[6]{6}$  и  $\sqrt[4]{4}$ .

**6.** Сократите дробь:

$$1) \frac{a - \sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{a}}; \quad 2) \frac{b - 4x^{0,5}}{b^{0,5}x^{0,5} + 2x^{0,75}}.$$

## II уровень

**7.** Задайте аналитически функцию  $y = g(x)$ , обратную функции  $y = 3 - 2x$ .

**8.** Решите уравнение  $\sqrt{x+6} - \sqrt{x-2} = 2$ .

**9.** Решите неравенство  $\sqrt{3x+7} \geq x+1$ .

## III уровень

**10.** Упростите выражение

$$\left( (xy)^{\frac{1}{2}} - \frac{xy}{x + x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}}} \right) : \frac{x^{\frac{1}{4}}y^{\frac{1}{4}} - y^{\frac{1}{2}}}{x - y}.$$

## Контрольная работа № 3 (к п. 9—11) (90 мин)

### I уровень

**1.** Найдите  $a$ , если известно, что график функции  $y = a^x$  проходит через точку  $M(-0,25; 2)$ .

**2.** Решите уравнение:

$$1) \log_2 x - \log_{0,5} (x - 2) = 3; \quad 2) 11^{x+2} - 22 \cdot 11^x = 9.$$

**3.** Решите неравенство:

$$1) \frac{2^x - 0,25}{3+x} > 0; \quad 2) \log_{0,2} (x+3) > -2.$$

### II уровень

**4.** Решите уравнение:

$$1) 2^x + \frac{5}{2^{x-2}} - 9 = 0; \quad 2) x^{\log_3 x} = 81.$$

**5.** Решите неравенство:

$$1) \log_{x-2}(5-x) > 0; \quad 2) \left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{x+4}} > \left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{x^2+3x+4}}.$$

### III уровень

**6.** Решите неравенство  $\log_2(2+x) > 1-x$ .

**7.** 1) На сколько процентов возрастёт вклад в банке за два года, если банк ежемесячно начисляет 3%?

2) ■ Найдите сумму, которая окажется на вкладе через два года, если начальный вклад составил 10 000 р.

## Контрольная работа № 4 (к п. 12–20) (50 мин)

### I уровень

**1.** Переведите  $1,25\pi$  из радианной меры в градусную.

**2.** Переведите  $-150^\circ$  из градусной меры в радианную.

**3.** Постройте угол, косинус которого равен  $\frac{2}{3}$ . Выполните измерения с помощью транспортира и запишите общий вид углов, имеющих данный косинус.

**4.** Приведите к функциям углов от  $0^\circ$  до  $45^\circ$ :

$$1) \sin(-252^\circ); \quad 2) \cos 1130^\circ.$$

**5.** Используя график функции  $y = \sin x$ , укажите промежутки, на которых функция: 1) возрастает; 2) принимает положительные значения.

**6.** Найдите корни уравнения  $2 \sin(x-1) = -\sqrt{2}$ , принадлежащие промежутку  $[0; 2\pi]$ .

### II уровень

**7.** Для каких углов от  $0$  до  $2\pi$  выполняется неравенство  $\sin \varphi > \operatorname{tg} \varphi$ ?

**8.** Найдите угол, который образует с осью ординат прямая, пересекающая оси координат в точках  $A(-2; 0)$  и  $B(0; \sqrt{12})$ . 

### III уровень

**9.** Решите уравнение  $4 \cos^2 x - \cos x - 5 = 0$ .

**10.** Чему равен  $\arcsin(\sin 5)$ ?

**Контрольная работа № 5 (к п. 21—26) (60 мин)****I уровень**

1. Найдите  $\sin(\alpha + \beta)$ , если  $\sin \alpha = -\frac{5}{13}$ ,  $\sin \beta = \frac{4}{5}$ ,

$$\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2} \text{ и } \frac{\pi}{2} < \beta < \pi.$$

2. Вычислите  $\frac{\sin 70^\circ + \sin 20^\circ}{\cos 10^\circ \cos 15^\circ - \sin 10^\circ \sin 15^\circ}$ .

3. Докажите тождество  $\frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} + \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{2}{\sin \alpha}$ .

4. Найдите все корни уравнения  $2 \cos^2 x - \sin x - 1 = 0$ , принадлежащие отрезку  $[0; 2\pi]$ .

**II уровень**

5. Найдите абсциссы общих точек графиков функций  $y = \cos x$  и  $y = \cos 2x$ .

6. Можно ли утверждать, что если  $\alpha^\circ$  — острый угол, то  $\sin(\alpha^\circ + 1^\circ) > \sin \alpha^\circ$ ?

7. Вычислите:

$$\log_{0,1} \operatorname{ctg} 5^\circ + \log_{0,1} \operatorname{ctg} 15^\circ + \log_{0,1} \operatorname{ctg} 25^\circ + \dots \\ \dots + \log_{0,1} \operatorname{ctg} 75^\circ + \log_{0,1} \operatorname{ctg} 85^\circ.$$

**III уровень**

8. Докажите, что угол между прямыми  $y = 2x - 1$  и  $y = \frac{1}{3}x + 3$  равен  $45^\circ$ .

9. Решите уравнение:

$$\sin^2 x + \sin^2 2x + \sin^2 3x + \sin^2 4x = 2.$$

10. При каких значениях  $a$  наибольшее значение функции  $y = a \sin x + \cos x$  равно 5?

**Контрольная работа № 6 (к п. 27—28) (50 мин)****I уровень**

1. Эксперимент провели 1000 раз и в 5 из них произошло событие  $A$ .

- 1) Каким является событие  $A$ : вероятным, достоверным, невозможным или маловероятным?

2) Чему примерно равна вероятность события  $A$ .

2. Какова вероятность того, что при бросании двух игральных костей в сумме выпадет 10 очков?

3. Вычислите  $\frac{20!}{18!}$ .

## II уровень

4. Сколько существует пятизначных чисел:

1) составленных из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 7; 2) кратных 3?

5. Сколько разных составов может иметь комитет, состоящий из двух мужчин и трёх женщин, если его избирают из 5 мужчин и 7 женщин?

6. Упростите выражение  $\frac{1}{k!} - \frac{k^2 + k}{(k+2)!}$ .

## III уровень

7. Сколькими способами можно выбрать стартовую шестёрку баскетболистов из команды в 12 человек? Сколькими способами можно осуществить этот выбор, если Иванов и Петров обязательно должны входить в стартовый состав?

8. Найдите коэффициент члена 5-й степени многочлена стандартного вида, к которому приводится  $(2+x)^9$

## Итоговая контрольная работа (90 мин)

### I уровень

1. Найдите значение выражения  $81^{\frac{1}{4}} - 3\sqrt{3} \cdot 3^{\frac{1}{2}}$ .

2. Упростите выражение  $\frac{a^{\frac{2}{3}} - 16}{a^{\frac{1}{3}} - 4} - a^{\frac{1}{3}}$ .

3. Упростите выражение

$$2^{\log_2 7} + \log_5 75 - \log_5 3.$$

4. Решите неравенство

$$(0,25)^{x-3} < \frac{1}{16}.$$

5. Укажите промежутки возрастания и убывания функции  $y = f(x)$ , заданной графиком (рис. 126).




Рис. 126

**6.** Упростите выражение

$$\frac{\sin 2\alpha}{\sin \alpha} - \sin \left( \frac{\pi}{2} + \alpha \right).$$

**7.** Решите уравнение  $\log_2(x+1) = 4$ .

**8.** Найдите область определения функции

$$y = \sqrt{\frac{x-2}{x+1}}.$$

**9.** Решите уравнение  $2 \cos^2 x - 3 \sin x = 0$ .

## II уровень

**10.** Решите уравнение  $\sqrt{2x+7} + x = 2$ .

**11.** Найдите значение выражения  $\frac{\sin^2 27^\circ - \sin^2 63^\circ}{\sin 18^\circ \cdot \cos 18^\circ}$ .

**12.** Решите уравнение  $3 \cdot 9^x - 5 \cdot 6^x + 2 \cdot 4^x = 0$ .

**13.** Решите уравнение  $2 \sin^2 x = |\sin x|$ .

## III уровень

**14.** Найдите все значения  $a$ , при которых уравнение  $\log_2(4^x - a) = x$  имеет единственный корень.

**15.** Найдите наименьшее и наибольшее из значений, которые на отрезке  $[1; 4]$  принимает функция

$$y = -\frac{1}{\sqrt{2x^2 - 8x + 11}}.$$

## ОТВЕТЫ

### Глава 1

#### Функции и графики

2. 1) Нет; 2)  $y$  является функцией  $x$ , так как каждому числу  $x$  соответствует единственная цифра в разряде десятых (поскольку в математике не рассматривают записи типа  $0,9999\dots$ );  $x$  не является функцией  $y$ , так как одну и ту же цифру в разряде десятых могут иметь разные числа; 3)  $y$  не является функцией  $x$ , так как одна и та же сумма цифр может быть у разных двузначных чисел, например сумма цифр у чисел 25 и 34 равна 7;  $x$  является функцией  $y$ , так как каждому двузначному числу соответствует единственная сумма цифр.

3. 1)  $y = 300 - 50x$ . 2) Естественная область определения этой функции — множество действительных чисел, а реальная — натуральные числа от 1 до 6 включительно.

4. 1) а) 9; б) 0,5; 2) а)  $-7$ ; б) 0,25; 3) а) 22; б) 0 и  $-3$ ; 4) а) 26; б) 1 и  $-8$ .

5. 1)  $D(f) = \{10; 11; \dots; 98; 99\}$ ; 2)  $f(17) = 8$ ,  $f(35) = 8$ ,  $f(59) = 14$ ; 3)  $f(x) = 3$  при  $x = 30$ ,  $x = 21$  и  $x = 12$ ; 4)  $\max f(x) = f(99) = 18$ ,  $\min f(x) = f(10) = 1$ ; 5) 9 и 10.

6. Ответы приближённые. Рис. 3: 1)  $D(f) = [-3,5; 4,5]$ ; 2)  $E(f) = [-3; 4]$ ; 3)  $f(-2) = 2,8$ ; 4)  $f(-2,2) = 3$ ; 5)  $f(-0,25) = f(1,7) = 0$ ; 6)  $\max f(x) = 4$ ,  $\min f(x) = -3$ ; рис. 4: 1)  $D(f) = [-2,4; 6,5]$ ; 3)  $f(-2) = 3,2$ ; 4)  $f(-1,9) = f(1,5) = f(3,5) = 3$ ; 5)  $f(-1) = f(0,8) = f(5,8) = 0$ ; 6)  $\max f(x) = 6$ ,  $\min f(x) = -1,5$ ; рис. 5: 1)  $D(f) = [-3; 5,5]$ ; 3)  $f(-2) = 0$ ; 4)  $f(0,2) = f(2,5) = 3$ ; 5)  $f(-2) = f(3,9) = 0$ ; 6)  $\max f(x) = 4,5$ ,  $\min f(x) = -1$ ; рис. 6: 1)  $D(f) = [-3; 6]$ ; 3)  $f(-2) = 2,5$ ; 4)  $f(-1,7) = f(-0,2) = f(4,6) = 3$ ; 5)  $f(-2,8) = f(1) = f(3,8) = 0$ ; 6)  $\max f(x) = 5$ ,  $\min f(x) = -2,5$ .

7. 1)  $-0,7$  и  $2,6$ ; 2)  $2,7$ .

8. 3) Любое число, кроме 2 и  $-2$ ; 4) любое число, кроме 1 и 2; 5) любое число, кроме 1,  $-1$ , 2 и  $-2$ ; 6) любое число, кроме 3 и  $-3$ ; 7)  $x < 0$ ; 8)  $x > 0$ .

9. 1) а)  $x \geq 2$ ; б)  $x \geq 2$ ; в)  $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$ ; г)  $x > 2$ ; д)  $x \geq -3$ ; ж)  $x \geq -3$ ; з)  $[-5; 3]$ ; и)  $[2; 11] \cup (11; +\infty)$ ; к)  $[-3; 1] \cup (1; +\infty)$ .

**13.**  $V = 4x(5-x)^2$ ,  $D(V) = (0; 5)$ .

**14.**  $P = 8 - \frac{2x}{3}$ ,  $D(P) = (0; 3)$ ;  $E(P) = (6; 8)$ .

- 18.** 1) а)  $[-1; 0]$ ; б)  $[0; 0,5]$ ; в)  $[1; 2]$ ; г)  $[-1; 1]$ ; д)  $(-\infty; 0,5]$ ; е)  $[0; +\infty)$ ; ж)  $x > 0$ ; 2) а)  $[0; 1]$ ; б)  $[-0,5; 0]$ ; в)  $[0; 1]$ ; г)  $0$ ; д)  $(-\infty; 0]$ ; е)  $[-0,5; +\infty)$ ; ж)  $x > 0$ ; 3) а)  $[-2; 1]$ ; б)  $[-0,5; 1]$ ; в)  $[0; 3]$ ; г)  $[-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$ ; д)  $(-\infty; 1]$ ; е)  $[-0,5; +\infty)$ ; 4) а)  $[-2; -1]$ ; б)  $[0,5; 1]$ ; в)  $[2; 3]$ ; г)  $[-\sqrt{2}; -1] \cup [1; \sqrt{2}]$ ; д)  $[0,5; 1]$ ; е) функция не определена.

**19.** 1)  $N \subset Q$ ; 2)  $N \subset R_+$ ; 3)  $N \cap Z = N$ ; 4)  $R_+ \cap Z = N$ .

- 21.** 1)  $k = 0,3$ , а)  $l = 7$ ; б)  $l = 8$ ; в)  $l = 4,4$ ; г)  $l = 7,5$ ; 2)  $k = 0,75$ , а)  $l = -5$ ; б)  $l = 6$ ; 3)  $k = -\frac{3}{7}$ , а)  $l = 7$ ; б)  $l = \frac{9}{7}$ .

**23.** 1)  $k > 0$ ,  $l > 0$ ; 2)  $k < 0$ ,  $l > 0$ ; 3)  $k > 0$ ,  $l < 0$ ; 4)  $k < 0$ ,  $l < 0$ .

- 24.** 1) Да, при  $k = 0$ ,  $l > 0$ ; 2) да, при  $k < 0$ ,  $l = 0$ ; 3) да, при  $k = 0$ ,  $l < 0$ ; 4) да, при  $k > 0$ ,  $l = 0$ ; 5) нет, график функции  $y = kx + l$  не может быть параллелен оси ординат, поскольку при этом одному значению  $x$  соответствует более одного значения  $y$ ; 6) нет.

**25.** 1)  $y = -1,5x + 0,5$ ; 2)  $y = \frac{9}{5}x + \frac{2}{5}$ ; 3)  $y = 13,5$ .

- 26.** 1) а)  $(0; 9)$  и  $(-12; 0)$ ; б) принадлежит  $A$ , не принадлежат  $B$  и  $C$ . На графике есть точка с равными координатами; 2) а)  $(0; -8)$  и  $(-20; 0)$ ; б) принадлежит  $B$ , не принадлежат  $A$  и  $C$ . На графике есть точка с противоположными координатами.

**27.** 1)  $l = -21$ . Проходит; 2)  $l = 16$ . Не проходит.

**28.**

4	7,5	50
1,5	0,8	0,12

0,5	0,25	0,125
17,5	35	70

- 29.** 1)  $z = \frac{3}{x}$ ,  $z$  и  $x$  обратно пропорциональны; 2)  $z = \frac{2}{x}$ ,  $z$  и  $x$  обратно пропорциональны.

**30.** 1)  $k = 4$ ; 2)  $k = -18$ .

**31.** 1) Да; 2) да.

**32.** Принадлежат точки: 1)  $A$  и  $M$ ; 2)  $A, B, C$  и  $P$ .

**35.** 1) Две, одну или ни одной; 2) одну.

**37.** Областями определения.

**38.** Ошибки в а), г) и е).

**39.** 1)  $y = 0,5x$ ; 2)  $y = -0,5x - 1,5$ ; 3)  $y = 1,5$ .

**40.**  $y = \frac{1}{4}x^2$ .

**41.** 1)  $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 9$ ; 2)  $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 4$ .

- 42.** 1)  $(x-4)^2 + (y-4)^2 = 25$ ; 2)  $(x-a)^2 + (y-a)^2 = 25$ , где  $a$  — любое число; 3)  $(x-a)^2 + (y+a)^2 = 25$ , где  $a$  — любое число.

**46.** 1)  $(-\infty; -\frac{7}{5})$  и  $(-\frac{7}{5}; +\infty)$ ; 2)  $(-\infty; -3)$ ,  $(-3; 3)$  и  $(3; +\infty)$ ;

3)  $(-\infty; -2)$  и  $(-2; +\infty)$ ; 4)  $(-\infty; 1)$ ,  $(1; \frac{4}{3})$  и  $(\frac{4}{3}; +\infty)$ .

**47.** 1) 0; 3 и 5; 2)  $-7$ ;  $-2$  и 0.

**48.** 2) в) Разрыв при  $x = 1$ ; д) разрыв при  $x = 2$ ; е) разрыв при  $x = -2$  и при  $x = 1$ .

**50.** 5) Например,  $y = \frac{(x-2)(x-5)}{(x-2)(x-5)(x-9)}$ .

**52.** 1)  $(-8; 0) \cup (1; +\infty)$ ; 2)  $x \leq -3$ ,  $0 < x < 7$ ; 3)  $x < -3$ ,  $0 < x < \frac{2}{3}$ ,

$x > 7$ ; 4)  $-\frac{5}{3} \leq x \leq 3$ ; 5)  $x < -7$ ,  $-2,5 < x < 1$ ,  $x > 1$ ; 6)  $-1 \leq x \leq 0$ ,  $x = \frac{2}{3}$ .

**53.** 1)  $t \leq -\frac{3}{2}$ ,  $-\frac{2}{3} < t < -\frac{1}{3}$ ; 2)  $z < -3$ ,  $-\frac{1}{12} \leq z < \frac{5}{3}$ ; 3)  $x < -1$ ,  $-\frac{1}{3} < x < 1$ ; 4)  $y < -2$ ,  $-\frac{19}{17} \leq y < 3$ .

**54.** 1)  $x < -2$ ; 2)  $x = -2$ ,  $x \geq 2$ .

**55.** Рис. 3: функция возрастает на промежутке  $[1; 3]$ , убывает на промежутках  $[-3, 5; 1]$  и  $[3; 4,5]$ ; рис. 4: функция возрастает на промежутке  $[0; 2]$ , убывает на промежутках  $[-2, 5; 0]$  и  $[2; 6,5]$ ; рис. 5: функция возрастает на промежутке  $[-2; 1,5]$ , убывает на промежутках  $[-3; -2]$  и  $[1,5; 5,5]$ ; рис. 6: функция возрастает на промежутках  $[-3; -1]$  и  $[2,5; 6]$ , убывает на промежутке  $[-1; 2,5]$ ; рис. 7: функция возрастает на промежутке  $[-4,5; 1,5]$ , убывает на промежутке  $[1,5; 5]$ ; рис. 8: функция возрастает на промежутках  $[-3; -2]$  и  $[0; 6]$ , убывает на промежутке  $[-2; 0]$ .

**59.** Возрастающими являются функции 1), 4), 5), 9); убывающая — 2, 8.

**64.** 1) 4; 2) 10.

**65.** 1) 7; 2) 25.

**68.** 1) а)  $\frac{3}{2} < k \leq 2$ ; б)  $\frac{2}{3} \leq k < \frac{3}{4}$ ; в)  $\frac{3}{2} < k \leq 2$ ,  $\frac{2}{3} \leq k < \frac{3}{4}$ ;

2) а)  $\frac{2}{7} \leq k < \frac{2}{5}$ ; б)  $-2 < k \leq -\frac{2}{3}$ ; в)  $\frac{2}{7} \leq k < \frac{2}{5}$ ,  $-2 < k \leq -\frac{2}{3}$ .

**69.** 1)  $(0; 6)$ ; 2)  $(0; -2)$ ; 3)  $(2; -3)$ ; 4)  $(-3; 14)$ ; 5)  $(2; 11)$ ; 6)  $(-2; 11)$ ; 7)  $(2,5; -12,5)$ ; 8)  $(-7; -24,5)$ .

**74.** 2) а)  $x_0 > 0$  и  $y(0) > 0$ ; б)  $x_0 < 0$  и  $y(0) > 0$ ; в)  $x_0 > 0$  и  $D = 0$ ;  $x_0 > 0$  и  $y(0) = 0$ ;  $y(0) < 0$ ; г)  $x_0 < 0$  и  $D = 0$ ;  $x_0 < 0$  и  $y(0) = 0$ ;  $y(0) < 0$ ; д)  $-1 < x_0 < 2$ ,  $y(-1) \leq 0$ ,  $y(2) \geq 0$ ,  $D > 0$ .

**75.** 1) а)  $k > 4,5$ ; б)  $k = 4,5$ ; в) таких значений  $k$  нет; 2) а)  $k < -0,8$ ; б)  $k = -0,8$ ; в) таких значений  $k$  нет.

**76.**  $a > 0$ .

**77.** 1)  $0 < a < 1$ ; 2)  $a = 2$ ,  $a \leq 1$ .

**78.** 1) — Да.

79. 1)  $\sqrt{53}$  и  $\sqrt{34}$ ; 2)  $\sqrt{2,5}$  и  $\sqrt{0,5}$ ; 3)  $\frac{12}{\sqrt{7}}$  и 3; 4)  $-\frac{6}{\sqrt{14}}$  и  $-\frac{6}{\sqrt{5}}$ .

80.  $S = 4x - \frac{4x^2}{3}$ ,  $D(S) = (0; 3)$ ,  $E(S) = (0; 3]$ .

81. Уравнения асимптот: 2) в)  $y = 2$ ,  $x = -1$ ; г)  $y = -3$ ,  $x = 1$ .

84. 1)  $y = f(-x + 6)$ ; 2)  $y = -f(x) - 10$ ; 3)  $y = f(-|x|)$ ; 4)  $|y| = -f(x)$ ;  
5)  $y = -f(-x - 6) + 10$ ; 6)  $|y| = -f(-|x|)$ .

## Глава 2

### Степени и корни

87. Существует для точек А, В и С.

88. 1)  $n = 2$ ; 2)  $n = 3$ ; 3)  $n = 3$ ; 4)  $n = 4$  или  $n = 2$ ; 5)  $n = 2$  или  $n = 4$ ;  
6)  $n = 2$ ,  $n = 3$ ,  $n = 6$ ; 7)  $n = 3$ .

89. 1) I, III; 2) I, II; 3) I, II, III; 4) I, II; 5) I, III, IV; 6) I, II.

90. 1) Да, например:  $a = 0$ ,  $b = -1$  и  $n = 2$ ; 2) нет.

91. 1) а) I, II; б) I, II, (III), IV; в) I, II; г) I, II, III, (IV); д) I, (II), III, IV; е) III, IV; ж) (I), II, III, IV; з) III, IV. (В скобках указаны четверти, через которые график может пройти лишь при некоторых значениях  $k$ ,  $a$  и  $b$ .) 2) а) I, II, III или I, III, IV; б) I, III, IV; в) I, II, III; г) I, II, III или I, III, IV; д) I, II, IV; е) I, II, IV или II, III, IV; ж) II, III, IV или I, II, IV; з) II, III, IV.

92. Чётным: 1), 2); нечётным: 3), 4); нельзя определить: 5), 6).

93. 1)  $m < n$ ; 2)  $m > n$ ; 3)  $m > n$ ; 4)  $m < n$ ; 6) нельзя определить.

94. 1) а) Симметрией относительно оси абсцисс; б) сжатием в 5 раз к оси абсцисс. Все три функции имеют одинаковую чётность.

97. 1) а) Нечётная; б) чётная; в) нечётная; г) ни чётная, ни нечётная. Точку разрыва имеют функции в) и г).

98. 1)  $y = (4x^6 - 4) + (5x)$ ; 2)  $y = \left( \frac{|x|}{x^6 - 1} \right) + \left( \frac{-2x^3}{x^6 - 1} \right)$ .

99. а) Нет; б) нечётными являются произведение и частное чётной и нечётной функций.

100. 1) а)  $y = -(|x| - 2)^2 + 5$ , при  $x \neq 0$ . 2) Функция возрастает на промежутках  $(-\infty; -2]$  и  $(0; 2]$ , убывает на промежутках  $[-2; 0]$  и  $[2; +\infty)$  и имеет разрыв в точке 0.

б)  $y = \begin{cases} 5 - (x - 2)^2, & \text{при } x > 0, \\ (x + 2)^2 - 5, & \text{при } x < 0 \end{cases}$  или  $y = \frac{|x|}{x} (5 - (|x| - 2)^2)$ . Функция возрастает на промежутках  $[-2; 0)$  и  $(0; 2]$ , убывает на промежутках  $(-\infty; -2]$  и  $[2; +\infty)$  и разрывна в точке 0.

101. 1) Нет.

102. 1)—4) Да.

103. 2)  $\sqrt[3]{16}$ ; 3)  $-\sqrt[5]{43}$ ; 6) 0; 7) 1,5; 8) -2; -0,8; 9) 0; 1; 4; 5;

10) 0; 1; 8; 9.

107. 1)—3) Принадлежит.

108. 1) Такого  $n$  не существует; 2)  $n = 7$ .

**109.** 1) 2; 2) 3; 3) 3; 4) 2 и 4; 5) 2 и 4; 6) 2, 3 и 6; 7) 2, 5 и 10.

**110.** 1)  $m > n$ ; 2)  $m < n$ ; 3)  $m < n$ ; 4)  $m > n$ .

**111.** 1)  $y = x$ ; 6)  $y = \frac{1}{x}$ ; в)  $y = 0,5x + 0,5$ ; г)  $y = 7,5 - 1,5x$ .

**113.** 1), 2), 5), 6), 7) Да; 3), 4), 8) нет.

**114.** 1)  $-\sqrt[3]{7}$ ; 2)  $-\sqrt[5]{6}$ ; 3)  $-\sqrt[5]{\sqrt{2} - 1}$ ; 5)  $-\sqrt[9]{1 + a^2}$ ;

6)  $-\sqrt[5]{4 - 4(b + b^2)}$ ; 8)  $-\sqrt[9]{c^2 - 5c + 7}$ .

**115.** 1)  $x \geq 0$ ; 2)  $x$  — любое число; 3)  $x \neq 0$ ; 4)  $x \geq 2,5$ ; 5) при всех  $x$ ; 6)  $-5 \leq x \leq 5$ ; 7)  $x \leq -\frac{1}{2}$ ; 8)  $x \geq \frac{1}{2}$ ; 9)  $-4 \leq x \leq 24$ .

**116.** 1)  $x < 0$ ,  $x = 16$ ; 2)  $x = -243$ ; 3)  $x < 0$ ,  $x = 2$ ; 4)  $x \leq -3$ ,  $x = 3$ ; 5)  $-5 < x < 5$ ,  $x = -13$ ; 6)  $x < -7$ ,  $x > 7$ ,  $x = -3$ .

**117.** 1)  $\frac{16}{81}$ ; 2)  $\frac{1}{32}$ ; 3)  $-0,4992$ ; 4)  $0,3568$ ; 5)  $-5$  и  $5$ ; 6)  $-4$ .

**118.** 1)  $-1$ ;  $-2,5$ ; 2) нет корней; 3) 1; 4)  $-2$ ; 5)  $6,25$ ; 6)  $4; 9$ ; 7)  $-1$ ; 8)  $-1$ .

**119.** 1)  $\left(-\infty; \frac{3}{4}\right) \cup (4; 7]$ ; 2)  $x = -8,5$ ,  $-3 < x \leq 1$ .

**120.** 1)  $4 < x < 5$ ; 2)  $-7,5 \leq x \leq 5$ ; 3)  $0 < x < 1$ ; 4)  $x \geq 6$ ; 5)  $x \geq 4$ ; 6)  $1 \leq x \leq 2,6$ ; 7)  $x \leq -\frac{1}{5}$ ,  $0 \leq x \leq \frac{7 + \sqrt{33}}{8}$ ; 8)  $x < -1$ ,  $x > \frac{4}{9}$ .

**122.** 1) 45; 2) 2,8; 3)  $\frac{5}{6}$ ; 4) 6; 5) 20; 6)  $\frac{3}{5}$ ; 7) 15; 8) 12; 9) 4,4; 10) 2; 11) 3; 12) 1.

**123.** 1)  $2^{11}\sqrt{2}$ ; 2)  $8^4\sqrt{8}$ ; 3)  $a^3\sqrt{a}$ ; 4)  $b^2 \cdot 4\sqrt{b}$ ; 5)  $ab^2 \cdot 5\sqrt{ab}$ ; 6)  $2x^5b^3 \cdot 3\sqrt{4xb}$ ; 7)  $-a^4\sqrt{-a}$ ; 8)  $2a^2b^2 \cdot 6\sqrt{-2ab^2}$ .

**124.** 1)  $\sqrt{2}$ ; 2)  $\sqrt{3}$ ; 3)  $3\sqrt{2a^2}$ ; 4)  $10\sqrt{2b^2}$ ; 5)  $\sqrt{4x}$ ; 6)  $3\sqrt{2|a|}$ ; 7)  $\sqrt{\sqrt{5} - 2}$ ; 8)  $3\sqrt{5 - (2)\sqrt{6}}$ .

**125.** 1)  $6\sqrt{a}$ ; 2)  $\sqrt{a}$ ; 3)  $3\sqrt{a^2}$ ; 4)  $\sqrt{b}$ ; 5)  $3\sqrt{\frac{1}{x^2}}$ ; 6)  $3\sqrt{\frac{1}{a^2}}$ .

**126.** 1)  $\sqrt{3} > 3\sqrt{5} > 4\sqrt{8}$ ; 2)  $\sqrt{2} < 3\sqrt{3} < 4\sqrt{5}$ ; 3)  $\sqrt{3^3\sqrt{3}} > 3\sqrt{3\sqrt{3}}$ ; 4)  $4\sqrt{8\sqrt{2}} = \sqrt{2^4\sqrt{8}}$ .

**127.** 1)  $6\sqrt{2}$ ; 2)  $12\sqrt{\frac{1}{48}}$ ; 3)  $24\sqrt{\frac{3}{8}}$ ; 4)  $12\sqrt{50}$ ; 5)  $12\sqrt{0,1}$ ; 6)  $20\sqrt{160}$ .

**128.** 1)  $-7$ ; 2)  $-2$ ; 3)  $-4$ ; 4)  $-5$ ; 2; 5)  $3\sqrt{80}$ ; 6)  $8$ ; 27.

**129.** 2) а)  $\sqrt{5}$ ; б)  $2\sqrt{5}$ .

**130.** 1) 7; 2) 4,7.

**131.** 1) 0; 2)  $-18$ ; 17.

- 132.** 1)  $x_1 = 1, y_1 = 9; x_2 = 9, y_2 = 1$ ; 2)  $x_1 = 1, y_1 = 4; x_2 = 4, y_2 = 1$ ;  
 3)  $x_1 = 1, y_1 = 27; x_2 = 27, y_2 = 1$ ; 4)  $x_1 = 1, y_1 = 64; x_2 = 64, y_2 = 1$ .

**133.** 1)  $a \leq 0$ ; 2)  $a < 2, a = \frac{9}{4}$ .

**134.** 1)  $\sqrt[30]{\frac{1}{b}}$ ; 2)  $\sqrt[12]{\frac{a^2}{9b}}$ ; 3)  $\sqrt[6]{2ab}$ ; 4)  $\sqrt[10]{\frac{ax}{2}}$ ; 5)  $\sqrt[4]{a^3}$ ; 6)  $\sqrt[60]{\frac{1}{x}}$ .

**135.** 1)  $-1$ ; 2)  $-1$ .

- 137.** 1)  $x^{\frac{1}{3}}$ ; 2)  $y^{\frac{1}{4}}$ ; 3)  $a^{\frac{3}{5}}$ ; 4)  $b^{\frac{5}{6}}$ ; 5)  $|a|^{\frac{2}{7}} b^{\frac{3}{7}}$ ; 6)  $b^{\frac{1}{3}} |c|^{\frac{2}{3}}$ ; 7)  $2^{-\frac{1}{7}} a^{\frac{5}{7}} |b|^{-\frac{4}{7}}$ ;  
 8)  $3^{-\frac{1}{7}} |c|^{\frac{3}{7}} x^{-\frac{5}{7}}$ ; 10)  $(-a)^{\frac{3}{2}}$ .

- 138.** 1)  $\sqrt[7]{a^2}$ , где  $a > 0$ ; 3)  $\sqrt[4]{\frac{1}{x^3}}$ ; 4)  $\sqrt{\frac{1}{a}}$ ; 5)  $\sqrt[3]{c^5}$ ; 6)  $\sqrt{\frac{1}{b^3}}$ ; 7)  $\sqrt[10]{\frac{a^6}{b^7}}$ , где  
 $a > 0$ ; 8)  $\sqrt[10]{\frac{1}{x^8 y^9}}$ , где  $x > 0$ ; 12)  $\sqrt[3]{(x + 2y)^2}$ , где  $x + 2y > 0$ .

**139.** 1)  $x^{\frac{3}{4}}$ ; 2)  $y^{\frac{9}{28}}$ ; 3)  $y^{\frac{13}{36}}$ ; 4)  $b^{\frac{7}{30}}$ ; 5)  $a^2$ ; 6)  $x^{-2}$ ; 7)  $b^{\frac{2}{3}}$ ; 8)  $c^{\frac{1}{2}}$ .

- 140.** 3) 27; 4)  $\frac{1}{25}$ ; 5) 100; 6) 1000; 7)  $\frac{16}{9}$ ; 8)  $\frac{8}{27}$ ; 9) 9; 10) 2; 11)  $\sqrt{3}$ ;  
 12)  $\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$ .

- 141.** 1) а)  $2^{-2}$ ; б)  $2^{-5}$ ; в)  $2^{0.8}$ ; г)  $2^{-0.9}$ ; д)  $2^{3.5}$ ; 2) а)  $(\sqrt{2})^{-4}$ ; б)  $(\sqrt{2})^{-10}$ ;  
 в)  $(\sqrt{2})^{1.6}$ ; г)  $(\sqrt{2})^{-1.8}$ ; д)  $(\sqrt{2})^7$ ; 3) а)  $4^{-1}$ ; б)  $4^{-2.5}$ ; в)  $4^{0.4}$ ; г)  $4^{-0.45}$ ;  
 д)  $4^{1.75}$ ; 4) а)  $(0.125)^{\frac{2}{3}}$ ; б)  $(0.125)^{\frac{5}{3}}$ ; в)  $(0.125)^{-\frac{4}{15}}$ ; г)  $(0.125)^{0.3}$ ;  
 д)  $(0.125)^{-\frac{7}{6}}$ ; 5) а)  $(\sqrt[3]{4})^{-3}$ ; б)  $(\sqrt[3]{4})^{-7.5}$ ; в)  $(\sqrt[3]{4})^{1.2}$ ; г)  $(\sqrt[3]{4})^{-1.35}$ ;  
 д)  $(\sqrt[3]{4})^{5.25}$ .

- 142.** 1) а)  $\left(\frac{1}{3}\right)^4$ ; б)  $\left(\frac{1}{3}\right)^{-4}$ ; в)  $\left(\frac{1}{3}\right)^{-\frac{2}{5}}$ ; г)  $\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{5}{7}}$ ; д)  $\left(\frac{1}{3}\right)^{-3.5}$ ;  
 2) а)  $(\sqrt[3]{9})^{-6}$ ; б)  $(\sqrt[3]{9})^6$ ; в)  $(\sqrt[3]{9})^{\frac{3}{5}}$ ; г)  $(\sqrt[3]{9})^{-\frac{15}{14}}$ ; д)  $(\sqrt[3]{9})^{5.25}$ ; 3) а)  $3^{-4}$ ;  
 б)  $3^4$ ; в)  $3^{\frac{2}{5}}$ ; г)  $3^{-\frac{5}{7}}$ ; д)  $3^{3.5}$ ; 4) а)  $\left(\frac{1}{27}\right)^{\frac{4}{3}}$ ; б)  $\left(\frac{1}{27}\right)^{-\frac{4}{3}}$ ; в)  $\left(\frac{1}{27}\right)^{-\frac{2}{15}}$ ;  
 г)  $\left(\frac{1}{27}\right)^{\frac{5}{21}}$ ; д)  $\left(\frac{1}{27}\right)^{-\frac{7}{6}}$ ; 5) а)  $(\sqrt[5]{81})^{-5}$ ; б)  $(\sqrt[5]{81})^5$ ; в)  $(\sqrt[5]{81})^{\frac{1}{2}}$ ;  
 г)  $(\sqrt[5]{81})^{-\frac{25}{28}}$ ; д)  $(\sqrt[5]{81})^{\frac{35}{8}}$ .

**143.** 1)  $(a^{0,5})^2$ ; 2)  $(y^{1,5})^2$ ; 3)  $\left(x^{\frac{1}{3}}\right)^2$ ; 4)  $\left(b^{-\frac{1}{5}}\right)^2$ ; 5)  $(2c^{0,5})^2$ ; 6)  $(5a^{0,5})^2$ ; 7)  $(8x^{0,5}y^{0,25})^2$ ; 8)  $\left(3b^{\frac{1}{6}}c^{\frac{1}{2}}\right)^2$ .

**144.** 1)  $\left(p^{\frac{1}{3}}\right)^3$ ; 2)  $\left(a^{\frac{2}{3}}\right)^3$ ; 3)  $\left(a^{\frac{1}{4}}\right)^3$ ; 4)  $\left(b^{-\frac{1}{7}}\right)^3$ ; 5)  $\left(2z^{\frac{1}{3}}\right)^3$ ; 6)  $\left(3x^{\frac{1}{3}}\right)^3$ ; 7)  $\left(5a^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{9}}\right)^3$ ; 8)  $\left(10b^{\frac{1}{6}}c^{\frac{1}{3}}\right)^3$ .

**145.** 1)  $4a^{\frac{2}{3}} + 12a^{\frac{3}{4}}b^{\frac{1}{2}} + 9b$ ; 3)  $b^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{6}}$ ; 4)  $x^{\frac{3}{2}} - x + x^{\frac{1}{2}} - 1$ ; 5)  $c^{\frac{5}{6}} - c^{-\frac{5}{6}}$ ; 6)  $a + a^{\frac{1}{2}}b^{-\frac{1}{3}} - a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}} - 1$ ; 7)  $z^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{1}{3}}$ ; 8)  $a + b$ ; 9)  $x^{-\frac{6}{5}} - y^{\frac{1}{2}}$ .

**146.** 1)  $\left(10^{\frac{1}{2}}\right)^2 - \left(a^{\frac{1}{2}}\right)^2 = \left(10^{\frac{1}{2}} - a^{\frac{1}{2}}\right)\left(10^{\frac{1}{2}} + a^{\frac{1}{2}}\right)$ ;

2)  $\left(b^{\frac{1}{2}}\right)^2 - \left(7^{\frac{1}{2}}\right)^2 = \left(b^{\frac{1}{2}} - 7^{\frac{1}{2}}\right)\left(b^{\frac{1}{2}} + 7^{\frac{1}{2}}\right)$ ;

3)  $\left(a^{\frac{3}{2}}\right)^2 - 5^2 = \left(a^{\frac{3}{2}} - 5\right)\left(a^{\frac{3}{2}} + 5\right)$ ;

4)  $(x^2)^2 - \left(y^{\frac{3}{2}}\right)^2 = \left(x^2 - y^{\frac{3}{2}}\right)\left(x^2 + y^{\frac{3}{2}}\right)$ ;

5)  $\left(a^{\frac{1}{4}}\right)^2 - 3^2 = \left(a^{\frac{1}{4}} - 3\right)\left(a^{\frac{1}{4}} + 3\right)$ ; 6)  $5^2 - \left(b^{\frac{1}{6}}\right)^2 = \left(5 - b^{\frac{1}{6}}\right)\left(5 + b^{\frac{1}{6}}\right)$ ;

7)  $\left((3x)^{\frac{1}{2}}\right)^2 - \left(y^{-\frac{1}{8}}\right)^2 = \left((3x)^{\frac{1}{2}} - y^{-\frac{1}{8}}\right)\left((3x)^{\frac{1}{2}} + y^{-\frac{1}{8}}\right)$ ;

8)  $\left(p^{\frac{1}{10}}\right)^2 - \left((3q)^{\frac{1}{3}}\right)^2 = \left(p^{\frac{1}{10}} - 3q^{\frac{1}{2}}\right)\left(p^{\frac{1}{10}} + 3q^{\frac{1}{2}}\right)$ ;

9)  $(x^{0,7})^2 - \left(28^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}}\right)^2 = \left(x^{0,7} - 28^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}}\right)\left(x^{0,7} + 28^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}}\right)$ .

**147.** 1)  $2^3 - \left(a^{\frac{1}{3}}\right)^3 = \left(2 - a^{\frac{1}{3}}\right)\left(4 + 2a^{\frac{1}{3}} + a^{\frac{2}{3}}\right)$ ;

2)  $\left(b^{\frac{1}{3}}\right)^3 + 3^3 = \left(b^{\frac{1}{3}} + 3\right)\left(b^{\frac{2}{3}} - 3b^{\frac{1}{3}} + 9\right)$ ;

3)  $\left(10x^{\frac{1}{3}}\right)^3 - \left(3^{\frac{1}{3}}\right)^3 = \left(10x^{\frac{1}{3}} - 3^{\frac{1}{3}}\right)\left(100x^{\frac{2}{3}} + 10x^{\frac{1}{3}} \cdot 3^{\frac{1}{3}} + 3^{\frac{2}{3}}\right)$ ;

4)  $5^3 + \left(2^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{3}}\right)^3 = \left(5 + 2^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{3}}\right)\left(25 - 5 \cdot 2^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{3}} + 2^{\frac{2}{3}}y^{\frac{2}{3}}\right)$ ;

5)  $\left(a^{\frac{1}{6}}\right)^3 + 2^3 = \left(a^{\frac{1}{6}} + 2\right)\left(a^{\frac{1}{3}} - 2a^{\frac{1}{6}} + 4\right)$ ;

6)  $4^3 - \left(b^{\frac{1}{9}}\right)^3 = \left(4 - b^{\frac{1}{9}}\right)\left(16 + b^{\frac{1}{9}} + b^{\frac{2}{9}}\right)$ ;

$$7) \left(x^{\frac{1}{6}}\right)^3 - \left(z^{\frac{1}{12}}\right)^3 = \left(x^{\frac{1}{6}} - z^{\frac{1}{12}}\right) \left(x^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{1}{6}}z^{\frac{1}{12}} + z^{\frac{1}{6}}\right);$$

$$8) \left(b^{\frac{1}{18}}\right)^3 + \left(2c^{\frac{1}{6}}\right)^3 = \left(b^{\frac{1}{18}} + 2c^{\frac{1}{6}}\right) \left(b^{\frac{1}{9}} - 2b^{\frac{1}{18}}c^{\frac{1}{6}} + 4c^{\frac{1}{3}}\right).$$

$$148. 3) \frac{1}{1-a^{-\frac{1}{2}}}; 4) \frac{1-a^{-\frac{1}{2}}}{1-a^{-\frac{5}{6}}}.$$

$$149. 1) -\frac{a^{\frac{1}{2}}}{b^{\frac{1}{2}}}; 2) \frac{x^{\frac{1}{3}}}{y^{\frac{1}{3}}}; 3) \frac{a^{\frac{1}{2}}+x^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}}}; 4) \frac{3^2b^{\frac{1}{2}}}{3^{\frac{1}{2}}-b^{\frac{1}{2}}}; 5) a^{\frac{1}{2}}+5; 6) \frac{-1}{x^{\frac{1}{2}}+2y^{\frac{1}{2}}};$$

$$7) \frac{3}{a^{\frac{1}{4}}-6}; 8) \frac{y^{\frac{1}{3}}+x^{\frac{1}{3}}}{y^{\frac{1}{3}}-x^{\frac{1}{3}}}.$$

150. 1) а) 2,8; б) 0,75; в) 13; г) 29; д) 1; е) 2.

$$151. 1) \frac{c^{\frac{1}{3}}-1}{c^{\frac{1}{3}}+1}; 2) \frac{y^{\frac{2}{3}}+1}{y^{\frac{1}{3}}}; 3) -b^{\frac{1}{4}} \left(x^{\frac{1}{4}}+b^{\frac{1}{4}}\right); 4) -10.$$

$$152. 1) -1; 2) -\frac{4}{3}.$$

153. 1)  $a < 1$ ; 2)  $a \geqslant 2$ .

### Глава 3

#### Показательная и логарифмическая функции

155. Принадлежат.

$$158. 1) 4; 2) 4; 3) -2; 4) -3; 5) -\frac{2}{3}; 6) 1,2; 7) 2,75; 8) \frac{3}{4}.$$

$$159. 1) 9; 2) \sqrt{5}.$$

160. 1) —2) Проходит.

$$163. 1) \frac{2b\sqrt{5}}{a^{\sqrt{3}}-b^{\sqrt{5}}}; 2) \frac{1}{a^{\frac{\sqrt{3}}{3}}+b^{\frac{\sqrt{5}}{3}}}.$$

$$164. \sqrt{21}.$$

165. 1) Чётная; 2) нечётная.

$$167. 1) \frac{1}{4}; 2) 2,5; 3) 3; 4) -\frac{11}{8}; 5) 9; 6) \text{нет корней}; 7) 7; 8) 4.$$

$$168. 1) -1; 2) 3; 3) 1; 4) 4; 5) -1; 6) -2; 7) 1,5; 8) 1,5.$$

$$169. 1) 0; 3) -2; 3) 4; 4) -1; 1; 5) 0; 6) 6.$$

$$170. 1) x = y = -2; 2) x = \frac{18}{19}, y = -\frac{30}{19}; 3) x = 4, y = 3;$$

$$4) u_1 = v_1 = -4, u_2 = v_2 = 3.$$

**171.** 1)  $x < -4$ ; 2)  $x < 6$ ; 3)  $x > 0$ ; 4)  $x \geq 0$ ; 5)  $x < -3$ ,  $x > -1$ ; 6)  $x < -1$ ,  $4 \leq x < 5$ ; 7)  $x \leq 2$ ; 8)  $x < 0$ ,  $x \geq 1$ ; 9)  $x < 1$ ; 10)  $x > 2$ .

**172.** 1)  $x \leq 0$ ,  $x \geq 3$ ; 2)  $x < -2$ .

**173.** 1)  $a > 1$  и  $a \neq 2$ ; 2) ни при каких; 3)  $a \leq 1$ ,  $a = 2$ .

**174.** 1)  $(1,03^x - 1) \cdot 100\%$ ; 2)  $\approx 42,6\%$ .

**175.** 1) а) 2; б) 4; в) 3; г) -3; д) -3; е) 0,25; ж) -6; 2) а) 2; б) 3; в) 3; г) -2; д) -4; е)  $\frac{1}{6}$ ; ж) -9.

**176.** 1) а)  $\log_2 2$ ; б)  $\log_2 4$ ; в)  $\log_2 8$ ; г)  $\log_2 1$ ; д)  $\log_2 0,5$ ; е)  $\log_2 0,25$ ; ж)  $\log_2 0,125$ ; з)  $\log_2 \sqrt{2}$ ; и)  $\log_2 \sqrt[3]{2}$ ; к)  $\log_2 \frac{1}{\sqrt{2}}$ ; л)  $\log_2 \sqrt[3]{4}$ ;

2) а)  $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2}$ ; б)  $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{4}$ ; в)  $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{8}$ ; г)  $\log_{\frac{1}{2}} 1$ ; д)  $\log_{\frac{1}{2}} 2$ ; е)  $\log_{\frac{1}{2}} 4$ ;

ж)  $\log_{\frac{1}{2}} 8$ ; з)  $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{2}}$ ; и)  $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ ; к)  $\log_{\frac{1}{2}} \sqrt{2}$ ; л)  $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt[3]{4}}$ ;

3) а)  $\log_{\frac{2}{3}} \frac{2}{3}$ ; б)  $\log_{\frac{2}{3}} \frac{4}{9}$ ; в)  $\log_{\frac{2}{3}} \frac{8}{27}$ ; г)  $\log_{\frac{2}{3}} 1$ ; д)  $\log_{\frac{2}{3}} \frac{3}{2}$ ; е)  $\log_{\frac{2}{3}} \frac{9}{4}$ ;

ж)  $\log_{\frac{2}{3}} \frac{27}{8}$ ; з)  $\log_{\frac{2}{3}} \sqrt{\frac{2}{3}}$ ; и)  $\log_{\frac{2}{3}} \sqrt[3]{\frac{2}{3}}$ ; к)  $\log_{\frac{2}{3}} \sqrt[3]{\frac{3}{2}}$ ; л)  $\log_{\frac{2}{3}} \sqrt[3]{\frac{4}{9}}$ ;

4) а)  $\log_4 4$ ; б)  $\log_4 16$ ; в)  $\log_4 64$ ; г)  $\log_4 1$ ; д)  $\log_4 0,25$ ; е)  $\log_4 \frac{1}{16}$ ;

ж)  $\log_4 \frac{1}{64}$ ; з)  $\log_4 2$ ; и)  $\log_4 \sqrt[3]{4}$ ; к)  $\log_4 \frac{1}{2}$ ; л)  $\log_4 \sqrt[3]{16}$ ; 5) а)  $\log_{\frac{1}{27}} \frac{1}{27}$ ;

б)  $\log_{\frac{1}{27}} \frac{1}{729}$ ; в)  $\log_{\frac{1}{27}} \frac{1}{27^3}$ ; г)  $\log_{\frac{1}{27}} 1$ ; д)  $\log_{\frac{1}{27}} 27$ ; е)  $\log_{\frac{1}{27}} 729$ ;

ж)  $\log_{\frac{1}{27}} 27^3$ ; з)  $\log_{\frac{1}{27}} \frac{1}{\sqrt{27}}$ ; и)  $\log_{\frac{1}{27}} \frac{1}{3}$ ; к)  $\log_{\frac{1}{27}} \sqrt{27}$ ; л)  $\log_{\frac{1}{27}} \frac{1}{9}$ ;

6) а)  $\log_{x+1} (x+1)$ ; б)  $\log_{x+1} (x+1)^2$ ; в)  $\log_{x+1} (x+1)^3$ ; г)  $\log_{x+1} 1$ ;

д)  $\log_{x+1} \frac{1}{x+1}$ ; е)  $\log_{x+1} \frac{1}{(x+1)^2}$ ; ж)  $\log_{x+1} \frac{1}{(x+1)^3}$ ;

з)  $\log_{x+1} \sqrt{x+1}$ ; и)  $\log_{x+1} \sqrt[3]{x+1}$ ; к)  $\log_{x+1} \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ ;

л)  $\log_{x+1} \sqrt[3]{(x+1)^2}$ .

**177.** 1) 2; 2)  $\frac{1}{3}$ ; 3)  $\sqrt[6]{5}$ ; 4)  $\frac{1}{\sqrt[3]{7}}$ .

**178.** 1) 1; 2)  $\frac{70}{9}$ ; 3) -2; 5; 4) 1; -6; 5)  $-\frac{2}{3}$ ; 8; 6)  $\frac{3}{2}; \frac{5}{2}$ .

**179.** 1)  $\log_2 5$ ; 2)  $\log_{0,5} 7$ ; 3)  $\log_5 2 - 1$ ; 4)  $\log_{\frac{1}{7}} 3$ .

**180.** 1)  $x < \log_{\frac{1}{2}} 3$ ; 2)  $x < \log_3 256$ ; 3)  $x > \log_{3-\sqrt{3}} 6$ ;

4)  $x \geqslant \log_{\sqrt{15}-3} 6$ .

**183.** 1)  $\log_8 \frac{7}{8} > \log_8 \frac{6}{7} > \log_7 \frac{6}{7}$ ; 2)  $\log_8 \frac{9}{8} < \log_8 \frac{8}{7} < \log_7 \frac{8}{7}$ .

**184.** 1)  $x < -1$ ,  $x > -\frac{3}{7}$ ; 2)  $-\frac{7}{17} < x < 1$ ; 3)  $-\frac{3}{2} < x < 1$ ,  $1 < x < \frac{3}{2}$ ;

4)  $x < 1$ ,  $1 < x < \frac{3}{2}$ ; 5)  $-2 < x < -1$ ,  $-\frac{3}{7} < x$ ; 6)  $-\frac{7}{17} < x < 1$ ; 7)  $\frac{2}{3} < x < 1$ ,  
 $1 < x < 3$ ; 8)  $\frac{1}{3} < x < 3$ ,  $3 < x < 4$ .

**185.** 1) 1;  $\log_5 3$ ; 2) 1;  $\log_2 5$ ; 3) 0;  $\log_{\frac{2}{3}} 5$ ; 4) 0; 5)  $-1$ ;  $\log_{10} 2$ ;

6) 0; 1; 7)  $\log_2 10$ ; 8)  $\frac{1}{2} \log_{\frac{1}{3}} 2$ .

**186.** 1) 2; 2) 0.

**187.** 1)  $a \geqslant 0$ ,  $a = -\frac{1}{4}$ ; 2)  $-\frac{1}{4} < a < 0$ .

**188.** 1)  $x > 23$ ; 2)  $x > 6$ ; 3)  $-2 < x < 7$ ; 4)  $0,99 < x < 1$ ; 5)  $0 < x < 3$ ;

6)  $x < -2$ ,  $x > 7$ ; 7)  $x > 6$ ; 8)  $2 < x < \frac{1 + \sqrt{13}}{2}$ .

**190.** 1)  $25 < x < 36$ ; 2)  $0 < x < 4$ ,  $x > 9$ ; 3)  $0 < x < 0,16$ ,  $1 < x < \frac{7}{3}$ ;

4)  $\frac{3}{7} \leqslant x < 0,81$ ,  $x \geqslant 1$ ; 5)  $-\sqrt{10} < x < -3$ ,  $\sqrt{10} < x \leqslant 10$ ; 6)  $-3 < x < -\sqrt{8}$ ,  
 $-1 < x < \sqrt{8}$ .

**191.** 1)  $4 < x < 6$ ; 2)  $4 < x < 6$ ; 3)  $3 < x < 4$ ; 4)  $-4 < x < -3$ ,  $-2 < x < -1$ ,  
 $1 < x < 2$ ; 5)  $-3 < x < -2$ ,  $x > 2$ ; 6)  $2 < x < 3$ ,  $x > 6$ ; 7)  $0 < x < 0,5$ ,  
 $1 < x < 2$ ,  $3 < x < 6$ ; 8)  $1 < x < 2$ ,  $2 < x < 3$ ,  $3 < x < 5$ ; 9)  $1 < x < 2$ ,

$2 < x < 3$ ,  $3 < x < 4$ ,  $x \geqslant 5$ ; 10)  $-2 < x \leqslant -1$ ,  $x \geqslant 4$ ; 11)  $x > \frac{-3 + \sqrt{29}}{2}$ ;

12)  $1 < x < \frac{-3 + \sqrt{29}}{2}$ .

**192.** 1)  $1 < x < \frac{4}{3}$ ; 2)  $-0,5 < x < 0$ ; 3)  $x > 14,5$ ; 4)  $x > 4,5$ ; 5)  $x > 5$ ;

6)  $x < -11$ .

**194.** 1) 1; 2)  $-2$ ; 3) 2; 4) 2; 5) 8; 6) 6; 7) 2; 8) 2.

**195.** 1)  $4a$ ; 2)  $2a$ ; 3)  $7,5a$ ; 4)  $-4a$ ; 5)  $\frac{1}{a}$ ; 6)  $1-a$ ; 7)  $\frac{a}{1-a}$ ; 9)  $\frac{3-2a}{1+3a}$ .

**196.** 1)  $3a+b$ ; 2)  $\frac{3-3a}{b+1}$ .

**197.** 1) 13,5; 2) 20,25.

**198.** 1) 5; 2) 1023.

**200.** 2.

**201.** 1)  $\log_7 8 > \log_8 9$ ; 2)  $\log_7 6 < \log_8 7$ .

**202.** 1) 64; 2) 9; 3) 1; 4) 2; 5)  $\sqrt{3}$ ; 6)  $\sqrt[10]{10}$ ; 7)  $\sqrt{3}$ ; 8) 20; 9) 2; 10) 1;

11)  $-\frac{5}{4}$ ; 12)  $\frac{1}{12}$ ; 13) 9;  $\frac{1}{27}$ ; 14) 16; 15) 9;  $\frac{1}{9}$ ; 16) 3; -3; 17) 4;  $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ ; 18) 3;  $\frac{1}{9}$ .

**203.** 1) 100; 0,01; 2) 2;  $\frac{1}{8}$ ; 3) 3; 27; 4) 100; 0,1; 5) 3;  $\frac{1}{9}$ ; 6) 0,5; 4;

7) 0,00001; 1000; 8)  $\frac{1}{\lg 0,07}$ ; 9)  $\frac{2}{\log_3 1,5}$ ; 10)  $\log_{\frac{5}{9}} \frac{3}{25}$ ; 11) 1;  $n^{\frac{n}{n-1}}$ ;

12) 1; 22.

**204.** 9.

**205.** 1)  $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$ ; 2) а) 100; б) 10.

**206.** 1) -100; 2) -1000.

**207.** 1)  $3 < x < 4,5$ ; 2)  $-1 < x < \frac{2}{3}$ ; 3)  $-2 < x < \frac{2}{7}$ ;

4)  $\log_3 \frac{4}{3} < x < \log_3 28$ ; 5)  $x < \log_4 (\sqrt{3} - 1)$ ,  $x > 1,5$ ; 6)  $1 < x \leq 2^{\frac{3}{4}}$ ;

7)  $0 < x < 1$ ,  $\frac{1 + \sqrt{5}}{2} < x < 2$ ; 8)  $\log_4 13 < x \leq 2$ ; 9)  $4 < x < 10$ ;

10)  $-\sqrt{2} < x < -1$ ,  $1 < x < \sqrt{2}$ .

**209.** 2) а) 1,115; б) 21,17; в) 0,01531; г) 4,052; д) 0,2863; е) 7,038.

## Г л а в а 4

### Тригонометрические функции и их свойства

**214.** 1)  $960^\circ$ ; 2)  $1440^\circ$ .

**215.** 3)  $190^\circ + 360^\circ \cdot (-1)$ ; 5)  $320^\circ + 360^\circ \cdot 8$ ; 7)  $70^\circ + 360^\circ \cdot (-7)$ .

**216.** 1) в)  $-110^\circ + 360^\circ \cdot (-1)$ .

**217.** 1)  $40^\circ$ ;  $400^\circ$ ;  $760^\circ$ ;  $-320^\circ$ ;  $-680^\circ$ .

**218.** 2) а)  $30^\circ + 90^\circ n$ ; б)  $30^\circ + 120^\circ n$ ,  $n$  — любое целое число.

**219.** 2)  $P_{-70^\circ}$ ; а) наименьшее по модулю значение  $\beta = -70$ ; б) наименьшее положительное значение  $\beta = 290$ ; 2)  $P_{110^\circ}$ ; 3)  $P_{250^\circ}$ .

**220.** 1) 4,8 с; 2) 5; 3) 24 с.

**221.** 5)  $\frac{25\pi}{36}$ ; 7)  $-\frac{5\pi}{4}$ .

**222.** 3)  $36^\circ$ ; 9)  $114,6^\circ$ .

**223.** 3)  $\frac{5}{4}\pi$ ; 5)  $-\frac{2}{3}\pi$ ; 9)  $-\frac{251}{18}\pi$ .

**226.** 3)  $\approx -1,4$ ; 5)  $\approx 4,375$ ; 7)  $\approx 18,025$ ; 9)  $\approx -28$ .

**231.** 2)  $197,7^\circ$ ; 3)  $-93,2^\circ$ ; 4)  $303^\circ$ .

**232.** 1) Общий вид углов поворота, переводящих точку  $P$  в точку  $M$  таков:  $\alpha^\circ = 90^\circ + 360^\circ n$ ,  $n$  — любое целое число.

**234.** 1)  $\omega \approx 0,26$  рад/ч; 2)  $v \approx 1700$  км/ч.

**238.** 5) II четверть,  $\cos \alpha < 0$ ,  $\sin \alpha > 0$ ; 7) II четверть; 8) I четверть.

**239.** 5)  $\cos \beta > 0$ ,  $\sin \beta < 0$ .

**241.** 1) а)  $156^\circ + 360^\circ n$  и  $24^\circ + 360^\circ n$ ,  $n$  — целое число;

2) а)  $45^\circ + 360^\circ n$  и  $135^\circ + 360^\circ n$ ,  $n$  — целое число.

**243.** 1)  $\cos 72^\circ \approx 0,31$ ,  $\sin 72^\circ \approx 0,95$ ;

4)  $\cos 215^\circ \approx -0,82$ ,  $\sin 215^\circ \approx -0,57$ .

**245.** 1) 3; 3) 1; 5) 0.

**246.** 1) Синус равен косинусу для углов  $45^\circ$  и  $225^\circ$ ; 2) синус противоположен косинусу для углов  $135^\circ$  и  $315^\circ$ ; 4) синус больше косинуса для углов между  $45^\circ$  и  $225^\circ$ .

**249.** 1) Да; 3) нет; 7) нет; 8) да.

**250.** 3)  $\varphi = \frac{3\pi}{2}$ .

**251.** 1)  $\varphi = \pi n$ ,  $n$  — любое целое число.

**252.** 1)  $\frac{\pi}{2} + \pi n$ ; 3)  $\frac{\pi}{2} + 2\pi n$ ,  $n$  — любое целое число.

5)  $\frac{\pi}{2} + 2\pi k \leqslant \varphi \leqslant \frac{3\pi}{2} + 2\pi k$ ; 6)  $\pi + 2\pi k \leqslant \varphi \leqslant 2\pi(k+1)$ ,  $\varphi = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .

**256.** 9) Положительное; 10) отрицательное.

**259.** 3)  $-1,4$ ; 5)  $1,4$ ; 6)  $-3,7$ .

**260.** 1)  $52,43^\circ + 180^\circ n$ ; 3)  $-21,80^\circ + 180^\circ n$ ,  $n$  — любое целое число.

**261.** 1) Для углов  $45^\circ$ ,  $135^\circ$ ,  $225^\circ$  и  $315^\circ$ ; 2) нет таких углов; 3) для углов между  $45^\circ$  и  $90^\circ$ , между  $135^\circ$  и  $180^\circ$ , между  $225^\circ$  и  $270^\circ$ , между  $315^\circ$  и  $360^\circ$ ; 4) для углов между  $0^\circ$  и  $45^\circ$ , между  $90^\circ$  и  $135^\circ$ , между  $180^\circ$  и  $225^\circ$ , между  $270^\circ$  и  $315^\circ$ .

**263.** 1) Нет; 2) да; 3) нет; 4) нет.

**266.** 4) 0.

**268.** 3)  $\frac{\pi}{4} + \pi n$ ,  $n$  — любое целое число.

**269.** 3)  $\varphi = \frac{2\pi}{3}$ ,  $\varphi = \frac{5\pi}{3}$ ; 5), 6)  $2\pi n < \varphi < \frac{\pi}{2} + 2\pi n$ .

**270.** 1)  $\varphi = \frac{\pi}{2} n$ ; 3)  $\varphi = \frac{\pi}{4} + \pi n$ ,  $\frac{\pi}{2} + \pi n$ ,  $n$  — любое целое число;

5)  $-\frac{\pi}{2} + \pi n < \varphi \leqslant \pi n$ ,  $n$  — любое целое число.

**271.** 2) а)  $y = \frac{\sqrt{3}}{3} x + 3$ ; в)  $y = -\sqrt{3} x + 3$ .

**272.** 2)  $\operatorname{tg} 1 > \operatorname{tg} 2$ ; 3)  $\sin 15^\circ < \sin 15$ ; 4)  $\cos 3 < \cos 4$ .

**276.** 3) Отрицательна.

**277.** 1)  $-\frac{\pi}{4} \leqslant \frac{1}{2} \arcsin p \leqslant \frac{\pi}{4}$ ; 4)  $\pi < \pi + \operatorname{arcctg} p \leqslant 2\pi$ .

**278.** 2)  $\frac{5\pi}{6}$ .

**279.** 1)  $\frac{\pi}{6}$ ; 3) 1.

**280.** 3) 0.

**282.** 1)  $\alpha = \beta$ ; 2)  $\alpha = -\beta$ .

**283.** 1)  $a \in [-1; 1]$ ; 3)  $a \in \mathbb{R}$ .

**284.** 3)  $\frac{5\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$ .

**285.** Нет.

**288.** 1)  $-\frac{\pi}{2} + 2\pi n, -\arcsin \frac{1}{4} + 2\pi n, \pi + \arcsin \frac{1}{4} + 2\pi n, n$  — любое

целое число; 2)  $2\pi n, n$  — любое целое число.

**292.** 1)  $\sin 34^\circ - \cos 34^\circ$ ; 2)  $2 \operatorname{ctg} 20^\circ$ .

**293.** 1)  $-\operatorname{tg} x$ ; 3)  $\operatorname{ctg} \varphi$ .

**294.** 1) а)  $\sin 120^\circ \approx 0,866$ ,  $\cos 120^\circ \approx -0,5$ ,  $\operatorname{tg} 120^\circ \approx -1,732$ .

**299.** 4)  $\frac{\pi}{3} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$ .

**300.** 2)  $\frac{4\pi}{7}$ ; 3)  $\frac{\pi}{2} - 6 + 2\pi$ ; 4)  $10 - 3\pi$ ; 5)  $\frac{\pi}{2} - 10 + 3\pi$ .

**306.** 1)  $x \neq \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n$  — любое целое число; 3) не имеет решения.

**307.** 2) Общий вид уравнения оси симметрии  $x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k$  — любое

целое число.

**308.** 2) Общий вид абсцисс центров симметрии  $x = \pi n$ , где  $n$  — любое целое число.

**312.** 1)  $y_{\max} = 2, y_{\min} = -2$ ; 3)  $y_{\max} = 1,5, y_{\min} = -0,5$ ; 5)  $y_{\max} = 6, y_{\min} = 3\frac{3}{4}$ .

**313.** 1), 4) — нечётные; 2), 3) — чётные.

**315.**  $a > 5$ .

**316.** 1)  $-0,5 < a < 0,5$ ; 2)  $a > \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

**318.** Функция  $y = \sec x$  чётная, а функция  $y = \operatorname{cosec} x$  нечётная.

**323.** 1)  $x \neq 2\pi n, n$  — любое целое число; 2)  $x \neq \pi + 2\pi n, n$  — любое целое число; 3) нет решений; 4) нет решений.

**324.** 2) Общий вид уравнения оси симметрии  $x = \pi n, n$  — любое целое число.

**325.** 1) Абсциссы некоторых центров симметрии  $x = \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ .

2) Общий вид абсцисс центров симметрии:  $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n$  — любое целое число.

**327.** 1) 0,4 и 0; 3) 1 и  $\frac{1}{3}$ ; 4) 1 и 0,2.

**330.** 1)  $\pi$ ; 2)  $4\pi$ .

**331.** а) Чётные функции 1), 5) и 6); б) нечётная функция 2).

- 332.** 1)  $-\frac{5\pi}{4} + 2\pi n < x < \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$   
 2)  $-\frac{5\pi}{6} + 2\pi n < x < \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$   
 3)  $-\frac{\pi}{6} + 2\pi k \leq x \leq \frac{7\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z};$  4)  $\frac{3\pi}{4} + 2\pi k \leq x \leq \frac{5\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$
- 333.** 1)  $\frac{\pi}{12} + \pi n \leq x \leq \frac{5\pi}{12} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$   
 2)  $\frac{2\pi}{9} + \frac{2\pi k}{3} \leq x \leq \frac{4\pi}{9} + \frac{2\pi k}{3}, k \in \mathbb{Z};$  3)  $-\frac{\pi}{2} + 4\pi n \leq x \leq \frac{3\pi}{2} + 4\pi n, n \in \mathbb{Z};$   
 4)  $-\frac{5\pi}{24} + \pi n < x < \frac{13\pi}{24} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$
- 339.** 1)  $-\frac{\pi}{2} + \pi n < x < \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$  2)  $-\frac{\pi}{3} + \pi n < x < \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$   
 3)  $-\frac{\pi}{2} + \pi n < x \leq -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$  4)  $\frac{\pi}{3} + \pi n < x < \pi + \pi n, n \in \mathbb{Z};$   
 $5 \operatorname{arctg} 3 + \pi n < x < \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$  6)  $\operatorname{arcctg}(-3) + \pi n \leq x < \pi + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$
- 346.** 1) а)  $\frac{\pi}{4};$  б)  $\frac{5\pi}{4};$  в)  $\frac{9\pi}{4};$   $\frac{13\pi}{4};$  3) а)  $\operatorname{arctg} 2;$  б)  $\pi + \operatorname{arctg} 2;$   
 в)  $2\pi + \operatorname{arctg} 2;$   $3\pi + \operatorname{arctg} 2.$
- 347.** 1)  $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z};$  2) Таких  $x$  нет; 3)  $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}.$
- 349.** 1) Функция возрастает на промежутках:  
 $\left(\frac{5\pi}{6} + 2\pi n; \frac{11\pi}{6} + 2\pi n\right)$  и убывает на  $\left(-\frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{5\pi}{6} + 2\pi n\right), n \in \mathbb{Z};$   
 2) функция возрастает на промежутках  $(-\pi + 4\pi n; \pi + 4\pi n)$  и убывает на  $(\pi + 4\pi n; 3\pi + 4\pi n), n \in \mathbb{Z};$  4) убывает на  $\left(\frac{\pi}{6} + \pi n; \frac{7\pi}{6} + \pi n\right), n \in \mathbb{Z}.$
- 350.** 1)  $\frac{\pi}{2};$  2)  $\pi;$  3)  $\pi;$  4)  $\pi.$
- 351.** 1)  $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right);$  2)  $\left(0, 6; \frac{\pi}{2}\right).$
- 352.** 1) Могут; 2) могут.
- 353.** 1)  $\cos \alpha = \frac{33}{65};$   $\operatorname{tg} \alpha = \frac{56}{33};$   $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{33}{56};$  3)  $\sin \alpha = \frac{35}{37};$   $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{35}{12};$   
 $\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{12}{35};$  5)  $\sin \alpha = -\frac{24}{25};$   $\cos \alpha = -\frac{7}{25};$   $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{7}{24}.$
- 354.** 5)  $1 - \sin \beta;$  7)  $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha;$  9)  $\operatorname{tg}^6 \beta;$  11)  $\frac{2}{\sin \beta};$  13)  $\frac{1}{\sin \beta};$   
 15)  $\frac{2}{|\sin \alpha|}.$

355. 1) -7; 2) 0.

357. 1) 0; 3) 1; 5) 1.

358. 7)  $\frac{\pi}{6} + 2\pi k, \pi - \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbf{Z}$ ; 8)  $-\arctg\left(\frac{3}{2}\right) + \pi n, n \in \mathbf{Z}$ ;9)  $\pm\arccos\frac{3}{5} + 2\pi n, \pm\arccos\frac{4}{5} + 2\pi n (n \in \mathbf{Z})$ ; 10)  $\arccos\frac{5}{13} + 2\pi n, \pm\arccos\left(-\frac{12}{13}\right) + 2\pi n, n \in \mathbf{Z}$ .

360. 1) 7; 2) 47.

361. 1) Не могут; 2) могут.

363. 3)  $\sqrt{2}$ ; 4)  $\sqrt{(\cos \alpha - \cos \beta)^2 + (\sin \alpha - \sin \beta)^2}$ .364. 11)  $-\sin \varphi$ .365. 1)  $\frac{117}{125}$ ; 3)  $\frac{33}{65}$ ; 5)  $\frac{31\sqrt{2}}{50}$ .367. 1)  $\frac{171}{221}$ ; 2)  $\frac{4+3\sqrt{3}}{10}$  и  $\frac{-4+3\sqrt{3}}{10}$ .368. 1)  $\frac{204}{325}$ ; 2)  $-\frac{17}{145}$ .369. 3)  $\sqrt{2} \cos \alpha$ .370. 1) г)  $\cos \beta$ .

371. 1) Значение первого выражения больше значения второго; 2) значение первого выражения больше значения второго; 3) значения выражений равны.

372. 1) 1; 2) -1.

373. 1)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ; 3)  $\frac{1}{2}$ .374.  $\pm\frac{5\pi}{18} + \frac{2}{3}\pi k, k \in \mathbf{Z}$ .375.  $105^\circ$ .381. 3)  $\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi n}{3}, -\frac{5\pi}{18} + \frac{2\pi n}{3}, n \in \mathbf{Z}$ .382. 1)  $\frac{3+2\sqrt{3}}{2-3\sqrt{3}}$ ; 3)  $\frac{1-1,5\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1,5}$ .383. 1)  $\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ ; 3)  $-\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ .384. 1) а)  $\frac{17}{19}$ ; в)  $-\frac{171}{140}$ .385. 1)  $\frac{1}{3}$ ; 3)  $\frac{1}{7}$ .

386. 1) 17,2.

387.  $90^\circ$ .388. 1) 1; 3)  $\sqrt{3}$ .392. 3)  $\arctg 2 + \pi n, n \in \mathbf{Z}$ .

**394.** 1)  $\operatorname{tg} 55^\circ$ ; 2)  $\frac{\sqrt{3}}{3} \operatorname{ctg} 10^\circ$ .

**396.** 2) Угловые коэффициенты  $k_1$  и  $k_2$  взаимно перпендикулярных прямых связаны соотношением  $k_1 \cdot k_2 = -1$ .

**397.** 9)  $\cos^2 \frac{\pi}{14} - \sin^2 \frac{\pi}{14}$ ; 11)  $\frac{2 \operatorname{tg} 0,15\pi}{1 - \operatorname{tg}^2 0,15\pi}$ ;

13)  $2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}$ ; 15)  $2 \sin \frac{3\alpha}{2} \cos \frac{3\alpha}{2}$ ; 17)  $2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2}$ ;

19)  $2 \sin \left( \frac{\pi}{8} - \frac{\varphi}{2} \right) \cos \left( \frac{\pi}{8} - \frac{\varphi}{2} \right)$ .

**398.** 1) 0,96; 3)  $\frac{3}{4}$ ; 5)  $-\frac{24}{7}$ .

**400.** 3)  $\sin 24^\circ$ ; 5)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ; 7)  $-\cos 40^\circ$ ; 9)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ; 11)  $\cos \alpha$ ; 13)  $\cos 2\alpha$ ;

15)  $\operatorname{tg} 20^\circ$ ; 17)  $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$ .

**401.** 3)  $\cos 10^\circ - \sin 10^\circ$ ; 5)  $\frac{1}{\cos 20^\circ}$ ; 7)  $\cos 5^\circ$ ; 8)  $\cos 25^\circ - \sin 25^\circ$ .

**402.** 1) а)  $\sin 20^\circ$ ; б)  $\frac{\cos 40^\circ}{8}$ ; в)  $\frac{\sin 32\alpha}{32 \sin \alpha}$ .

**403.** 1)  $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ;

2)  $\frac{\pi}{2} + \pi k, -\arcsin \frac{1}{4} + 2\pi k, \pi + \arcsin \frac{1}{4} + 2\pi k$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .

**404.** 1) 30; 2) 150.

**405.** 1)  $\frac{\pi}{4} + \pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ; 4)  $\pi + 2\pi n$ , где  $n \in \mathbb{Z}$ .

**406.** 1)  $\frac{\pi n}{2}$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ; 2)  $\frac{\pi n}{2}$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ .

**410.** 1) Может, так как  $\sin 2x = 2 \sin 24^\circ < 2 \sin 30^\circ = 1$ ;  
2) не может, так как  $\sin 2x < 2 \sin 34^\circ$  при любом  $x$ , так как  $2 \sin 34^\circ > 2 \sin 30^\circ = 1$ ; 3) да; 4) нет.

**412.** Наибольшее и наименьшее значения функции: 1) 1 и -1;

3)  $\frac{1}{2}$  и  $-\frac{1}{2}$ ; 5)  $\frac{1}{4}$  и  $-\frac{1}{4}$ .

**415.** 1)  $2 \cos 45^\circ \cos 60^\circ = \frac{\sqrt{6}}{2}$ ; 5)  $2 \sin \frac{11\pi}{120} \cos \frac{\pi}{120}$ ; 8)  $2 \cos 3\alpha \cos \alpha$ .

**418.** 1)  $\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{4}$ ; 2)  $\frac{\sqrt{2} - 1}{4}$ .

**421.** 1)  $\frac{3}{16}$ ; 2) 3.

**422.** 1)  $\frac{\pi n}{2}$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ; 3)  $\frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{3}, \frac{\pi n}{2}$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ; 5)  $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ .

**423.** 1)  $\frac{\pi n}{2}, \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ .

**424.** 1) а)  $\sin^2 4\alpha$ ; б)  $\sin 4\alpha \sin 5\alpha$ ; в)  $\sin 7\alpha \sin 8\alpha$ .

**425.** 1) а)  $\frac{\sin 8\alpha}{2}$ ; б)  $\sin 4\alpha \cos 5\alpha$ ; в)  $\sin 8\alpha \cos 7\alpha$ .

**426.** 1) а)  $\frac{1}{4}$ ; б)  $\sin 80^\circ \cos 70^\circ$ . Аргументы слагаемых составляют арифметическую прогрессию, а аргумент множителя равен её полуразности.

**428.** 1)  $\frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{3}, \pi n, n \in \mathbb{Z}$ ; 2)  $\frac{\pi n}{2}, \frac{\pi n}{5}, n \in \mathbb{Z}$ .

**429.** 1)  $-\pi; -\frac{\pi}{2}; 0; \frac{\pi}{2}; \pi$ .

**430.** 1)  $\pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ ; 2)  $\pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ ; 3)  $\frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$ ; 4)  $\pi n, n \in \mathbb{Z}$ .

**431.** 1) а)  $\pi + 2\pi n; \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ ; б)  $(-1)^k + 1 \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ ;

в)  $-\operatorname{arctg} 3 + \pi n, \operatorname{arctg} 2 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ ; г)  $\operatorname{arctg} 2, 5 + \pi n, -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ ;

д)  $2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ ; е) корней нет; з)  $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$ .

**432.** 1) а)  $-\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ ; б)  $\pi n, \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ ; в)  $-\operatorname{arctg} 2 + \pi n,$

$\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ ; г)  $\frac{\pi}{2} + \pi k, \pm \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ .

**433.** 1) а)  $-\frac{\pi}{4} + \pi n, \operatorname{arctg} \frac{3}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ ; б)  $\frac{\pi}{4} + \pi n, -\operatorname{arctg} 5 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ .

**434.** 1) а)  $\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ ; б)  $\pi n, n \in \mathbb{Z}$ ; в)  $\pi n, \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ ; г)  $\pi n, \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ .

**435.** 1) а)  $2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ ; б)  $\frac{\pi}{2} + \pi n, \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ ;

в)  $\frac{\pi n}{2}, \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ ; г)  $\frac{\pi}{2} + \pi n, \frac{\pi}{5} + \frac{2\pi n}{5}, n \in \mathbb{Z}$ .

**436.** 1)  $\frac{2\pi n}{3}, (2n+1)\frac{\pi}{11}, n \in \mathbb{Z}$ ; 2)  $\frac{2\pi n}{9}, n \in \mathbb{Z}$ ; 3)  $\frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$ ; 4)  $\frac{\pi n}{4},$

$n \in \mathbb{Z}$ ; 5)  $\frac{7\pi}{48} + \frac{\pi n}{2}$  или  $\frac{\pi}{96} + \frac{\pi}{8}(2n-1), n \in \mathbb{Z}$ ; 6)  $\frac{3\pi}{10} + \frac{4\pi n}{5}; -\frac{5\pi}{6} + \frac{4\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}$ .

**437.** 1)  $-\frac{\pi}{2} - 2\pi n$  или  $\frac{\pi}{14} + \frac{2\pi n}{7}, n \in \mathbb{Z}$ ; 2)  $\frac{\pi}{14} + \frac{\pi n}{7}, n \in \mathbb{Z}$ .

- 440.** 1)  $\pm \frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{2}$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ; 2)  $\frac{\pi}{2} + 2\pi n$ ,  $(-1)^n \arcsin \frac{1}{3} + \pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ;  
 3)  $\frac{\pi}{2} + 2\pi n$ ,  $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ; 4)  $\pi n, \frac{\pi}{3} + \pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ; 5)  $\frac{\pi}{4} + \pi n$ ,  
 $n \in \mathbb{Z}$ ; 6)  $-\frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{2}$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ; 7)  $(-1)^n \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{6} + 2\pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ; 8)  $\frac{\pi n}{4}$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ;  
 9)  $\operatorname{arctg} 3 + \pi n$ ,  $\operatorname{arctg} 7 + \pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ; 10)  $\frac{\pi}{10} + \frac{\pi}{5} k$ ,  $\frac{\pi}{7} + \frac{2\pi}{7} k$ ,  $\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} k$ ,  
 $k \in \mathbb{Z}$ ; 11)  $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ; 12)  $\frac{\pi}{4} + \pi n$ ,  $\operatorname{arctg} \frac{1}{7} + \pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ;  
 13)  $\frac{\pi}{10} + \frac{2\pi}{5} n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ; 14)  $\operatorname{arctg} (\sqrt{3} - 1) + \pi n$ ,  $-\operatorname{arctg} (\sqrt{3} + 1) + \pi n$ ,  
 $n \in \mathbb{Z}$ ; 15)  $x = \pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ; 16)  $-\frac{\pi}{6} + 2\pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ; 17)  $\pm \frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{2}$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ;  
 18)  $-\frac{\pi}{4} + \pi n$ ,  $\pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ .

**441.**  $\frac{\pi}{12}$ .

**442.**  $0, \pm \frac{\pi}{2}$ .

**443.**  $\pm \pi$ .

**444.** 1)  $\pi, \frac{7\pi}{6}$ ; 2)  $\frac{\pi}{2}$  и  $\frac{\pi}{6}$ .

**445.**  $a = \pm 2\sqrt{6}$ .

- 446.** 1)  $(-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ; 2)  $\pi n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ; 3)  $\frac{\pi}{4} + \pi n$ ,  $\pm \frac{2\pi}{9} + \frac{2}{3}\pi n$ ,  
 $n \in \mathbb{Z}$ ; 4)  $\log_2 \left( \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{4} \right)$ ,  $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ .

## Глава 5

### Элементы теории вероятностей и комбинаторики

**447.** 1)  $\frac{1}{4}$ ; 2)  $\frac{4}{9}$ ; 3)  $\frac{2}{9}$ .

**448.** 1)  $\frac{2}{3}$ ; 2)  $\frac{1}{2}$ ; 3)  $\frac{1}{3}$ .

**449.** 1)  $\frac{5}{31}$ ; 2)  $\frac{4}{15}$ ; 3)  $\frac{7}{15}$ .

**450.**  $\frac{63}{200}$ .

**451.** 0,25.

**452.** 1)  $\frac{1}{2}$ ; 2)  $\frac{1}{3}$ .

**454.**  $\frac{1}{3}$ .**456.** 1)  $\approx 4\%$ ; 2)  $\approx 7\%$ .**460.** Частота всхожести примерно равна 97%.**461.** Скорее всего, в коробке 2 чёрных шара.**462.** 12.**463.**  $\frac{1}{120}$ .**464.** 1) а)  $\frac{13}{34}$ ; б)  $\frac{32}{221}$ ; в)  $\frac{96}{221}$ ; 2) а)  $\frac{1}{17}$ ; б)  $\frac{1}{221}$ ; в)  $\frac{20}{221}$ ; 3) а)  $\frac{15}{34}$ ; б)  $\frac{33}{221}$ ; в)  $\frac{116}{221}$ .**467.** 1)  $\frac{5}{12}$ ; 2)  $\frac{1}{2}$ ; 3)  $\frac{1}{3}$ ; 4)  $\frac{7}{36}$ .**468.** 1) 0,2.**470.** 1) а)  $A_{20}^3$ ; б)  $P_{20}$ ; 2)  $\frac{1}{19}$ .**471.** 1) 120; 2)  $6! = 720$ .**472.** 1)  $\frac{1}{24}$ ; 2)  $\frac{1}{4}$ ; 3)  $\frac{1}{3}$ ; 4)  $\frac{1}{4}$ .**473.**  $\frac{2}{11}$ .**474.** 10 треугольников.**475.**  $C_{17}^4$ .**476.**  $\frac{1}{2} C_4^2$ .**478.**  $C_{20}^{10}$ .**479.** 1)  $\frac{1}{2} C_6^3$ ; 2)  $C_6^2$ .**480.** 1)  $\frac{1}{2} C_{10}^5$ ; 2)  $C_{10}^5 \cdot C_5^3$ .**481.** 1)  $\frac{8}{35}$ ; 2)  $\frac{3}{35}$ ; 3)  $\frac{16}{35}$ .**482.** 1)  $C_{36}^6$ ; 2) а)  $\frac{4 \cdot C_{32}^5}{C_{36}^6}$ ; б)  $1 - \frac{C_{32}^6}{C_{36}^6}$ ; в)  $\frac{C_{32}^2}{C_{36}^6}$ ; г)  $1 - \frac{C_{27}^6}{C_{36}^6}$ .**483.** 1)  $\frac{3}{5}$ ; 2)  $\frac{7}{20}$ ; 3)  $\frac{3}{20}$ .**484.** 1) 210; 2) 120; 3) 15.**485.** 1)  $(n+1) \cdot n \cdot \dots \cdot (n-k+3)$ .**488.** 960.**491.** 1) а)  $40\ 095x^8$ ; б)  $594x^{10}$ ; в)  $3^{12}$ ; 2)  $2^{12}$ .**492.**  $n = 10$ . Шестой член разложения бинома имеет коэффициент  $C_{10}^5 = 252$ .**493.** 1) 23; 2) 7; 3) 5; 5) 5.

## Глава 6

### Повторение

**494.** 1)  $x \neq -1$ ; 2)  $x \neq 1$ ; 4)  $x \leq -1,6$ ,  $x \geq -1$ ; 5)  $(-\infty; 0,75] \cup [1; +\infty)$ ;

6)  $2 - \sqrt{2} < x < 1,5$ ,  $1,5 < x < 2 + \sqrt{2}$ ;

7)  $\left( -\frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{\pi}{6} + 2\pi n \right) \cup \left( \frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{\pi}{2} + 2\pi n \right)$ , где  $n \in \mathbb{Z}$ .

**495.** 1)  $(-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$ ; 2)  $(-\infty; +\infty)$ ; 4)  $y \geq -16$ ; 5)  $y \leq 4$ ;

6)  $-\frac{9}{8} \leq y \leq 2$ ; 7)  $[-21; 3]$ ; 8)  $0 < y \leq 2$ ; 9)  $[1; 4]$ ; 10)  $[2; +\infty)$ .

**496.** 1)  $(-\infty; -1)$ ,  $(-1; +\infty)$ ; 2)  $\left( \frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{\pi}{2} + 2\pi(n+1) \right)$ , где  $n \in \mathbb{Z}$ ;

3)  $[2\pi n; \pi(2n+1)]$ , где  $n \in \mathbb{Z}$ ; 4)  $[n - 0,5; n + 0,5]$ , где  $n \in \mathbb{Z}$ .

**497.** 1)  $(-3; -0,5) \cup (5; +\infty)$ ; 2)  $x < -3$ ,  $-0,5 < x < 0,5$ ; 3)  $3 < x \leq 4$ ;

4)  $(-1; 1) \cup (1; +\infty)$ ; 5)  $\left( -\frac{5\pi}{2} - 2\pi n; -\frac{3\pi}{2} - 2\pi n \right)$ ,  $\left( -\frac{\pi}{2}; -1 \right)$ ,

$\left( \frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{3\pi}{2} + 2\pi n \right)$ , где  $n = 0, 1, 2, \dots$ ; 6)  $(0; 0,5)$ ,  $(2\pi n - \pi; 2\pi n)$ ,  $(-2\pi n; \pi - 2\pi n)$ , где  $n \in \mathbb{N}$ .

**498.** 1)  $x < -\frac{3}{4}$ ; 2)  $-1 < x < 1$ ; 3)  $1 < x < 2$ ; 4)  $5 < x < \frac{5 + \sqrt{61}}{2}$ .

**499.** 1) Функция возрастает на промежутках  $[a; b]$  и  $[c; d]$ , а убывает на промежутках  $[b; c]$  и  $[d; +\infty)$ ; 2) функция возрастает на промежутке  $[-2; 1,5]$ , а убывает на промежутках  $[-3; -2]$  и  $[1,5; 5,5]$ ; 3) функция возрастает на промежутке  $[1,5; 3,5]$ , а убывает на промежутках  $[-2,5; 1,5]$  и  $[3,5; 5]$ .

**501.** Убывающие: 2), 5); возрастающие: 1), 3).

**502.** 1) Возрастает на  $(-\infty; -1]$ , убывает на  $[-1; +\infty)$ ; наибольшее значение 4; 2) возрастает на  $(-\infty; 2]$ , убывает на  $[2; +\infty)$ ; наибольшее значение 25; 3) возрастает на  $(-4; -1,5]$ , убывает на  $[-1,5; 1]$ ; наибольшее значение  $-1,2$ ; 4) возрастает на  $[-3; +\infty)$ , убывает на  $(-\infty; -3]$ , наименьшее значение  $\log_7 2$ ; 5) возрастает на  $[2\pi k; \pi(2k+1)]$ , убывает на  $[\pi(2k+1); 2\pi(k+1)]$ , где  $k \in \mathbb{Z}$ ; наибольшее значение 9, наименьшее значение 1; 6) возрастает на  $[\pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k]$ , убывает на  $[-\frac{\pi}{2} + \pi k; \pi k]$ , где  $k \in \mathbb{Z}$ ; наибольшее значение  $\frac{10}{3}$ ; наименьшее значение 0,3.

**503.** 1) а)  $D(g) = [-3; 4]$ ,  $D(h) = (-3; -2) \cup (-2; -0,8) \cup (-0,8; 3,3) \cup (3,3; 4)$ ; б)  $E(g) = [0; \sqrt{4,5}]$ ,  $E(h) = (-\infty; 0) \cup \left[ \frac{1}{\lg 4,5}; +\infty \right)$ ; в)  $g(x)$  возрастает на  $[-2; 1,5]$ , убывает на  $[-3; -2]$ ,  $[1,5; 4]$ ,  $h(x)$  возрастает на

( $-3; -2$ ),  $[1,5; 3,3)$ ,  $(3,3; 4)$ , убывает на  $(-2; -0,8)$ ,  $(-0,8; 1,5]$ ;  
 г)  $\min g(x) = 0$ ,  $\max g(x) = \sqrt{4,5}$ , у  $h(x)$  нет ни наибольшего, ни наименьшего значения; 2) а)  $D(g) = [-2,5; 0,8] \cup [2,3; 4]$ ,  $D(h) = [-2,5; 0,3) \cup (0,3; 0,8) \cup (2,3; 2,8) \cup (2,8; 3,7) \cup (3,7; 4)$ ;  
 б)  $E(g) = [0; \sqrt{4,5}]$ ,  $E(h) = (-\infty; 0) \cup \left[ \frac{1}{\lg 4,5}; +\infty \right)$ ; в)  $g(x)$  возрастает на  $[2,3; 3,5]$ , убывает на  $[-2,5; 0,8]$ ,  $[3,5; 4]$ ,  $h(x)$  возрастает на  $[-2,5; 0,3)$ ,  $(0,3; 0,8)$ ,  $[3,5; 3,7)$ ,  $(3,7; 4)$ , убывает на  $(2,3; 2,8)$ ,  $(2,8; 3,5]$ ; г)  $\min g(x) = 0$ ,  $\max g(x) = \sqrt{4,5}$ , у  $h(x)$  нет ни наибольшего, ни наименьшего значения.

**504.** 1) 1; 2) 0; 3)  $-3$ ; 4) 11; 5) 1; 6) 2; 7) 1; 8) 2; 9) 0.

**505.** 1) а)  $\frac{\pi}{6}$ ; б)  $-\frac{\pi}{4}$ ; в)  $\frac{2\pi}{7}$ ; г)  $3\pi - 10$ ; д)  $\frac{\pi}{2} - 2$ ; 2) а)  $\frac{2\pi}{3}$ ; б)  $\frac{5\pi}{6}$ ;  
 в)  $\frac{3\pi}{4}$ ; г)  $4\pi - 10$ ; д)  $\frac{\pi}{2} - 1$ ; 3) а)  $\frac{\pi}{3}$ ; б)  $-\frac{\pi}{4}$ ; в)  $-\frac{\pi}{5}$ ; г)  $7 - 2\pi$ ; д)  $\frac{\pi}{2} - 1$ ;  
 4) а)  $\frac{2\pi}{3}$ ; б)  $\frac{\pi}{4}$ ; в)  $\frac{3\pi}{5}$ ; г)  $7 - 2\pi$ ; д)  $\frac{3\pi}{2} - 2$ .

**506.** 1)  $\frac{3 - \sqrt{17}}{4} \leqslant x < \frac{1}{2}$ ,  $1 \leqslant x < \frac{3 + \sqrt{17}}{4}$ ; 2)  $\cos \frac{1}{3} < x \leqslant 1$ .

**507.** Например,  $y = \frac{1}{x}$ . Не может.

**508.** Нечётные: 1), 2); чётные: 3), 4). Нечётная: б), д); чётная: а), в), г).

**509.** 2) При преобразовании (3) расстояния до оси абсцисс умножаются на  $k$ ; при преобразовании (4) расстояния до оси ординат делятся на  $k$ .

**514.** Первый и третий ученики выполнили преобразование графика верно.

**518.** 1)  $y = 1 - \{-x\}$ ; 2)  $\{x\} \rightarrow \{-x\} \rightarrow -\{-x\} \rightarrow -\{-x\} + 1$ .

**519.** 1)  $\frac{2\pi}{3}$ ; 2)  $10\pi$ ; 3)  $\frac{\pi}{4}$ ; 4) 2.

**520.** 1) Симметрия относительно оси ординат; 2) симметрия относительно оси абсцисс; 3) перенос параллельно оси абсцисс на 3 единицы влево; 4) перенос параллельно оси ординат на 3 единицы вверх; 5) сжатие к оси ординат в 2 раза; 6) растяжение от оси абсцисс в 2 раза.

**523.** 1) а)  $a = 0$ ,  $a > 5$ ; б)  $0 < a < 4$ ,  $a = 5$ ; в)  $a = 4$ ; г)  $4 < a < 5$ .  
 2) Уравнение не имеет корней при  $a < 0$ .

**524.** 1) ОДЗ расширилось: в него добавилось число  $-1$ ; 2) ОДЗ сузилось: из него исчезло число  $-1$ ; 3) следует дополнительно рассмотреть случай, когда  $x + 1 < 0$ ; 4) следует проверить, что  $x + 1 \geqslant 0$ ; 5) равносильное преобразование; 6) следует дополнительно рассмотреть случай, когда  $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ ; 7) следует проверить, что

$\cos x \geq 0$ ; 8) равносильное преобразование; 9) следует дополнительно рассмотреть случаи, когда  $f(x) < 0$ ,  $g(x) < 0$ ; 10) ОДЗ могло расширяться, следует проверить, что  $g(x)$  имеет смысл; 11) ОДЗ могло расширяться, следует проверить, что  $f(x) > 0$ ; 12) равносильное преобразование; 13) ОДЗ могло сузиться, следует дополнительно рассмотреть случай, когда  $f(x)$  и  $g(x)$  одновременно отрицательны.

**525.** 1) Следует проверить, что значения правой части уравнения неотрицательны; 2) равносильное преобразование; 3) ОДЗ расширилось: следует проверить, что  $2x + 3$  и  $x - 2$  неотрицательны; 4) ОДЗ расширилось: следует проверить, что  $7 - x > 0$ ,  $7 - x \neq 1$ ,  $x^3 + 9 > 0$ ; 5) следует дополнительно рассмотреть случаи, когда  $\sin x = 0$  и  $\cos x = -\sin x$ ; кроме того, следует учесть, что косинус должен быть неотрицателен; 6) равносильное преобразование; 7) равносильное преобразование; 8) ОДЗ сузилось: следует дополнительно рассмотреть случай  $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ). Ответы: 1)  $3 + \sqrt{7}$ ; 2) 3;

4)  $-1$ ; 5)  $\pi n, \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n$  ( $n \in \mathbb{Z}$ ); 6)  $\frac{\pi}{4} + 2\pi k$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ); 7)  $\pm \frac{\pi}{4} + 2\pi k$ ,  $2\pi k$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ); 8)  $-\arctg 0,5 + \pi k, \frac{\pi}{2} + \pi k$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ).

**526.** 1)  $2(a+b)$ ; 2)  $\frac{a+b}{a-b}$ .

**527.** 1) Нет решений; 2)  $-3,2$ ; 3)  $x \neq \pm 4$ ; 4) 0 и 7.

**528.** 1) 1 и 5; 2) 2 и 4; 3) 1,5; 4) нет решений.

**529.** 1)  $-2$ ; 4; 2) 7; 5.

**530.** 2), 3) Следует учесть, что подкоренное выражение должно быть положительным; 4) подкоренное выражение должно быть неотрицательным; 5) ОДЗ расширилось; следует рассмотреть случай равенства нулю логарифма и учесть требование положительности выражения, стоящего под знаком логарифма; 6) ОДЗ расширилось; следует учесть требование неотрицательности подкоренных выражений; 7) равносильное преобразование; 8) ОДЗ расширилось; следует учесть требование существования  $\log_{\sin x} \cos x$ . Ответы:

1)  $x < -3$ ,  $x > 3$ ; 2)  $x > \frac{3}{2}$ ; 3)  $-\frac{1}{3} < x < 2,5$ ; 4)  $x \geq 4,5$ ,  $x = -1$ ; 5)  $x = 6$ ;

6)  $x \leq 1$ ; 7) нет решений; 8)  $\frac{\pi}{4} + 2\pi k < x < \frac{\pi}{2} + 2\pi k$ .

**531.** 1)  $(0; \infty)$ ; 2)  $\left(-2\frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$ ; 3)  $(-\infty; 1)$ ,  $(1,2; 2)$ ,  $(3; +\infty)$ ;

4)  $(-\infty; -4]$ ,  $[1; 5]$ .

**532.** 1)  $(5; 27)$ ; 2)  $(-\infty; 0,2)$ .

**533.** 1)  $(-\infty; 1)$ ,  $(3; +\infty)$ ; 2)  $(1; 3)$ ; 3)  $(-\infty; -2)$ ,  $(2; +\infty)$ ; 4)  $[0; 3]$ .

**535.** Каждый переход в решении равносителен, поэтому проверку корней делать не нужно.

математики. Тренировка в решении задач на вычисление коэффициентов линейных уравнений и неравенств поможет вам в дальнейшем изучении алгебры. Учите, что в школьной программе по математике учащимся предлагаются различные способы решения уравнений и неравенств, но в реальной жизни для решения задачи лучше всего использовать тот метод, который вам кажется наиболее удобным.

Следует помнить, что в школьной математике для решения задачи часто требуется не только знание теории, но и умение решать задачи на практике. Для этого необходимо уметь находить аналогии между задачами, решать их с помощью различных методов, а также уметь анализировать полученные результаты.

## СОВЕТЫ

### Глава 1

#### Функции и графики

**5.** Подумайте, сколькими способами можно выбрать первую цифру двузначного числа.

**14.** Обозначьте вторую сторону прямоугольника буквой  $y$ , выразите больший катет треугольника с меньшим катетом  $x$  и составьте пропорцию из подобия треугольников.

**18.** В этой задаче аргументом функции  $y$  оказываются различные выражения, значения которых должны попадать в заданную в условии область определения функции  $y = f(x)$ , т. е. выражение в скобках может принимать значения только из области определения функции  $y = f(x)$ . Исходя из этого и определяется соответствующее множество значений  $x$ . Работая с модулями, сначала рассмотрите отрицательные, а затем неотрицательные значения  $x$ .

**20.** Подумайте, какие целые (натуральные) значения  $x$  следует брать, чтобы значения  $y$  тоже оказались целыми (натуральными).

**25. 3)** Представьте себе, как расположена прямая по отношению к оси абсцисс.

**26.** Подумайте, каково взаимное расположение графиков данной функции и функции: 1)  $y = x$ ; 2)  $y = -x$ .

**28.** Произведение обратно пропорциональных переменных постоянно ( $xy = k$ ).

**31.** Не нужно вычислять  $k$ , достаточно сравнить произведения координат точек.

**32.** 2) Должны быть равны произведения координат.

**36.** Предположите, что такие точки имеют абсциссы  $x_1 = a$  и  $x_2 = b$ .

**39.** 1), 2) Можно применить формулу расстояния или построить график. В 3) представьте себе, как выглядит искомый график и запишите ответ.

**40.** Расстояние от точки  $M(x; y)$  до прямой  $y = -1$  равно  $|y + 1|$ .

**46.** 4) Перед тем как применять формулу корней квадратного уравнения, попробуйте найти сумму его коэффициентов.

**51.** Найдите значения левой части уравнения на концах данного отрезка и воспользуйтесь свойством непрерывной функции.

**52.** 2), 4), 6). При решении нестрогого неравенства нули соответствующей функции включаются в множество решений. При изображении этих нулей на координатной оси их полезно изображать не «пустым», а чёрным кружком.

**64.** Подумайте, какую функцию задаёт выражение, стоящее в левой части уравнения, и попробуйте подобрать корень.

**65.** Обратите внимание на характер монотонности функций, которые задаются левой и правой частями уравнения.

**66.** Подумайте, какую функцию задаёт выражение, стоящее в левой части уравнения, и какие знаки оно имеет на концах данного промежутка.

**68.** Попробуйте решить задачу графически — постройте на листе бумаги в клетку график функции  $y = [x]$  ( $y = \{x\}$ ), за координатную единицу возьмите 4 клетки. Проведите прямые, проходящие через точку  $(0; -1)$ , пересекающие график только в двух точках. Затем определите их угловые коэффициенты.

**69.** Абсцисса вершины параболы  $y = ax^2 + bx + c$  равна  $-\frac{b}{2a}$ , а ординату можно найти подстановкой абсциссы в уравнение.

**75.** Ответы на эти вопросы связаны с наличием или отсутствием корней соответствующего квадратного уравнения. Здесь лучше находить сокращённый дискrimинант:

$$\frac{D}{4} = \left( \frac{b}{2} \right)^2 - ac.$$

**76.** Подумайте, при каком значении  $x$  левая часть уравнения равна  $a - b + c$ .

**77.** 1) Сделайте эскиз соответствующей параболы и определите, какой должна быть ордината её точки с абсциссой  $a$ . 2) Рассмотрите два случая: случай 1 — уравнение имеет единственный корень; случай 2 — корни имеют разные знаки.

**78.** Постарайтесь дать ответ устно.

**79.** Справа и слева от вершины параболы квадратичная функция монотонна. Выясните, принадлежит ли абсцисса вершины указанному промежутку и как ведёт себя данная функция на этом промежутке.

**80.** Область определения можно найти по рисунку, ответив на вопрос, какой может быть сторона прямоугольника. Площадь прямоугольника должна изменяться от нуля до своего наибольшего значения, причём нулём она быть не может.

**84. 1) и 2)** Искомую симметрию можно получить в результате последовательного выполнения симметрии относительно одной координатной оси и переноса параллельно другой. 3) Преобразование  $f(x) \rightarrow f(|x|)$  уничтожает часть графика, расположенную в левой полуплоскости и дублирует оставшуюся часть симметрично относительно оси ординат. Чтобы уничтожить часть графика, расположенную в правой полуплоскости, её сначала надо переместить влево:  $f(x) \rightarrow f(-x)$ . 4) Преобразование  $y = f(x) \rightarrow |y| = f(x)$  уничтожает часть графика, расположенную в нижней полуплоскости, и дублирует оставшуюся часть симметрично относительно оси абсцисс. Чтобы уничтожить часть графика, расположенную в верхней полуплоскости, её сначала надо переместить в нижнюю:  $f(x) \rightarrow -f(x)$ . 5) Симметрию относительно точки можно получить как результат двух осевых симметрий. 6) Используйте результаты, полученные в заданиях 3) и 4).

## Глава 2

### Степени и корни

**90.** Утвердительный ответ на вопрос: «Может ли...?» — достаточно подтвердить конкретным примером, а отрицательный ответ необходимо обосновать.

**100.** Проще всего задать эту функцию кусочно. Чтобы задать её одной формулой, в 1) воспользуйтесь симметрией графика относительно оси ординат. В 2) нужно сделать симметрию части графика, полученного в 1) относительно оси аб-

цисс. Изменить знак у функции при  $x < 0$  поможет выражение  $\frac{|x|}{x}$ . Кстати, в математике есть специальная функция

*сигнум* (лат. *signum* — знак):  $\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & \text{при } x > 0, \\ 0, & \text{при } x = 0, \\ -1, & \text{при } x < 0, \end{cases}$

правда, в область определения нашей функции 0 не входит.

**101.** Выражение в левой части задаёт чётную функцию. Подумайте, в каком случае множество её нулей нечётно.

**112.** Для обратимости функции необходимо и достаточно, чтобы каждому её значению соответствовало одно-единственное значение аргумента. В противном случае её график не будет задавать функцию  $x$ . Графически это выражается в том, что любая прямая, перпендикулярная оси ординат, либо не пересекает график функции  $y$ , либо имеет с ним единственную общую точку. После того как вы убедитесь в обратимости функции  $y = f(x)$ , график функции  $y = g(x)$  легко построить с помощью симметрии относительно прямой  $y = x$ .

**118.** Равенство с неотрицательными частями не нарушится, если его возвести в квадрат. Поэтому, возводя в квадрат уравнение, следует затем проверить его корни, — ведь они были найдены в предположении, что обе части уравнения положительны. Если при подстановке корня это окажется не так, его следует отбросить как посторонний. В заданиях 1)—4) неотрицательность левой части гарантируется равенством, которое получается после возведения в квадрат, поэтому найденный корень можно подставить только в правую часть исходного уравнения.

**119.** Корень, конечно, на знак не влияет, но подкоренное выражение должно быть неотрицательным, а в задании 1) оно ещё не может обращаться в нуль.

**120.** В заданиях 1)—3), 7) и 8) следует рассматривать два случая: а) когда выражение без корня меньше нуля, достаточно, чтобы выражение под корнем не было отрицательным; б) когда выражение без корня больше или равно нулю, обе части неравенства можно возвести в квадрат. В заданиях 4)—6) не забудьте о том, что выражение под корнем должно быть неотрицательным.

**123.** 6) Число  $a$  может принимать только неположительные значения, поэтому  $\sqrt[4]{a^4} = |a| = -a$ . 8) И здесь  $a$  принимает только неположительные значения. Поэтому

$$\sqrt[6]{-a^{13}} = -a \sqrt[6]{-a}.$$

**124.** 3) Следует «подстраховаться» на случай отрицательных значений  $a$ :  $\sqrt[12]{a^4} = \sqrt[3]{|a|}$ . 7), 8) Подумайте, какое число, положительное или отрицательное, возводится в квадрат под знаком корня.

**128.** Введением вспомогательной переменной приведите к квадратному уравнению.

**129.** Возведите обе части равенства в квадрат. Преобразуйте данное выражение под правую часть формулы.

**130.** Произведение суммы на разность равно, как известно, разности квадратов.

**131.** Иррациональные уравнения с квадратными корнями решаются возведением в квадрат, а с кубическими — в куб. Полезно помнить, что  $(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$ .

**132.** Чтобы найти неизвестные по их сумме и произведению, удобно составить квадратное уравнение, корнями которого являются неизвестные.

**133.** Ведите вспомогательную переменную.

**134.** Приведите корни к общему показателю.

**135.** Выражение под корнем с большим показателем постараитесь представить в виде квадрата.

**141.** Представьте данное равенство в виде равенства степеней числа 2 и перейдите к равенству показателей.

**150.** 1), 2) Попробуйте сократить дробь на  $a$  в некоторой степени. 5), 6) Попробуйте упростить каждую дробь отдельно.

**153.** С помощью вспомогательных переменных сведите уравнения к квадратным, которые не должны иметь положительных корней.

## Глава 3

### Показательная и логарифмическая функции

**160.**  $a^{-6}$  и  $a^6$  можно найти, зная  $a^2$ .

**164.** Найдите квадрат искомого выражения.

**167.** Приведите обе части уравнения к одному основанию и приравняйте показатели.

**168.** 1)–6) Страйтесь выносить такой множитель, чтобы в скобках остались целые числа; 7), 8) разнесите по разным частям равенства степени с одинаковыми основаниями.

**169.** Сведите к квадратным уравнениям, вводя вспомогательную переменную.

**170.** 1), 2) Запишите первое уравнение системы в виде равенства степеней с одинаковыми основаниями; 3) в первом уравнении системы примените формулу сокращённого умножения; 4) в первом уравнении системы разнесите переменные по разным частям равенства и подумайте о свойствах функции, значения которой равны, соответственно, левой и правой частям равенства.

**171.** 1)–4) Запишите правую часть равенства в виде степени и воспользуйтесь монотонностью показательной функции; 5), 6) примените метод интервалов; 7), 8) воспользуйтесь тем, что левая и правая части равенств задают функции с разным характером монотонности; 9), 10) степени с одинаковыми показателями можно делить друг на друга.

**172.** Сведите задачу к решению квадратного неравенства.

**173.** Речь идёт о числе положительных корней уравнения  $y^2 - ay + a - 1 = 0$ , которое при всех значениях  $a$  имеет корень, равный 1.

**178.** 1)–4) Используйте определение логарифма. 5), 6) Решите квадратное уравнение относительно логарифма.

**180.** Запишите обе части неравенства в виде степеней с одним и тем же основанием.

**183.** Подумайте, как изменится значение логарифма, если его основание изменить на 1.

**184.** В 3)–8) не забывайте, что основание логарифма не может быть равно 1.

**185.** 1) Разделите почленно на  $9^x$ .

**186.** Обратите внимание на характер монотонности функций, задаваемых выражениями, стоящими в разных частях равенств.

**187.** Перейдите к показательной форме равенства.

**188.** Представьте обе части неравенства в виде логарифмов с одинаковыми основаниями и воспользуйтесь свойством монотонности логарифмической функции.

**189.** Проверьте, что координаты найденной по рисунку точки пересечения графиков удовлетворяют уравнениям, за дающим функции. При записи ответов к неравенствам не за-

будьте об областях определения функций — найденные решения должны принадлежать их пересечению, т. е. одновременно обеим областям.

**190.** Не забудьте, что выражение под знаком логарифма может принимать только положительные значения. Можно сразу выделить соответствующую часть координатной прямой, а затем уже рассматривать интервалы.

**191.** Рассмотрите два случая: когда основание логарифма меньше 1 и когда больше. Не забудьте об ОДЗ!

**192.** Не забудьте, что выражение под знаком логарифма должно быть положительное.

**194.** 6), 7) Перейдите к логарифмам с каким-нибудь одним основанием; 8)  $\frac{1}{\sqrt{2} + 1} = \frac{\sqrt{2} - 1}{(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1)} = \sqrt{2} - 1$ .

**198.** 1) Представьте обе части в виде степеней с основанием 3 и найдите сумму арифметической прогрессии; 2) перейдите к логарифмам с основанием 10.

**199.** Сравните отдельно с числами 2 и 3.

**200.** Достаточно рассмотреть случай, когда логарифмы положительны. Примените свойство суммы обратно пропорциональных переменных.

**201.** Рассмотрите разность логарифмов.

**202.** Область допустимых значений переменной (ОДЗ) — это множество чисел, для каждого из которых каждое из выражений имеет смысл. Выполняя преобразования, старайтесь получить логарифмы с одинаковыми основаниями.

**203.** Подумайте, по какому основанию логарифмировать уравнение. 11)  $x$  может принимать и значение 1.

**204.** Представьте левую часть уравнения в виде степени с основанием 20.

**205.** Найдите логарифмы  $a^{\log_b c}$  и  $c^{\log_b a}$  по основанию  $b$ .

**207.** 1)—3) Потенцируйте неравенство с учётом монотонности логарифмической функции; 4) приведите к квадратному неравенству относительно  $\log_{\frac{1}{3}}(3^x - 1)$ ; 5) приведите

к квадратному неравенству относительно  $\log_3(4^x + 1)$ ; 7), 8)—10) рассмотрите случаи, когда основание логарифма меньше и когда больше 1.

## Г л а в а 4

### Тригонометрические функции и их свойства

**249.** Используйте результаты № 246.

**262.** Представьте  $\sin \phi - \operatorname{tg} \phi$  как  $\frac{\sin \phi(\cos \phi - 1)}{\cos \phi}$ .

**285.** Следует учесть ограниченность множества значений арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса.

**286.** См. указание к № 280.

**288.** Отнеситесь к этим уравнениям как к квадратным.

**312.** 5), 6) Рассмотрите выражение в правой части равенства как квадратный трёхчлен относительно  $\sin x$  и подумайте, на каком промежутке его рассматривать.

**315.** Рассмотрите выражение в правой части равенства как квадратный трёхчлен относительно  $\sin x$  и подумайте, при каком значении синуса его значение наименьшее.

**316.** Рассмотрите выражение в правой части равенства как квадратный трёхчлен и подумайте, какой должна быть абсцисса вершины соответствующей параболы.

**352.** Необходимо и достаточно, чтобы сумма квадратов чисел была равна 1.

**358.** 9), 10) Возведите обе части уравнения в квадрат. Зная произведение и сумму, можно составить вспомогательное квадратное уравнение с помощью теоремы Виета.

**360.** 1) Возведите в квадрат обе части данного равенства. 2) Возведите в квадрат равенство, полученное в первом задании.

**362.** 1) *Способ 1.* Рассмотрите единичную окружность с центром в начале координат. Для точки этой окружности, находящейся в I координатной четверти (угол поворота острый), доказываемое утверждение сводится к очевидному сравнению суммы катетов с гипотенузой, равной 1.

*Способ 2.* Сравните с 1 квадрат суммы синуса и косинуса угла I четверти.

**366.** Представьте углы следующим образом:

1)  $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$ ; 2)  $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$ ; 3)  $105^\circ = 60^\circ + 45^\circ$  и примените формулы синуса и косинуса суммы и разности.

**372.** 1) Представьте  $\sin 48^\circ$  как  $\sin(23^\circ + 25^\circ)$  и примените формулу синуса суммы.

**379.** Воспользуйтесь тем, что  $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$ .

**408.** В процессе преобразований обратите внимание на границы, в которых заключены аргументы тригонометрических функций, и каковы по знаку их значения.

**411.** Представьте аргумент синуса в виде суммы.

**412.** 4) Используйте формулу косинуса двойного угла.

**413.** Умножьте равенство на  $8 \sin 20^\circ$ .

**436.** 6) Представьте правую часть равенства следующим образом:  $-\cos \frac{x}{2} = \cos \left( \pi - \frac{x}{2} \right)$ .

**440.** 1) Упростите левую часть уравнения. 2) Сведите к квадратному уравнению. 3) Решите разложением на множители. 4) Однородное уравнение. 5) Используйте формулы: разности квадратов и разности и суммы косинусов. 6) Используйте вынесение общего множителя и формулу косинуса двойного угла. 7) Разделите уравнение на 2 и примените одну из двух формул: косинуса разности или синуса суммы двух аргументов. 8) Решайте или по формуле разности косинусов, или используя условие равенства косинусов. 9) Однородное уравнение. 10) Используйте способ группировки для разложения на множители. 11) Сведите к квадратному уравнению. 12) Однородное уравнение. 13) Сверните по формуле синуса суммы. 14) Сведите к однородному уравнению. 15) Примените формулы приведения. 16) Разделите на 2 и используйте одну из формул: косинуса суммы или синуса разности. 17) Примените формулы: разности квадратов и косинуса двойного угла. 18) Разложите на множители способом группировки.

**445.** Преобразуйте правую часть, вводя вспомогательный угол.

**446.** 2) Преобразуйте показатель степени числа 4 к виду  $\frac{1}{2}(1 - \operatorname{tg} x)$ . 4) Перейдите к синусам и косинусам. Когда будете переходить от простейшего тригонометрического уравнения к показательному, не забудьте, что показательная функция принимает только положительные значения.

## Глава 5

### Элементы теории вероятностей и комбинаторики

**482.** Комбинации, число которых нужно найти, чтобы ответить на вопросы задачи, связаны только с составом вытащенной из колоды шестёрки карт. Значит, комбинации карт являются сочетаниями.

а) Туза можно выбрать 4 способами, а остальные 5 карт придётся выбирать из 32 карт, которые не являются тузами.

б) Чтобы найти число возможностей вытащить хотя бы одного туза, можно из общего числа всех вариантов вычесть число тех из них, в которых среди шести карт нет ни одного туза.

в) Если из колоды вынуть всех четырёх тузов, то остаётся добрать 2 карты из оставшихся 32.

**490.** Левая часть равенства — сумма коэффициентов:

1) двучлена  $a + b$  в пятой степени;

2) двучлена  $a - b$  в степени  $n$ . Из формулы бинома Ньютона при  $a = b = 1$  получим доказываемое равенство.

## Глава 6

### Повторение

**495. 6), 7)** Рассмотрите квадратный трёхчлен от вспомогательной переменной и подумайте, какие значения она может принимать. 8), 9) Подумайте, на каком промежутке функция возрастает, а на каком — убывает. 10)  $3^x + 3^{-x}$  — сумма обратно пропорциональных переменных, которая минимальна при равенстве их значений.

**497. 5), 6)** Рассматривайте интервалы на тригонометрическом круге.

**504. 7)—9)** Сравните наибольшее значение одной части равенства с наименьшим значением другой.

**505.** Не забывайте об области значений  $y$ ; д) с помощью формул приведения перейдите к нужной функции.

**506. 1)** Представьте все части неравенства как арксинусы и воспользуйтесь свойством монотонности арксинуса; 2) решите неравенство как квадратное относительно арккосинуса и, с учётом области значений арккосинуса, используйте свойство его монотонности.

**507.** Рассмотрите две точки, симметричные относительно прямой  $y = x$ . Сравните их абсциссы и ординаты.

**523.** Постройте график функции  $y = |4 + 2|x| - x^2|$  и определите, сколько общих точек он имеет с прямой  $y = a$  в зависимости от значения  $a$ .

своей магнитной волны в земле и в атмосфере, поэтому  
имеет большое практическое значение для аэронавигации.  
Для этого применяют различные способы измерения радио-  
излучения, которое излучают все живые организмы и некоторые  
вещи. Важнейшим из них является измерение радиопомех, вы-  
званных излучением живых организмов. Для измерения радиопомех  
используются радиопомехометры. Их основным элементом является  
антенна, которая направлена на излучающий объект. Испы-  
тываемый объект излучает радиоволны, которые попадают на антенну и  
передаются в блок обработки (БО). Блок обработки (БО) определяет  
частоту излучения и излучаемую мощность. В зависимости от мощности излучения и частоты излучения БО определяет

## РЕШЕНИЯ

### Глава 1

#### Функции и графики

**13.** Высота коробки равна  $x$ , а в основании её квадрат со стороной  $10 - 2x$ . По формуле объёма прямоугольного параллелепипеда имеем  $V = x(10 - 2x)^2 = x(2(5 - x))^2 = 4x(5 - x)^2$ .

**14.**  $\frac{x}{3} = \frac{4-y}{4}$ ,  $y = 4 - \frac{4}{3}x$ ,  $P = 2(x+y) = 8 - \frac{2}{3}x$ . Понятно,

что  $x$  — число положительное и заведомо меньше, чем катет, равный 3.

**18. 3) д)** При всех  $x < 0$  значение выражения  $x + |x|$  равно 0 и, следовательно, попадает в указанную область определения. При  $x \geq 0$  имеем  $x + |x| = 2x$ , значения которого попадают в указанный промежуток при  $0 \leq x \leq 1$ .

**36.** Пусть прямая пересекает соответствующую ветвь гиперболы в точках с абсциссами  $a$  и  $b$ . Тогда должно выполняться равенство:  $\frac{1}{a} + a = \frac{1}{b} + b$ . Отсюда  $a - b = \frac{a - b}{ab}$  и  $ab = 1$ , поскольку  $a \neq b$ . Следовательно, прямая должна пересекать гиперболу в точках  $\left(a; \frac{1}{a}\right)$  и  $\left(\frac{1}{a}; a\right)$ , симметричных относительно прямой  $y = x$ . Значит, и сама секущая симметрична этой прямой и имеет угловой коэффициент  $k = -1$ .

**57. Доказательство.** Для любых  $x_1$  и  $x_2$ , входящих в промежуток  $L$ , из условия  $x_1 < x_2$  следует, что  $f(x_1) < f(x_2)$  и  $g(x_1) < g(x_2)$ . Складывая два верных неравенства одного знака, получаем верное неравенство:  $f(x_1) + g(x_1) < f(x_2) + g(x_2)$ ,

а значит, функция  $y = f(x) + g(x)$  на промежутке  $L$  возрастает, что и требовалось доказать.

**62.** В № 60 вы доказали, что функция  $y = -f(x)$  убывает на  $[a; b]$ . Сумма двух убывающих на  $[a; b]$  функций убывает (доказательство аналогично № 57), значит,  $y = g(x) + (-f(x))$  убывает на  $[a; b]$ . На концах отрезка эта функция принимает значения разных знаков, значит, в силу непрерывности она имеет на этом промежутке нуль. Этот нуль, вследствие монотонности функции, является единственным, т. е. уравнение  $f(x) = g(x)$  имеет на  $(a; b)$  единственный корень, что и требовалось доказать.

**63.** Возможность отсутствия корней можно проиллюстрировать примером. А для доказательства единственности заметим, что из условия  $x_1 > x_0$ , где  $f(x_0) = g(x_0)$  следует, что  $f(x_1) > f(x_0) = g(x_0) > g(x_1)$ , а из условия  $x_1 < x_0$  следует, что  $f(x_1) < f(x_0) = g(x_0) < g(x_1)$ . Значит, при  $x_1 \neq x_0$   $f(x_1) \neq g(x_1)$ , т. е.  $x_0$  — единственный корень, что и требовалось доказать.

**77.** 1) Точка  $x = a$  оси абсцисс расположена над параболой, значит, значение квадратного трёхчлена  $x^2 - 2x + a$  в ней отрицательно:  $a^2 - 2a + a < 0$ ,  $a^2 - a < 0$ ,  $a(a - 1) < 0$ ,  $0 < a < 1$ . 2) Уравнение будет иметь единственный положительный корень в трёх случаях: 1)  $D = 0$  и  $x_0 > 0$ ; 2) корни имеют разные знаки, т. е.  $a - 1 < 0$ ; 3) один из корней равен нулю, а второй положителен, т. е.  $a - 1 = 0$  и  $a > 0$ . Имеем: 1)  $D = a^2 - 4a + 4 = 0$ ,  $(a - 2)^2 = 0$ ,  $a = 2$ . При этом  $x_0 = 1 > 0$ , что удовлетворяет требованию случая; 2)  $a - 1 < 0$ ,  $a < 1$ ; 3)  $a - 1 = 0$ ,  $a = 1$ . При этом  $x_2 = 1 > 0$  — удовлетворяет требованию случая. Окончательно получаем:  $a \leqslant 1$ ,  $a = 2$ .

**79.** 3) Большему положительному значению подкоренного выражения соответствует меньшее значение функции  $y$ . Своё наибольшее значение подкоренное выражение принимает при  $x = \frac{-1}{2 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)} = 2$ . Это значение принадлежит промежутку

$[-1; 3]$  и равно 4. Значит, наименьшее значение  $y(2) = \frac{6}{\sqrt{4}} = 3$ .

Чем дальше  $x$  от числа 2, тем меньше значение подкоренного выражения. На указанном промежутке самая удалённая от 2 точка — это левый конец промежутка. Значение подкоренно-

го выражения при  $x = -1$ , наименьшее на указанном промежутке, равно  $\frac{7}{4}$ . Значит, наибольшее значение

$$y(-1) = \frac{6}{\sqrt{7/4}} = \frac{12}{\sqrt{7}}.$$

**80.** Функция  $S(x)$  определена при всех  $x$ , при которых существует прямоугольник, т. е. при  $0 < x < 3$ . Обозначим длину другой стороны прямоугольника буквой  $a$ , тогда  $S = ax$ .

Из подобия треугольников имеем:  $\frac{a}{3-x} = \frac{4}{3}$ ,  $a = \frac{4(3-x)}{3} = 4 - \frac{4}{3}x$ , следовательно,  $S(x) = 4x - \frac{4}{3}x^2$ . Наибольшее

значение квадратный трёхчлен  $4x - \frac{4}{3}x^2$  принимает при

$x = \frac{-4}{2 \cdot \left(-\frac{4}{3}\right)} = \frac{3}{2}$ , принадлежащем  $D(S)$ , значит, наиболь-

шее значение функции  $S(x)$  равно  $S\left(\frac{3}{2}\right) = 3$ . Получаем

$0 < S(x) \leq 3$ .

Ответ:  $D(S) = (0; 3)$ ,  $E(S) = (0; 3]$ .

## Глава 2

### Степени и корни

**87.** 5) Не существует, так как степень  $(-2)^n$  оканчивается на 4 только при чётном  $n$  ( $n = 2, 6, 10, \dots$ ), а такие степени положительны. 6) Не существует,  $(-3)^n$  оканчивается на 1 только при  $n$  кратном четырём, а такие степени положительны.

**90.** 2) При нечётном  $n$  функция является возрастающей. Если её график пересекает ось ординат в верхней полуплоскости, то в IV четверти у него не будет точек, а если в нижней, то точек не будет во II четверти.

**118.** 3) Возведём обе части уравнения в квадрат.

$$9x^2 + 16x = 4x^2 + 9 + 12x, 5x^2 + 4x - 9 = 0, x_1 = 1, x_2 = -\frac{9}{5}.$$

Проверка: если  $x = 1$ , то  $2x + 3 = 2 + 3 \geq 0$ , следовательно,

1 — корень; при  $x = -\frac{9}{5}$ :  $2x + 3 = -\frac{18}{5} + 3 < 0$ , следовательно,  $-\frac{9}{5}$  не является корнем. Ответ: 1. 7) Введём новую переменную  $y = x + 1$ , тогда  $\sqrt{3y + 4} - \sqrt{y} = 2$ . Уединим корень:  $\sqrt{3y + 4} = \sqrt{y} + 2$ ,  $3y + 4 = y + 4 + 4\sqrt{y}$ ,  $2\sqrt{y}(\sqrt{y} - 2) = 0$ ,  $y = 0$  или  $y = 4$ . Проверка: при  $y = 0$ :  $\sqrt{y} + 2 = \sqrt{0} + 2 \geq 0$ , следовательно, 0 — корень; если  $y = 4$ , то  $\sqrt{3y + 4} - \sqrt{y} = \sqrt{16} - \sqrt{4} = 2$ , следовательно,  $y = 4$  — корень. Вернёмся к переменной  $x$ :  $x + 1 = 0$ ,  $x = -1$ ;  $x + 1 = 4$ ,  $x = 3$ . Ответ:  $-1; 3$ . 8) Введём новую переменную  $y = 3 - x$ , тогда  $\sqrt{12 + y} + \sqrt{y} = 6$ . Уединим корень:  $\sqrt{12 + y} = 6 - \sqrt{y}$ ,  $12 + y = 36 + y - 12\sqrt{y}$ ,  $\sqrt{y} = 2$ ,  $y = 4$ . Проверка: если  $y = 4$ , то получим  $6 - \sqrt{y} = 6 - \sqrt{4} \geq 0$ , следовательно, 4 — корень. Вернёмся к переменной  $x$ :  $3 - x = 4$ ,  $x = -1$ . Ответ:  $-1$ .

**120.** 2) Если  $x < 0$ , должно быть  $2x + 15 \geq 0$ , т. е.  $\begin{cases} x < 0, \\ 2x + 15 \geq 0, \end{cases}$  т. е.  $\begin{cases} x < 0, \\ x \geq -7,5. \end{cases}$  Если  $x \geq 0$ , должно быть

$$2x + 15 \geq x^2, \quad \text{т. е.} \quad \begin{cases} x \geq 0, \\ 2x + 15 \geq x^2, \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq 0, \\ x^2 - 2x - 15 \leq 0, \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq 0, \\ -3 \leq x \leq 5, \end{cases} \quad 0 \leq x \leq 5.$$

Объединяя результаты обоих случаев,

получаем  $-7,5 \leq x \leq 5$ . 4) Должно быть  $\begin{cases} x \geq 1, \\ 3x + 7 \geq 0, \\ x^2 - 2x + 1 \geq 3x + 7, \end{cases}$

$$\begin{cases} x \geq 1, \\ x \geq -\frac{7}{3}, \\ x^2 - 5x - 6 \geq 0, \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq 1, \\ x \geq -\frac{7}{3}, \\ x \leq -1 \text{ или } x \geq 6, \end{cases} \quad x \geq 6.$$

7) Случай 1.  $\begin{cases} 3x - 1 < 0, \\ 5x^2 + x \geq 0, \end{cases}$   $\begin{cases} x < \frac{1}{3}, \\ x \leq -\frac{1}{5} \text{ или } x \geq 0, \end{cases}$

$$x \leq -\frac{1}{5} \text{ или } 0 \leq x < \frac{1}{3}.$$

**Случай 2.**  $\begin{cases} 3x - 1 \geq 0, \\ 5x^2 + x \geq 9x^2 + 1 - 6x, \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq \frac{1}{3}, \\ 4x^2 - 7x + 1 \leq 0, \end{cases}$

$$\begin{cases} x \geq \frac{1}{3}, \\ \frac{7 - \sqrt{33}}{8} \leq x \leq \frac{7 + \sqrt{33}}{8}. \end{cases}$$

Прикидка показывает, что  $\frac{7 - \sqrt{33}}{8} < \frac{1}{3} < \frac{7 + \sqrt{33}}{8}$ , значит, решением системы является промежуток  $\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{7 + \sqrt{33}}{8}$ .

Объединяя результаты, получаем ответ:

$$x \leq -\frac{1}{5}, 0 \leq x \leq \frac{7 + \sqrt{33}}{8}.$$

**128. 2)** Введём вспомогательную переменную  $y = \sqrt[6]{3x^4 + 16}$ , где  $y \geq \sqrt[6]{16}$ , тогда  $y^2 - y - 2 = 0$ ,  $y_1 = 2$ ,  $y_2 = -1$  — не удовлетворяет условию введения переменной  $y$ . Вернёмся к переменной  $x$  и получим:  $\sqrt[6]{3x^4 + 16} = 2$ ,  $3x^4 + 16 = 64$ ,  $3x^4 = 48$ ,  $x^4 = 16$ ,  $x_1 = -2$ ,  $x_2 = 2$ . **6)** Введём вспомогательную переменную  $y = \sqrt[3]{x} + 2$ , тогда  $\frac{4}{y} + \frac{y+1}{5} = 2$ ,  $y^2 - 9y + 20 = 0$ ,  $y_1 = 4$ ,  $y_2 = 5$ . Вернёмся к переменной  $x$ :  $\sqrt[3]{x} + 2 = 4$ ,  $x = 8$ ;  $\sqrt[3]{x} + 2 = 5$ ,  $x = 27$ . Ответ: 8; 27.

**131. 2)** Возведём равенство в куб:

$$x + 10 - x + 9 - 3\sqrt[3]{(x+10)(x-9)}(\sqrt[3]{x+10} - \sqrt[3]{x-9}) = 1;$$

$$19 - 3\sqrt[3]{x^2 + x - 90} = 1; \sqrt[3]{x^2 + x - 90} = 6; x^2 + x - 90 = 216;$$

$$x + x - 306 = 0; x_1 = -18; x_2 = 17. \text{ Ответ: } -18; 17.$$

**132. 1)**  $\begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{y}} = \frac{4}{3}, \\ xy = 9, \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\sqrt{y} + \sqrt{x}}{\sqrt{xy}} = \frac{4}{3}, \\ xy = 9. \end{cases}$  Поскольку из второго

уравнения  $\sqrt{xy} = 3$ , имеем:  $\begin{cases} \sqrt{y} + \sqrt{x} = 4, \\ \sqrt{xy} = 3. \end{cases}$  Составим

вспомогательное квадратное уравнение, корнями которого

являются  $\sqrt{x}$  и  $\sqrt{y}$ :  $z^2 - 4z + 3 = 0$ ,  $z_1 = 1$ ,  $z_2 = 3$ .  $\begin{cases} \sqrt{x_1} = 1, \\ \sqrt{y_1} = 3, \end{cases}$

$$\begin{cases} x_1 = 1, & \sqrt{x_2} = 1, \\ y_1 = 9; & \sqrt{y_2} = 3, \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = 9, \\ y_2 = 1. \end{cases}$$

Ответ:  $x_1 = 1$ ,  $y_1 = 9$ ;  $x_2 = 9$ ,  $y_2 = 1$ .

3) Возведём первое уравнение в куб, учитывая при этом информацию из второго уравнения:  $\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} = 4$ ,  $x + y + 3\sqrt[3]{xy}(\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y}) = 64$ ;  $28 + 3\sqrt[3]{xy} \cdot 4 = 64$ ;  $3\sqrt[3]{xy} = 3$ ;  $xy = 27$ . Произведение неизвестных 27, а их сумма 28. Составим вспомогательное квадратное уравнение, корнями которого являются неизвестные:  $z^2 - 28z + 27 = 0$ ,  $z_1 = 1$ ,  $z_2 = 27$ .

$$\begin{cases} x_1 = 1, & x_2 = 27, \\ y_1 = 27, & y_2 = 1. \end{cases}$$

Ответ:  $x_1 = 1$ ,  $y_1 = 27$ ;  $x_2 = 27$ ,  $y_2 = 1$ .

4) Преобразуем первое уравнение системы, учитывая, что из второго уравнения  $\sqrt[6]{xy} = 2$  и  $\sqrt[6]{x^2y^2} = 4$ :  $\sqrt[3]{x}\sqrt[3]{y} + \sqrt[3]{y}\sqrt[3]{x} = 12$ ,  $\sqrt[6]{x^2y^2} + \sqrt[6]{x^3y^2} = 12$ ,  $\sqrt[6]{x^2y^2}(\sqrt[6]{x} + \sqrt[6]{y}) = 12$ ,  $4(\sqrt[6]{x} + \sqrt[6]{y}) = 12$ ,  $\sqrt[6]{x} + \sqrt[6]{y} = 3$ . Сумма корней равна 3, а их произведение равно 2. Составим вспомогательное квадратное уравнение:  $z^2 - 3z + 2 = 0$ ,  $z_1 = 1$ ,  $z_2 = 2$ .

$$\begin{cases} \sqrt[6]{x_1} = 1, & x_1 = 1, \\ \sqrt[6]{y_1} = 2, & y_1 = 64, \end{cases} \quad \begin{cases} \sqrt[6]{x_2} = 1, & x_2 = 1, \\ \sqrt[6]{y_2} = 2, & y_2 = 64. \end{cases}$$

Ответ:  $x_1 = 1$ ,  $y_1 = 64$ ;  $x_2 = 64$ ,  $y_2 = 1$ .

**133.** 1) Введём вспомогательную переменную  $y = \sqrt[6]{x} + \sqrt[6]{x}$  ( $y \geq 0$ ), тогда задача сводится к определению всех  $a$ , при которых уравнение  $y^2 + 4y + a = 0$  имеет единственный неотрицательный корень. Это может произойти в трёх случаях: а) когда единственный корень уравнения является неотрицательным; б) когда корни уравнения имеют разные знаки и в) когда один корень равен 0, а другой отрицателен. Рассмотрим эти случаи. а)  $D = 0$ ,  $4 - a = 0$ ,  $a = 4$ . Корень  $x_0 = -2$  отрицателен, что не удовлетворяет условию случая. б)  $D > 0$  и произведение корней отрицательно:

$$\begin{cases} 4 - a > 0, & a < 4, \\ a < 0, & a < 0. \end{cases}$$

в) Один из корней равен 0, значит,  $a = 0$ . Тогда другой корень равен  $-4$ , что удовлетворяет условию случая. Объединяя результаты, получаем Ответ:  $a \leq 0$ . 2) Введём вспомогательную переменную  $x = \sqrt[4]{2z + 4\sqrt{z} + 1}$ , где  $x \geq 1$ , так как  $z \geq 0$ . Тогда задача сводится к определению всех  $a$ , при которых уравнение  $x^2 - 3x + a = 0$  имеет единственный корень, больший или равный единице. Это может произойти в трёх случаях: а) когда единственный корень уравнения больше или равен 1; б) один из корней больше, а другой — меньше 1; в) когда один из корней 1, а второй меньше 1. Рассмотрим эти случаи. а)  $D = 0$ ;  $9 - 4a = 0$ ,  $a = \frac{9}{4}$ . Корень  $x_0 = 1,5$

удовлетворяет условию случая; б) 1 находится между корнями квадратного трёхчлена  $x^2 - 3x + a$  тогда и только тогда, когда его значение при  $x = 1$  отрицательно:  $1 - 3 + a < 0$ ,  $a < 2$ . в) Один из корней трёхчлена равен 1 при  $a = 2$ . В этом случае второй корень равен 2, что не удовлетворяет условию случая. Объединяя результаты, получаем Ответ:  $a < 2$ ,

$$a = \frac{9}{4}.$$

$$\begin{aligned} 135. \quad 2) \quad & 10\sqrt[10]{7 + 4\sqrt{3}} \cdot 5\sqrt[5]{\sqrt{3} - 2} = 10\sqrt[10]{(\sqrt{3} + 2)^2} \cdot 5\sqrt[5]{\sqrt{3} - 2} = \\ & = 5\sqrt[5]{\sqrt{3} + 2} \cdot 5\sqrt[5]{\sqrt{3} - 2} = 5\sqrt[5]{3 - 4} = -1. \end{aligned}$$

$$141. \quad 5) \quad \text{в)} \quad (\sqrt[3]{4})^x = \sqrt[5]{16}, \quad 2^{\frac{2}{3}x} = 2^{\frac{4}{5}}, \quad \frac{2}{3}x = \frac{4}{5}, \quad x = \frac{6}{5},$$

$$(\sqrt[3]{4})^{\frac{6}{5}} = \sqrt[5]{16}.$$

152. 1) Введём новую переменную  $y = x + 3$ , где  $y \geq 0$ , и перепишем уравнение в виде  $(y + 6)^{\frac{1}{6}} = y^{\frac{1}{2}}$ . Возведём уравнение в шестую степень:  $y + 6 = y^3$ ,  $y^3 - y - 6 = 0$ . Попробуем подобрать целый корень. Видим, что уравнение имеет корень 2. Разложим левую часть уравнения на множители  $(y - 2)(y^2 + 2y + 3) = 0$ . Поскольку квадратный трёхчлен  $y^2 + 2y + 3$  корней не имеет, то число 2 — единственный корень уравнения  $y^3 - y - 6 = 0$ . Это число удовлетворяет условию введения переменной  $y$ . Вернёмся к переменной  $x$ :  $x + 3 = 2$ ,  $x = -1$ .

2)  $2\sqrt{\frac{y+1}{y}} = \frac{-2y-3}{y+1}$ . Возведём уравнение в квадрат:

$$\frac{4y+1}{y} = \frac{(2y+3)^2}{(y+1)^2}, 4(y+1)^3 = y(2y+3)^2,$$

$$4y^3 + 12y^2 + 12y + 4 = 4y^3 + 12y^2 + 9y, 12y + 4 = 9y,$$

$$3y = -4, y = -\frac{4}{3}.$$

**153.** 1) Случай 1. Пусть  $y = x^{\frac{1}{2}}$ , где  $y \geq 0$ . Нужно найти все значения  $a$ , большие или равные нулю, при которых квадратный трёхчлен  $y^2 - 2ay - a + 2$  не имеет корней. Найдём значения  $a$ , при которых трёхчлен не имеет корней, и объединим их с теми значениями  $a$ , при которых корни трёхчлена  $y^2 - 2ay - a + 2$  отрицательны (включая возможность совпадения корней, т. е. единственности корня квадратного уравнения  $y^2 - 2ay - a + 2 = 0$ ).  $D < 0$ ,  $a^2 + a - 2 < 0$ ,  $-2 < a < 1$ .

Случай 2. Сумма отрицательных корней отрицательна, а их произведение — положительно. По теореме Виета, если корни существуют, то должно быть  $2a < 0$  и  $-a + 2 > 0$ . Требовать существования корней ( $D \geq 0$ ) излишне, так как их отсутствие приведёт всего лишь к дублированию найденных

в (1) значений  $a$ :  $\begin{cases} 2a < 0, \\ -a + 2 > 0, \end{cases} \begin{cases} a < 0, \\ a < 2, \end{cases} a < 0$ . Объединяя найденные в (1) и (2) множества значений  $a$ , получаем ответ:  $a < 1$ .

## Глава 3

### Показательная и логарифмическая функции

**166.**  $2^x + \frac{1}{2^x} - 2 = \frac{(2^x)^2 - 2 \cdot 2^x + 1}{2^x} = \frac{2^x - 1}{2^x} \geq 0$ , что и требовалось доказать.

**167.** 7)  $5^x - \sqrt{3x-5} = 5^3, x - \sqrt{3x-5} - 3 = 0, 3x - 3\sqrt{3x-5} - 9 = 0, (3x-5) - 3\sqrt{3x-5} - 4 = 0, \sqrt{3x-5} = -1$  или  $\sqrt{3x-5} = 4, 3x-5 = 16, x = 7$ . Примечание. Это решение несколько экзотичное — можно было решить, перенося корень в правую часть, возводя в квадрат и проверяя корни.

**168.** 3)  $5^x - 1(5^3 - 4 \cdot 5^2 + 4) = 29$ ,  $5^x - 1 = 1$ ,  $x = 1$ ;  
 6)  $0,2^{x-1}(0,2^{-2} - 3 \cdot 0,2^{-1} - 6) = 500$ ,  $\left(\frac{1}{5}\right)^{x-1} = 125$ ,  $5^{1-x} = 5^3$ ,  
 $x = -2$ ; 8)  $4^x + 4^{x-0,5} = 3^{x+0,5} + 3^{x-0,5}$ ,  $4^{x-0,5}(2 + 1) = 3^{x-0,5}(3 + 1)$ ,  $4^{x-1,5} = 3^{x-1,5}$ ,  $x = 1,5$ .

**169.** 4)  $5 \cdot 5^x + \frac{5}{5^x} - 26 = 0$ ,  $5 \cdot 5^{2x} - 26 \cdot 5^x + 5 = 0$ ,  $5^x = 5$  или  
 $5^x = 5^{-1}$ ,  $x_1 = 1$ ,  $x_2 = -1$ ;

6) Поскольку  $2^x = 4 \cdot 2^{x-2}$ , имеем  $4 \cdot 2^{x-2} - 13 \cdot 2^{\frac{x-2}{2}} - 12 = 0$ .  
 Пусть  $y = 2^{\frac{x-2}{2}}$ , где  $y > 0$ , тогда  $4y^2 - 13y - 12 = 0$ . С учётом  
 условия  $y > 0$  имеем:  $y = 4$ ,  $2^{\frac{x-2}{2}} = 2^2$ ,  $x = 6$ ; 5) поскольку  
 $5^x \neq 0$ , умножая данное уравнение на  $5^x$ , получаем  
 $5 \cdot 5^{2x} - 2 \cdot 5^x - 3 = 0$ ,  $5^x = 1$  или  $5^x = -\frac{3}{5}$ . Второе равенство не  
 выполняется ни при каких значениях  $x$ , а первое даёт  $x = 0$ .

**170.** 3)  $\begin{cases} 17\left(3^{\frac{x}{2}} - 2^y\right) = 17, \\ 3^{\frac{x}{2}} + 2^y = 17; \end{cases}$        $\begin{cases} 3^{\frac{x}{2}} - 2^y = 1, \\ 3^{\frac{x}{2}} + 2^y = 17; \end{cases}$        $\begin{cases} 3^{\frac{x}{2}} - 2^y = 1, \\ 2 \cdot 3^{\frac{x}{2}} = 18; \end{cases}$   
 $\begin{cases} 2^y = 8, \\ 3^{\frac{x}{2}} = 9; \end{cases}$        $\begin{cases} y = 3, \\ x = 4; \end{cases}$  4)  $\begin{cases} u + (\sqrt{5})^u = v + (\sqrt{5})^v, \\ u + v^2 = 12. \end{cases}$  В силу возраста-

ния, функция  $y = x + (\sqrt{5})^x$  принимает равные значения при одном и том же значении аргумента, т. е.  $u = v$ , следова-  
 тельно,  $\begin{cases} u = v, \\ u^2 + u - 12 = 0; \end{cases}$   $\begin{cases} u = v, \\ u = -4 \text{ или } u = 3; \end{cases}$   $u = v = -4$  или  
 $u = v = 3$ .

**171.** 10)  $\left(\frac{3}{5}\right)^x + \left(\frac{4}{5}\right)^x < 1$ . Выражение в левой части равен-  
 ства задаёт убывающую функцию, которая принимает значе-  
 ние 1 при  $x = 2$ . Следовательно, её значения меньше 1 при  
 $x > 2$ .

**172.** 2) Должно быть:

$$0,5^x - \frac{4}{0,5^x} - 3 > 0; 0,5^{2x} - 3 \cdot 0,5^x - 4 > 0; 0,5^x < -1 \text{ или}$$

$0,5^x > 4$ ;  $0,5^x > 0,5^{-2}$ . В силу убывания показательной функции с основанием 0,5 имеем  $x < -2$ .

**180. 4)**  $(\sqrt{15} - 3)^x \leqslant 6$ ,  $(\sqrt{15} - 3)^x \leqslant (\sqrt{15} - 3)^{\log_{(\sqrt{15}-3)} 6}$ .

Поскольку показательная функция с основанием  $\sqrt{15} - 3$  убывает ( $3 < \sqrt{15} < 4$ , значит,  $0 < \sqrt{15} - 3 < 1$ ), имеем:  $x \geqslant \log_{(\sqrt{15}-3)} 6$ .

**184. 8)**  $\log_{2-\frac{x}{3}} \frac{3x-1}{4-x}$ . Область определения составляют решения системы

$$\begin{cases} 2 - \frac{x}{3} > 0, \\ 2 - \frac{x}{3} \neq 1, \\ \frac{3x-1}{4-x} > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x < 6, \\ x \neq 3, \\ \frac{3x-1}{4-x} > 0. \end{cases}$$




Рис. 127

Используем метод интервалов (рис. 127).

Ответ:  $\frac{1}{3} < x < 3; 3 < x < 4$ .

**185. 5)**  $4^x - 6^{x+1} + 5 \cdot 9^x = 0$ ,  $\left(\frac{2}{3}\right)^{2x} - 6 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{2x} + 5 = 0$ ,  
 $\left(\frac{2}{3}\right)^{x_1} = 1$ ,  $\left(\frac{2}{3}\right)^{x_2} = 5$ ,  $x_1 = 0$ ,  $x_2 = \log_{\frac{2}{3}} 5$ .

**188. 7)** Рассмотрим два случая: а)  $0 < x - 5 < 1$ ,  $5 < x < 6$ :  $0 < x + 2 < x - 5$  — нет решений; б)  $x - 5 > 1$ ,  $x > 6$ :  $x + 2 > x - 5$  — все числа, удовлетворяющие условию случая, т. е.  $x > 6$ . **8)** Поскольку значения выражения  $x - 2$ , стоящего под знаком логарифма, положительны, то  $x > 2$ . При этом основание  $x + 1$  логарифма больше 1. Имеем:

$$\begin{cases} x > 2, \\ \log_{x+1}(x-2) < \log_{x+1} \frac{1}{x+1}, \end{cases} \quad \begin{cases} x > 2, \\ x-2 < \frac{1}{x+1}, \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 2, \\ (x-2)(x+1) < 1, \end{cases} \quad \begin{cases} x > 2, \\ x^2 - x - 3 < 0, \end{cases} \quad \begin{cases} x > 2, \\ \frac{1-\sqrt{13}}{2} < x < \frac{1+\sqrt{13}}{2}, \end{cases}$$

$$2 < x < \frac{1+\sqrt{13}}{2}.$$




Рис. 128




Рис. 129

**190.** 2) Выражения, стоящие в числителе и в знаменателе дроби, существуют при  $x > 0$  и обращаются в нуль при  $x = 4$  и  $x = 9$ . Отметим это на координатной прямой и проведём линию знаков (рис. 128). Ответ:  $0 < x < 4$ ,  $x > 9$ . 5) Выражения, стоящие в числителе и в знаменателе дроби, существуют при  $x > 3$  и при  $x < -3$ . Знаменатель обращается в нуль при  $x = \pm\sqrt{10}$ , числитель — при  $x = 10$  и  $x = -1$ . Отметим это на координатной прямой и проведём линию знаков (рис. 129). Ответ:  $-\sqrt{10} < x < -3$ ,  $\sqrt{10} < x \leq 10$ .

**191.** 4)  $\log_{x+4} \frac{x^2-1}{3} < \log_{x+4} 1$ . Рассмотрим два случая:

- а)  $0 < x+4 < 1$  и б)  $x+4 > 1$ . а)  $-4 < x < -3$ :  $\frac{x^2-1}{3} > 1$ ,  $x^2 > 4$ ,  $x > 2$  или  $x < -2$ . С учётом условия а) имеем  $-4 < x < -3$ ; б)  $x > -3$ :  $0 < \frac{x^2-1}{3} < 1$ ,  $1 < x^2 < 4$ ,  $1 < x < 2$  или  $-2 < x < -1$ .

При всех этих значениях условие б) выполняется. Объединяя результаты а) и б):  $-4 < x < -3$ ,  $-2 < x < -1$ ,  $1 < x < 2$ ; б)  $\log_{x-2}(x+10) < \log_{x-2}(x-2)^2$ . а)  $0 < x-2 < 1$ ,  $2 < x < 3$ . При этом  $x+10 > x^2-4x+4$ ,  $x^2-5x-6 < 0$ ,  $-1 < x < 6$ . С учётом условия а) имеем:  $2 < x < 3$ ; б)  $x-2 > 1$ ,  $x > 3$ . При этом  $0 < x+10 < x^2-4x+4$ ,

$$\begin{cases} x+10 > 0, \\ x^2-5x-6 > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x > -10, \\ x < -1 \text{ или } x > 6. \end{cases}$$

С учётом условия б) имеем:  $x > 6$ . Объединяя результаты а) и б), получаем Ответ:  $2 < x < 3$ ,  $x > 6$ . 7)  $\log_{2x}(x^2-5x+6) < \log_{2x}(2x)$ . а)  $0 < 2x < 1$ ,  $0 < x < 0,5$ . При этом:

$$x^2-5x+6 > 2x > 0,$$

$$\begin{cases} x^2-7x+6 > 0, \\ 2x > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x < 1 \text{ или } x > 6, \\ x > 0; \end{cases} \quad 0 < x < 1 \text{ или } x > 6.$$

С учётом условия а) получаем  $0 < x < 0,5$ . б)  $2x > 1$ ,  $x > 0,5$ . При этом  $0 < x^2-5x+6 < 2x$ ,

$$\begin{cases} x^2-5x+6 > 0, \\ x^2-7x+6 < 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x < 2 \text{ или } x > 3, \\ 1 < x < 6; \end{cases} \quad 1 < x < 2 \text{ или } 3 < x < 6.$$

Эти значения удовлетворяют условию б). Ответ:  $0 < x < 0,5; 1 < x < 2; 3 < x < 6$ . 9)  $\log_{x^2 - 6x + 9}(x - 1) \leq \log_{x^2 - 6x + 9}(x^2 - 6x + 9)$ . а)  $0 < x^2 - 6x + 9 < 1; 0 < (x - 3)^2 < 1; x \neq 3$  и  $2 < x < 4$ . При этом  $x - 1 \geq x^2 - 6x + 9; x^2 - 7x + 10 \leq 0; 2 \leq x \leq 5$ . С учётом условия а) имеем:  $2 < x < 3; 3 < x < 4$ ; б)  $x^2 - 6x + 9 > 1; (x - 3)^2 > 1; x < 2$  или  $x > 4$ . При этом  $0 < x - 1 \leq x^2 - 6x + 9$ ,

$$\begin{cases} x - 1 > 0, \\ x^2 - 7x + 10 \geq 0; \end{cases} \begin{cases} x > 1, \\ x \leq 2 \text{ или } x \geq 5; \end{cases} 1 < x \leq 2, x \geq 5. \text{ С учётом условия б) получим: } 1 < x < 2, x \geq 5.$$

Ответ:  $1 < x < 2; 3 < x < 4; x \geq 5$ .

11)  $\log_{x^2 + 3x - 4}(x + 4) > \log_{x^2 + 3x - 4} 1$ .

а)  $0 < x^2 + 3x - 4 < 1$ :

$$\begin{cases} x^2 + 3x - 4 > 0, \\ x^2 + 3x - 5 < 0; \end{cases} \begin{cases} x < -4 \text{ или } x > 1, \\ \frac{-3 - \sqrt{29}}{2} < x < \frac{-3 + \sqrt{29}}{2}; \end{cases}$$

$\frac{-3 - \sqrt{29}}{2} < x < -4$  или  $1 < x < \frac{-3 + \sqrt{29}}{2}$ . При этом:  $0 < x + 4 < 1; -4 < x < -3$ . Эти значения  $x$  не удовлетворяют условию а);

б)  $x^2 + 3x - 4 > 1; x^2 + 3x - 5 > 0, x < \frac{-3 + \sqrt{29}}{2}$  или

$x > \frac{-3 + \sqrt{29}}{2}$ . При этом  $x + 4 > 1, x > -3$ . Поскольку

$\frac{-3 + \sqrt{29}}{2} > \frac{-3 + \sqrt{25}}{2} = 1 > -3$ , с учётом условия б) имеем:

$$x > \frac{-3 + \sqrt{29}}{2}.$$

12)  $\log_{x+4}(x^2 + 3x - 4) < \log_{x+4} 1$ . а)  $0 < x + 4 < 1, -4 < x < -3$ .

При этом:  $x^2 + 3x - 4 > 1, x^2 + 3x - 5 > 0, x < \frac{-3 + \sqrt{29}}{2}$  или

$x > \frac{-3 + \sqrt{29}}{2}$ , что не удовлетворяет условию а). б)  $x + 4 > 1$ ,

$x > -3$ . При этом  $0 < x^2 + 3x - 4 < 1$ ,

$$\begin{cases} x^2 + 3x - 4 > 0, \\ x^2 + 3x - 5 < 0; \end{cases} \begin{cases} x < -4 \text{ или } x > 1, \\ \frac{-3 - \sqrt{29}}{2} < x < \frac{-3 + \sqrt{29}}{2}, \end{cases}$$

$\frac{-3 - \sqrt{29}}{2} < x < -4$  или  $1 < x < \frac{-3 + \sqrt{29}}{2}$ . С учётом условия б)

имеем  $1 < x < \frac{-3 + \sqrt{29}}{2}$ .

**192.** 2)  $\log_{0,6} \log_{0,5} (x+1) > \log_{0,6} 1$ . Поскольку логарифмические функции с основаниями 0,6 и 0,5 убывают, а выражение под знаком логарифма может принимать лишь положительные значения, имеем:

$$0 < \log_{0,5} (x+1) < 1; \log_{0,5} 1 < \log_{0,5} (x+1) < \log_{0,5} 0,5;$$

$$1 > x+1 > 0,5; -0,5 < x < 0.$$

3)  $\log_{0,2} \log_2 (2x+3) < \log_{0,2} 5$ . В силу убывания логарифмической функции с основанием 0,2 имеем:  $\log_2 (2x+3) > 5$ ;  $\log_2 (2x+3) > \log_2 32$ . Поскольку логарифмическая функция с основанием 2 возрастает, имеем:  $2x+3 > 32$ ;  $x > 14,5$ . 6) Поскольку логарифмические функции с основаниями 3 и 32 возрастают, а с основанием 0,2 убывают, имеем:

$$\log_3 \log_{0,2} \log_{32} \frac{x-1}{x+5} > \log_3 1; \log_{0,2} \log_{32} \frac{x-1}{x+5} > \log_{0,2} 0,2;$$

$$0 < \log_{32} \frac{x-1}{x+5} < \frac{1}{5}; \log_{32} 1 < \log_{32} \frac{x-1}{x+5} < \log_{32} 2; 1 < \frac{x-1}{x+5} < 2;$$

$$\begin{cases} \frac{6}{x+5} < 0, \\ \frac{x+11}{x+5} > 0, \end{cases} \quad x < -11.$$

$$\begin{aligned} 194. 5) \log_5 10 + 4 \log_5 10 + 3 \log_5 10 - 8 \log_5 2 = \\ = 8 (\log_5 10 - \log_5 2) = 8 \cdot \log_5 5 = 8; \end{aligned}$$

$$8) \log_3 49 \cdot \log_{\sqrt{7}} 5 \cdot \log_{25} 27 =$$

$$= \frac{\log_3 49 \cdot \log_3 5 \cdot \log_3 27}{\log_3 \sqrt{7} \cdot \log_3 25} = \frac{2 \log_3 7 \cdot \log_3 5 \cdot 3}{0,5 \log_3 7 \cdot 2 \log_3 5} = 6.$$

$$\begin{aligned} 7) \log_3 4 \cdot \log_4 5 \cdot \log_5 6 \cdot \log_6 7 \cdot \log_7 8 \cdot \log_8 9 = \\ = \log_3 4 \cdot \frac{\log_3 5}{\log_3 4} \cdot \frac{\log_3 6}{\log_3 5} \cdot \dots \cdot \frac{\log_3 9}{\log_3 8} = \log_3 9 = 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8) \log_{\sqrt{2}-1} (\sqrt{3} - \sqrt[4]{8}) + \log_{\sqrt{2}-1} (\sqrt{3} + \sqrt[4]{8}) = \\ = \log_{\sqrt{2}-1} (3 - \sqrt{8}) = \log_{\sqrt{2}-1} (2 - 2\sqrt{2} + 1) = \\ = \log_{\sqrt{2}-1} (\sqrt{2} - 1)^2 = 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & 195. 6) \log_6 3 = \log_6 (6 : 2) = 1 - a; 7) \log_3 2 = \frac{1}{\log_2 3} = \\
 & = \frac{1}{(\log_2 6) - 1} = \frac{1}{\frac{1}{a} - 1} = \frac{a}{1 - a}; 9) \log_{48} 54 = \frac{\log_6 54}{\log_6 48} = \\
 & = \frac{\log_6 6 + \log_6 3^2}{\log_6 6 + \log_6 2^3} = \frac{1 + 2\log_6 3}{1 + 3\log_6 2} = \frac{1 + 2(1 - a)}{1 + 3a} = \frac{3 - 2a}{1 + 3a}.
 \end{aligned}$$

$$196. 2) \log_{30} 8 = \frac{3 \lg 2}{\lg 3 + \lg 10} = \frac{3 \lg (10 - \lg 5)}{\lg 3 + 1} = \frac{3 - 3a}{b + 1}.$$

$$198. 1) 3^{2+5+\dots+3n-1} = 3^{40}, \frac{2+(3n-1)}{2} n = 40,$$

$$3n^2 + n - 80 = 0, n = 5; 2) \frac{\lg 3 \cdot \lg 4 \cdot \lg 5 \cdot \dots \cdot \lg (n+1)}{\lg 2 \cdot \lg 3 \cdot \lg 4 \cdot \dots \cdot \lg n} = 10,$$

$$\lg (n+1) = 10 \lg 2, n+1 = 2^{10}, n = 1024 - 1 = 1023.$$

$$\begin{aligned}
 & 199. \log_3 2 + \log_2 3 - 2 = \log_3 \frac{2}{3} + \log_2 \frac{3}{2} > \log_3 \frac{2}{3} + \log_3 \frac{3}{2} = \\
 & = \log_3 1 = 0, \log_3 2 + \log_2 3 < \log_3 3 + \log_2 4 = 1 + 2 = 3, \text{ что и} \\
 & \text{требовалось доказать.}
 \end{aligned}$$

200. Сумма обратно пропорциональных переменных минимальна, когда значения переменных равны.  $\log_x 7 = \log_7 x$ ,  $\log_7 x = 1$ ,  $\log_7 x = 1$ ,  $\log_x 7 + \log_7 x = 2$ . Перемена знаков у логарифмов (они имеют одинаковые знаки) на модуль их суммы не влияет.

$$\begin{aligned}
 & 201. 1) \log_7 8 - \log_8 9 = (\log_7 8 - 1) - (\log_8 9 - 1) = \\
 & = \log_7 \frac{8}{7} - \log_8 \frac{9}{8} > \log_8 \frac{8}{7} - \log_8 \frac{9}{8} > \log_8 \frac{9}{8} - \log_8 \frac{9}{8} = 0, \text{ значит,} \\
 & \log_7 8 > \log_8 9.
 \end{aligned}$$

$$202. 8) \lg (5^x + x - 20) = \lg \frac{10^x}{2^x}, 5^x + x - 20 = 5^x, x = 20;$$

$$15) \log_3 x \cdot \frac{1}{2} \log_3 x \cdot \frac{1}{3} \log_3 x \cdot \frac{1}{4} \log_3 x = \frac{2}{3}, \log_3^4 x = 16,$$

$$\log_3 x = 2 \text{ или } \log_3 x = -2, x = 9 \text{ или } x = \frac{1}{9}; 16) 3x - 3x \log_6 2 =$$

$$= \log_6 (3^{3x} + x^2 - 9), 3x(\log_6 6 - \log_6 2) = \log_6 (3^{3x} + x^2 - 9),$$

$$\log_6 3^{3x} = \log_6 (3^{3x} + x^2 - 9), 3^{3x} = 3^{3x} + x^2 - 9, x^2 - 9 = 0,$$

$$x_1 = -3, x_2 = 3; 17) 2 \log_x 2 + 6 \log_{2x} 2 = 3, \frac{2}{\log_2 x} + \frac{6}{1 + \log_2 x} = 3,$$

$$2 + 2 \log_2 x + 6 \log_2 x = 3 \log_2 x + 3 \log_2^2 x,$$

$3 \log_2^2 x - 5 \log_2 x - 2 = 0$ ,  $\log_2 x = 2$  или  $\log_2 x = -\frac{1}{3}$ ,  $x = 4$  или

$x = \frac{1}{3\sqrt{2}}$ ; 18)  $(2 + 2 \log_x 3) \cdot \log_3^2 x = 4$ ,  $\left(1 + \frac{1}{\log_3 x}\right) \log_3^2 x = 2$ ,

$\log_3^2 x + \log_3 x - 2 = 0$ ,  $\log_3 x = 1$  или  $\log_3 x = -2$ ,  $x = 3$  или  $x = \frac{1}{9}$ .

**203.** 6)  $\log_2^2 x = 2 + \log_2 x$ ,  $\log_2 x = -1$  или  $\log_2 x = 2$ ,  $x = 0,5$  или  $x = 4$ ; 10)  $5^{x+1} \cdot 5 = 3^{2x+1}$ ;  $5^{x+2} = 3^{2x+1}$ ,  $(x+2) \log_3 5 =$

$= 2x + 1$ ,  $x = \frac{1 - 2 \log_3 5}{\log_3 5 - 2} = \frac{\log_3 \frac{25}{9}}{\log_3 \frac{5}{9}} = \log_5 \frac{3}{25}$ ; 11) нужно найти по-

ложительные корни уравнения. Рассмотрим два случая:

а)  $x = 1$  и б)  $x \neq 1$ ; а)  $\sqrt[n]{1} = (\sqrt[n]{1})^1$  — верное равенство, значит, 1 — корень уравнения; б) логарифмируем по основанию  $x$ :

$\sqrt[n]{x} = \frac{x}{n}$ ,  $n = x^{1 - \frac{1}{n}}$ ,  $n = x^{\frac{n-1}{n}}$ ,  $x = n^{\frac{n}{n-1}}$ ; 12)  $\log_9(x+3) \cdot \log_3 x = \log_3 x \cdot \log_3 5$ ,  $\log_3 x = 0$  или  $\frac{1}{2} \log_3(x+3) = \log_3 5$ ,  $x = 1$  или  $x = 22$ .

**207.** 2) ОДЗ неравенства  $-\frac{3}{2} < x < \frac{2}{3}$ . Для этих значений  $x$ :  $\log_{\sqrt{3}-1}(-2x^2 + 5x + 12) < \log_{\sqrt{3}-1}(2 - 3x)$ . Поскольку  $\sqrt{3} - 1 < 1$ , логарифмическая функция с основанием  $\sqrt{3} - 1$  убывающая, следовательно,  $-2x^2 + 5x + 12 > 2 - 3x$ ,  $2x^2 - 8x - 10 < 0$ ,  $-1 < x < 5$ . С учётом ОДЗ получаем ответ:  $-1 < x < \frac{2}{3}$ . 4)  $-\log_{\frac{1}{3}}(3^x - 1)(2 + \log_{\frac{1}{3}}(3^x - 1)) + 3 > 0$ . Неравенство  $-2 \log_{\frac{1}{3}}(3^x - 1) - \log_{\frac{1}{3}}^2(3^x - 1) + 3 > 0$  решаем как квадратное относительно  $\log_{\frac{1}{3}}(3^x - 1)$ :  $-3 < \log_{\frac{1}{3}}(3^x - 1) < 1$ . Учитывая убывание логарифмической функции с основанием  $\frac{1}{3}$ ,

получаем  $\frac{1}{3} < 3^x - 1 < 27$ ,  $\frac{4}{3} < 3^x < 28$ . Учитывая возрастание показательной функции с основанием 3, получаем ответ:  $\log_3 \frac{4}{3} < x < \log_3 28$ ;

$$6) \frac{1}{2} \log_2 \log_2 x + \log_2 \left( \frac{1}{2} \log_2 x \right) \leq 0,$$

$$\frac{1}{2} \log_2 \log_2 x - 1 + \log_2 \log_2 x \leq 0, \quad \frac{3}{2} \log_2 \log_2 x \leq 1,$$

$$\log_2 \log_2 x \leq \frac{2}{3}, \quad \log_2 \log_2 x \leq \log_2 2^{\frac{2}{3}}, \quad 0 < \log_2 x \leq 2^{\frac{2}{3}}, \quad 1 < x \leq 2^{\frac{3}{4}}.$$

7) ОДЗ неравенства:  $0 < x < 1$ ,  $1 < x < 2$ . Для этих  $x$ :  $\log_x(x+1) < \log_x(2-x)^{-1}$ . Рассмотрим два случая: а)  $0 < x < 1$ . Логарифмическая функция с основанием  $x$  убывает, значит,  $x+1 > \frac{1}{2-x}$ . Поскольку  $2-x > 0$ , имеем:  $(x+1)(2-x)-1 > 0$ ,  $x^2 - x - 1 < 0$ ,  $\frac{1-\sqrt{5}}{2} < x < \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ . С учётом условия а) получаем:  $0 < x < 1$ ; б)  $1 < x < 2$ . Логарифмическая функция с основанием  $x$  возрастает, значит,  $x+1 < \frac{1}{2-x}$ . Поскольку  $2-x > 0$ , имеем:  $(x+1)(2-x)-1 < 0$ ,  $x^2 - x - 1 > 0$ ,  $x < \frac{1-\sqrt{5}}{2}$  или  $x > \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ . С учётом условия б) получаем:  $\frac{1+\sqrt{5}}{2} < x < 2$ .

Ответ:  $0 < x < 1$ ,  $\frac{1+\sqrt{5}}{2} < x < 2$ .

8)  $\log_x \log_2(4^x - 12) \leq \log_x x$ . ОДЗ:  $4^x - 12 > 1$ ,  $x > \log_4 13 > 1$ . При этом логарифмическая функция с основанием  $x$  возрастает, значит,  $\log_2(4^x - 12) \leq x$ ,  $\log_2(4^x - 12) \leq 2^x$ . Логарифмическая функция с основанием 2 возрастает, значит,  $4^x - 12 \leq 2^x$ ;  $4^x - 2^x - 12 \leq 0$ ;  $-3 \leq 2^x \leq 4$ ;  $2^x \leq 2^2$ . Показательная функция с основанием 2 возрастает, значит,  $x \leq 2$ . С учётом ОДЗ получаем ответ:  $\log_4 13 < x \leq 2$ .

9)  $\log_{0,5} \log_2 \log_{x-1} 9 > \log_{0,5} 1$ . Поскольку логарифмическая функция с основанием 0,5 убывает, а выражение под знаком логарифма должно принимать положительные значе-

ния, имеем:  $0 < \log_2 \log_{x-1} 9 < 1$ ,  $\log_2 1 < \log_2 \log_{x-1} 9 < \log_2 2$ . Поскольку логарифмическая функция с основанием 2 возрастает, имеем:  $1 < \log_{x-1} 9 < 2$ . Рассмотрим два случая:

а)  $0 < x - 1 < 1$ ,  $1 < x < 2$ :  $\log_{x-1}(x-1) < \log_{x-1} 9 < \log_{x-1}(x-1)^2$ . Поскольку логарифмическая функция с основанием  $x-1$

убывает (условие случая), имеем:  $\begin{cases} x-1 > 9, \\ 9 > (x-1)^2; \end{cases}$   $\begin{cases} x > 10, \\ |x-1| < 3; \end{cases}$ ; нет решений;

б)  $x - 1 > 1$ ,  $x > 2$ :  $\log_{x-1}(x-1) < \log_{x-1} 9 < \log_{x-1}(x-1)^2$ . Поскольку логарифмическая функция с основанием  $x-1$  воз-

растает (условие случая), имеем:  $\begin{cases} x-1 < 9, \\ 9 < (x-1)^2; \end{cases}$   $\begin{cases} x < 10, \\ |x-1| > 3. \end{cases}$

С учётом условия случая получаем:  $4 < x < 10$ .

**Ответ:**  $4 < x < 10$ .

10) Заметим, что  $\log_{x^2} x^4 = 2$ . Имеем  $\log_3 \log_{x^2} 2 > \log_3 1$ . Поскольку логарифмическая функция с

основанием 3 возрастает, то  $\log_{x^2} 2 > 1$ . Рассмотрим два слу-

чая: а)  $x^2 < 1$ . Поскольку логарифмическая функция с основанием  $x^2$  убывает, имеем  $x^2 > 2$ , что не удовлетворяет условию случая; б)  $x^2 > 1$ . Поскольку логарифмическая функция с основанием  $x^2$  возрастает, имеем:  $x^2 < 2$ . С учётом условия

б) имеем  $1 < x^2 < 2$ , откуда получаем

**ответ:**  $-\sqrt{2} < x < -1$ ,  $1 < x < \sqrt{2}$ .

## Глава 4

### Тригонометрические функции и их свойства

**220.** 1)  $360 : (30 + 45) = 4,8$  (с). За время между двумя последовательными встречами первая точка поворачивается вокруг центра окружности на  $30^\circ \cdot 4,8 = 144^\circ$ . Пусть через  $x$  поворотов на  $144^\circ$  точка оказалась на месте старта, тогда  $144^\circ \cdot x = 360^\circ \cdot n$ . Найдём наименьшее натуральное значение  $x$ , удовлетворяющее этому уравнению:  $144x = 360 \cdot n$ ,  $2x = 5n$ , значит,  $x$  делится на 5. Наименьшее натуральное число, кратное 5, — это 5:  $2 \cdot 5 = 5 \cdot 2$ . Таким образом, каждая пятая встреча точек происходит в стартовой точке. Значит, кроме неё есть ещё 4 точки встречи, т. е. всего 5 точек встречи. 3) Через  $4,8 \cdot 5 = 24$  (с).

**234.** 1) Вокруг своей оси Земля поворачивается примерно за 24 часа.  $2\pi : 24 \approx 3,14 : 12 \approx 0,26$  (рад/ч).

**239.** 5)  $\beta = 5,5 \approx \frac{5,5 \cdot 180^\circ}{3,14} \approx 315^\circ$ . Угол  $\beta$  в IV четверти, значит,  $\cos \beta > 0$ ,  $\sin \beta < 0$ .

**271.** 2) в) Общий вид уравнения прямой  $y = kx + b$ , где  $k = \operatorname{tg} \alpha$ , а  $\alpha$  — угол между заданной прямой и осью абсцисс.  $\alpha = 120^\circ$ ,  $\operatorname{tg} 120^\circ = -\sqrt{3}$ . Если прямая проходит через точку, заданную координатами, то в уравнение прямой подставляем её координаты и находим значение  $b$ :  $3 = -\sqrt{3} \cdot 0 + b$ ,  $b = 3$ . Уравнение прямой  $y = -\sqrt{3}x + 3$ .

**288.** 1)  $4 \sin^2 x + 5 \sin x + 1 = 0$ . Решим это уравнение как квадратное относительно  $\sin x$ :  $\sin x = -1$  и  $\sin x = -\frac{1}{4}$ ,  $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n$ ,  $x = -\arcsin \frac{1}{4} + 2\pi n$ ,  $x = \pi + \arcsin \frac{1}{4} + 2\pi n$ ,  $n$  — любое целое число.

**300.** 2)  $\arccos \left( \cos \frac{24\pi}{7} \right) = \arccos \left( \cos \left( 4\pi - \frac{4\pi}{7} \right) \right) =$   
 $= \arccos \left( \cos \frac{4\pi}{7} \right) = \frac{4\pi}{7}$ ; 3)  $\arccos (\sin 6) = \arccos \left( \cos \left( \frac{\pi}{2} - 6 \right) \right) =$   
 $= \arccos \left( \cos \left( \frac{\pi}{2} - 6 + 2\pi \right) \right) = \frac{\pi}{2} - 6 + 2\pi$ .

**315.** Решением будут те и только те значения  $a$ , при которых функция  $t = z^2 + 6z + a$  принимает только положительные значения на промежутке  $[-1; 1]$  ( $z = \sin 2x$ ). Абсцисса вершины параболы  $t = z^2 + 6z + a$  равна  $-3$ . Для выполнения требования задачи достаточно, чтобы значение функции  $t$  в точке  $z = -1$  было положительным:  $(-1)^2 + 6(-1) + a > 0$ ,  $a > 5$ .

**316.** 1) Чтобы на интервале у квадратного трёхчлена было наименьшее или наибольшее значение, абсцисса вершины соответствующей параболы должна принадлежать этому интервалу. Находим границы интервала:  $\sin \left( -\frac{\pi}{6} \right) = -\frac{1}{2}$ ,

$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ . Абсцисса вершины параболы равна  $a$ , значит,  $-0,5 < a < 0,5$ . 2) Рассматриваем правую часть равенства как квадратный трёхчлен относительно косинуса на промежутке

значений косинуса  $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}; 1\right]$ . Чтобы трёхчлен на этом промежутке имел наименьшее значение, абсцисса вершины соответствующей параболы должна или принадлежать этому промежутку, или быть больше его правой границы. Значит,  $a > \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

$$\mathbf{333. 1)} \sin 2x \geqslant \frac{1}{2}, \frac{\pi}{6} + 2\pi n \leqslant 2x \leqslant \frac{5\pi}{6} + 2\pi n,$$

$\frac{\pi}{12} + \pi n \leqslant x \leqslant \frac{5\pi}{12} + \pi n, n \in \mathbf{Z}; 2) \sin\left(3x + \frac{\pi}{2}\right) \leqslant -\frac{1}{2}$ . По формулам приведения  $\sin\left(3x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos 3x, \cos 3x \leqslant -\frac{1}{2}, \frac{2\pi}{3} + 2\pi k \leqslant 3x \leqslant \frac{4\pi}{3} + 2\pi k, \frac{2\pi}{9} + \frac{2\pi}{3}k \leqslant x \leqslant \frac{4\pi}{9} + \frac{2\pi}{3}k, k \in \mathbf{Z}$ .

**350.** 1) Соседние нули функции отстоят друг от друга на  $\frac{\pi}{2}$ , значит, период функции не может быть меньше  $\frac{\pi}{2}$ . Проверим, является ли данное число периодом, т. е. выполняется ли равенство  $\operatorname{tg} 2\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \operatorname{tg} 2x = \operatorname{tg} 2\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ . Равенства верны, следовательно,  $\frac{\pi}{2}$  — период функции  $y = \operatorname{tg} 2x$ .

**358. 9)** Возведём уравнение в квадрат и после упрощения получим:  $\sin x \cdot \cos x = \frac{12}{25}$ . По теореме, обратной теореме Виета,  $\sin x$  и  $\cos x$  — корни квадратного уравнения  $z^2 - \frac{7}{5}z + \frac{12}{25} = 0, z_1 = \frac{3}{5}, z_2 = \frac{4}{5}$ . Один из корней — косинус, а другой — синус, или наоборот. Имеем:  $\cos x = \frac{3}{5}$  или  $\cos x = \frac{4}{5}$ .

Ответ:  $\pm \arccos \frac{3}{5} + 2\pi n, \pm \arccos \frac{4}{5} + 2\pi n, n \in \mathbf{Z}$ .

**362. 2)** Рассмотрим разность  $(\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x) - 2 = \operatorname{tg} x + \frac{1}{\operatorname{tg} x} - 2 = \frac{\operatorname{tg}^2 x - 2\operatorname{tg} x + 1}{\operatorname{tg} x} = \frac{(\operatorname{tg} x - 1)^2}{\operatorname{tg} x} \geqslant 0$ , поскольку тангенс острого угла положителен, значит, для любого

острого угла  $x$  полученное неравенство верно, т. е.  $\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x \geq 2$ . Что и требовалось доказать.

$$\begin{aligned} \mathbf{377.} & \sin(\alpha + \beta)\sin(\alpha - \beta) = \\ & = (\sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta)(\sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta) = \\ & = \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \beta - \cos^2 \alpha \cdot \sin^2 \beta = \\ & = (\sin^2 \alpha \cos^2 \beta + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta) - (\cos^2 \alpha \sin^2 \beta + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta) = \\ & = \sin^2 \alpha (\cos^2 \beta + \sin^2 \beta) - \sin^2 \beta (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) = \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta. \end{aligned}$$

**396.** 1. а) Найдём тангенс разности углов, образованных этими прямыми с осью абсцисс:  $\operatorname{tg} \alpha = 2$ ,  $\operatorname{tg} \beta = \frac{1}{3}$ . Подставим значения тангенсов в формулу  $\operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}$ , полу-

$$\text{чим: } \operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{2 - \frac{1}{3}}{1 + 2 \cdot \frac{1}{3}} = 1, \text{ значит, } \alpha - \beta = 45^\circ.$$

**437.** 1) Представим  $\sin \alpha = \cos \beta$  следующим образом:

$$\sin \alpha = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right). \text{ Тогда } \alpha = \beta + \frac{\pi}{2} + 2\pi n \text{ или}$$

$$\alpha = -\beta - \frac{\pi}{2} + \pi(2n+1), n \in \mathbf{Z}. x_1 = -\frac{\pi}{2} - 2\pi n \text{ или } x_2 = \frac{\pi}{14} + \frac{2\pi n}{7},$$

$$n \in \mathbf{Z}. 2) \operatorname{tg} \alpha = \operatorname{ctg} \beta, \operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right). \text{ Тогда } \alpha = -\beta + \frac{\pi}{2} + \pi n.$$

От равенства значений функций  $\operatorname{tg} 2x = \operatorname{ctg} 5x$  перейдём к условию равенства аргументов  $2x = \frac{\pi}{2} - 5x + \pi n$ ,  $2x + 5x =$

$$= \frac{\pi}{2} + \pi n, 7x = \frac{\pi}{2} + \pi n, x = \frac{\pi}{14} + \frac{\pi}{7} n, n \in \mathbf{Z}.$$

**438.** Из данного равенства следует, что точка с координатами  $(x; y)$  лежит на окружности с центром в начале координат и радиусом, равным 1. Но по определению абсцисса точки этой окружности является синусом, а ордината — косинусом некоторого угла поворота  $\varphi$ , т. е.  $\sin \varphi = x$  и  $\cos \varphi = y$ , что и требовалось доказать.

$$\mathbf{440.} 10) (\cos 3x + \cos 7x) + (1 + \cos 10x) = 0;$$

$$2 \cos 5x \cos 2x + 2 \cos^2 5x = 0; 2 \cos 5x \left( 2 \cos \frac{7}{2}x \cos \frac{3}{2}x \right) = 0.$$

$$\cos 5x = 0 \text{ или } \cos \frac{7}{2}x = 0, \text{ или } \cos \frac{3}{2}x = 0.$$

$$18) 1 + \sin x + \cos x + \sin 2x + \cos 2x = 0;$$

$$(1 + \cos 2x) + \sin 2x + (\sin x + \cos x) = 0;$$

$$2 \cos^2 x + 2 \sin x \cos x + (\sin x + \cos x) = 0;$$

$$2 \cos x (\cos x + \sin x) + (\sin x + \cos x) = 0;$$

$$(\sin x + \cos x)(2 \cos x + 1) = 0; \cos x = -\frac{1}{2} \text{ или } \sin x = -\cos x.$$

**441.**  $4 \sin 3x \sin x - 2 \cos 2x + 1 = 0$ . Поскольку

$$2 \sin 3x \cdot \sin x = \cos 2x - \cos 4x, \text{ имеем } 2 \cos 2x - 2 \cos 4x - 2 \cos 2x + 1 = 0; 2 \cos 4x - 1 = 0; \cos 4x = \frac{1}{2}, 4x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n,$$

$$x = \pm \frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}. \text{ Искомый корень уравнения } x = \frac{\pi}{12}.$$

$$\text{443. } \frac{2 \cos^2 x + \cos x}{2 \cos x + 7 \sin^2 x} = -\frac{1}{2};$$

$$\frac{4 \cos^2 x + 2 \cos x + 2 \cos x + 7 \sin^2 x}{2(2 \cos x + 7 \sin^2 x)} = 0,$$

$4 \cos^2 x + 4 \cos x + 7 - 7 \cos^2 x = 0, 3 \cos^2 x - 4 \cos x - 7 = 0, \cos x = -1$ . На отрезке  $[-\pi; \pi]$   $\cos x = -1$  при  $x = \pm \pi$ . Эти значения не обращают знаменатель в нуль.

$$\text{444. 2) } \sqrt{3} \sin x + 2 \cos x = \sqrt{3} + 2 \sin x \cos x;$$

$$\sqrt{3} + 2 \sin x \cdot \cos x - 2 \cos x - \sqrt{3} \sin x = 0;$$

$$\sqrt{3}(1 - \sin x) - 2 \cos x(1 - \sin x) = 0; (1 - \sin x)(\sqrt{3} - 2 \cos x) = 0;$$

$$\sin x = 1 \text{ или } \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}. x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n \text{ или } x = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Из множества решений выбираем те, которые удовлетворяют условию  $0 < x < 2$ :  $x_1 = \frac{\pi}{2}, x_2 = \frac{\pi}{6}$ .

$$\text{446. 2) } \frac{\sin \left( \frac{\pi}{4} - x \right)}{\sqrt{2} \cos x} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} \cos(x - \sin x)}{\sqrt{2} \cos x} = \frac{1}{2} (1 - \operatorname{tg} x). 5 + 2^{\operatorname{tg} x} =$$

$$= 3 \cdot 4^{\frac{1}{2}(1 - \operatorname{tg} x)}; 5 + 2^{\operatorname{tg} x} = 3 \cdot 2^{1 - \operatorname{tg} x}; 2^{\operatorname{tg} x} - 6 \cdot 2^{-\operatorname{tg} x} + 5 = 0.$$

Обозначим  $2^{\operatorname{tg} x} = y$  и найдём положительный корень уравнения  $y - \frac{6}{y} + 5 = 0; y^2 + 5y - 6 = 0; y = 1$ . Вернёмся к переменной  $x$ :  $2^{\operatorname{tg} x} = 1; \operatorname{tg} x = 0; x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$ ; 4) пусть  $2^x = y$ , где  $y > 0$ , тогда  $\frac{1}{\operatorname{tg} y} - \operatorname{tg} y = 2 \operatorname{tg} 2y; \frac{1 - \operatorname{tg}^2 y}{\operatorname{tg} y} = 2 \operatorname{tg} 2y$ ;

$$\operatorname{ctg} 2y = \operatorname{tg} 2y; 2y = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, \text{ где, поскольку значения } y$$

должны быть положительными,  $n = 0, 1, 2, \dots$ ,  $y = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{4}$

( $n = 0, 1, 2, \dots$ ). Вернёмся к переменной  $x$ :  $2^x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{4}$

( $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ ),  $x = \log_2\left(\frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{4}\right)$ , где  $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ .

## Глава 5

### Элементы теории вероятностей и комбинаторики

**447.** Есть 36 равновероятных возможностей вытащить одну карту. В 9 из них карта окажется червой, в 16 — картинкой, в 8 — валетом или королём.

**448.** Всего имеется 6 равновероятных исходов при бросании кости. В четырёх из них число выпавших очков больше 2, в трёх — число очков простое, в двух — кратно 3.

**452. 1)** Возможны два равновероятных варианта рождения детей: ММ и МД. Благоприятный (в рамках задания) первый. Искомая вероятность  $\frac{1}{2}$ .

**2)** Возможны три равновероятных варианта рождения детей: ММ, МД и ДМ. Благоприятный (в рамках задания) первый. Искомая вероятность  $\frac{1}{3}$ .

**453.** Таня ошиблась в самом начале своих рассуждений. Она должна была найти общее число всех равновероятных возможностей, которые имеются при бросании двух монет. Таких возможностей четыре: ОО, ОР, РО, РР. Решка выпадает в трёх из них, значит, вероятность выпадения решки равна  $\frac{3}{4}$ .

**454.** Есть всего четыре равновероятных возможности вытащить карточку и положить её на стол. В трёх из них верхняя сторона карточки окажется белой. Только в одном из этих трёх равновероятных случаев нижняя сторона карточки чёрная. Значит, искомая вероятность равна  $\frac{1}{3}$ .

**456. 1)**  $P_{sp} = \frac{25}{654} \approx 4\%$ ; **2)**  $P_{se} = \frac{48}{654} \approx 7\%$ .

**460.** Из выбранной 1000 зёрен всхожими оказались  $1000 - 27 = 973$  зерна, значит, частота всхожести равна примерно 97%. Это значение и принимаем за приближённую вероятность того, что наугад взятое зерно окажется всхожим.

**461.** Частота выемки чёрного шара примерно равна 70%. Считая вероятность вытащить чёрный шар равной примерно 70%, можно с большой степенью уверенности (но не наверняка, конечно) сказать, что в коробке 7 чёрных шаров.

**462.** Есть четыре возможности выбрать дорогу из пункта *A* в пункт *B*. Каждому варианту этого выбора соответствует три возможности выбрать дорогу из *B* в *C*. По правилу произведения  $4 \cdot 3 = 12$ .

**464.** События, вероятность которых требуется найти в этой задаче, определяются не порядком вытаскивания карт из колоды, а только тем, какие две карты вытащены. Таким образом, комбинации вытащенных карт являются сочетаниями. Все возможные сочетания при вытаскивании карт равновероятны. Их число равно  $C_{52}^2$ .

1) а) В колоде по 13 карт каждой из четырёх мастей. Одну из карт выбираем из 13 бубен, а другую из 39 карт других мастей. По правилу произведения число благоприятных исходов равно  $13 \cdot 39$ , и вероятность события равна

$$\frac{13 \cdot 39}{C_{52}^2} = \frac{13}{34} \approx 0,38.$$

б) В колоде есть 4 туза и 48 других карт, значит, число возможных благоприятных сочетаний равно  $4 \cdot 48$ . Вероятность вытащить только одного туза равна  $\frac{4 \cdot 48}{C_{52}^2} = \frac{32}{221} \approx 0,14$ .

в) Картинки — это валеты, дамы, короли и тузы. Всего в колоде 16 картинок, значит, одну из них можно выбрать 16 способами, а для выбора другой карты остаётся 36 возможностей. Число благоприятных исходов  $16 \cdot 36$ , а соответствующая вероятность равна  $\frac{16 \cdot 36}{C_{52}^2} = \frac{96}{221} \approx 0,43$ .

2) а) Обе карты выбирают из 13 бубен, значит, число благоприятных исходов равно  $C_{13}^2$ . Искомая вероятность равна

$$\frac{C_{13}^2}{C_{52}^2} = \frac{1}{17} \approx 0,06.$$

3) а) Число возможностей складывается из числа вариантов, когда среди карт есть только одна бубна, и из числа вариантов, в которых вытаскиваются две бубны. Эти числа были найдены в заданиях 1) и 2):  $13 \cdot 39 + C_{13}^2$ . Число благоприятных исходов можно найти иначе: вычитая из общего числа исходов  $C_{52}^2$  число «неблагоприятных» исходов  $C_{39}^2$ , когда обе карты выбираются из 39 карт других мастей:  $C_{52}^2 - C_{39}^2$ . Искомая вероятность равна

$$\frac{13 \cdot 39 + C_{13}^2}{C_{52}^2} = \frac{C_{52}^2 - C_{39}^2}{C_{52}^2} = \frac{15}{34} \approx 0,44.$$

**470.** 2) Саша с Колей могут оказаться на любых двух местах из 20. Поскольку важно, на каком месте сидит Коля, а на каком Саша, то общее число вариантов равно  $A_{20}^2$ . На каком бы из 20 мест ни оказался Коля, рядом с ним будет только одно место для Саши. Значит, есть всего 20 вариантов для мальчиков оказаться соседями. Вероятность этого равна

$$\frac{20}{20 \cdot 19} = \frac{1}{19}.$$

**472.** 1) Всего есть  $P_4$  равновероятных исходов, и только в одном из них все письма попадут в свои конверты. Следовательно, вероятность того, что все письма окажутся в нужных конвертах, равна  $\frac{1}{P_4} = \frac{1}{24}$ .

2) Положим письмо Иванову в правильный конверт. Остается 3 письма, которые можно положить в три конверта  $P_3$

способами. Вероятность данного события равна  $\frac{P_3}{P_4} = \frac{1}{4}$ .

3) Письмо для правильного конверта можно выбрать четырьмя способами. Первое из оставшихся трёх в неправильный конверт можно положить двумя способами, в каждом из них второе и третье можно положить в неправильные конверты одним-единственным способом. Получаем всего  $4 \cdot 2 \cdot 1 = 8$  способов. Вероятность события равна  $\frac{8}{P_4} = \frac{1}{3}$ .

4) Два письма, которые положат в правильные конверты, можно выбрать  $C_4^2$  способами, так как важно, какие это письма, а не в каком порядке их выбирают. После того как

будут выбраны два правильных конверта, останется только один-единственный способ положить оставшиеся два в неправильные конверты. Вероятность этого равна  $\frac{C_4^2}{P_4} = \frac{1}{4}$ .

**473.** Задача аналогична примеру 4 пункта 28. Всего  $P_{11}$  способов построиться. Представим себе, что Саша будет становиться в шеренгу последним. Без Саши мальчики могут построиться  $P_{10}$  способами. В каждом из них Саша может встать либо справа, либо слева от Коли. Значит, есть всего  $2 \cdot P_{10}$  вариантов построения, при которых Саша и Коля стоят рядом. Вероятность этого равна  $\frac{2P_{10}}{P_{11}} = \frac{2}{11}$ .

**474.** Любые три из данных пяти точек являются вершинами треугольника. Значит, нужно найти число вариантов выбора 3 элементов из данных 5. Поскольку порядок выбора не важен (например,  $\triangle ABC$  и  $\triangle BAC$  — это один и тот же треугольник), искомое число находим, как число сочетаний из 5 по 3:

$$C_5^3 = \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{3 \cdot 2 \cdot 2} = 5 \cdot 2 = 10.$$

**475.** Выбрав любые 4 вершины, получим четырёхугольник с одной точкой пересечения диагоналей, значит, число таких точек равно  $C_{17}^4$ .

**476.** Достаточно выбрать одну пару, поскольку тем самым определится и вторая пара теннисисток.

**477.** В футбольной команде 11 игроков, включая вратаря. Выбор игроков в первую команду полностью определяет, какие ученики будут играть во второй команде. При этом каждый выбор некоторых 11 игроков даёт точно такое разбиение на команды, что и выбор остальных одиннадцати, поэтому биноминальный коэффициент нужно поделить на 2.

**480. 2)** Пять школьников можно выбрать  $C_{10}^5$  способами. Трёх из оставшихся после этого 5 школьников можно выбрать  $C_5^3$  способами. Оставшиеся два школьника войдут в третью группу. По правилу произведения получаем  $C_{10}^5 \cdot C_5^3$ .

**481. 1)** Всего может быть  $A_{36}^2$  равновероятных исходов. Поскольку в одной масти 9 карт, есть  $A_9^2$  способа вытащить

две карты этой масти, но масть может быть любая из 4, значит, всего есть  $4A_9^2$  благоприятных исходов. Искомая вероятность равна  $\frac{4A_9^2}{A_{36}^2} = \frac{4 \cdot 8 \cdot 9}{35 \cdot 36} = \frac{8}{35}$ .

2) Первую карту можно вытащить 36 способами. После этого в колоде останется ещё три карты того же достоинства в других мастих. Значит, число благоприятных исходов равно  $36 \cdot 3$ , а вероятность вытащить карты одного достоинства равна  $\frac{36 \cdot 3}{A_{36}^2} = \frac{36 \cdot 3 \cdot 34!}{36!} \approx 0,09$ .

3) Достоинства карт равны, как видно в задании 2), в  $36 \cdot 3$  случаях. В остальных  $A_{36}^2 - 36 \cdot 3$  случаях одна из карт старше другой. В половине этих случаев вторая карта старше. Искомая вероятность равна  $\frac{A_{36}^2 - 36 \cdot 3}{2A_{36}^2} = \frac{16}{35}$ .

**483.** Чтобы разыграть билеты между учениками, можно взять 25 одинаковых конвертов и положить в 15 из них билеты.

1) У Коли есть 25 вариантов выбрать конверт и в 15 из них конверт окажется с билетом. Значит, вероятность получить билет у Коли  $\frac{3}{5}$ .

2) У Коли и Саши есть всего  $C_{25}^2$  возможности выбрать конверты. Из них в  $C_{15}^2$  случаях в обоих конвертах окажутся билеты. Значит, вероятность получить билеты у Коли и Саши равна  $\frac{C_{15}^2}{C_{25}^2} = \frac{15 \cdot 14}{25 \cdot 24} = \frac{7}{20}$ .

3) Число вариантов, в которых ни в Колином, ни в Сашином конвертах не окажется билетов, равно  $C_{10}^2$ . Значит, вероятность, что им не достанется билетов, равна

$$\frac{C_{10}^2}{C_{25}^2} = \frac{10 \cdot 9}{25 \cdot 24} = \frac{3}{20}.$$

**488.** Подставим в формулу бинома Ньютона  $x$  вместо  $a$ , 2 вместо  $b$  и 10 вместо  $n$ . Нас интересует член многочлена

стандартного вида, содержащий  $x^7$ . Поскольку  $x^7 = x^{10-3}$ , имеем:

$$\begin{aligned} C_{10}^{10-3} x^{10-3} \cdot 2^3 &= C_{10}^7 x^7 \cdot 8 = \frac{10! \cdot 8}{7!(10-7)!} x^7 = \\ &= \frac{10! \cdot 8}{7!3!} x^7 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 8}{3 \cdot 2} x^7 = 10 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 8 x^7 = 960x^7. \end{aligned}$$

**491.** 1) а)  $C_{12}^4 (-3)^4 x^8 = 495 \cdot 81x^8 = 40\,095x^8$ ;

б)  $C_{12}^2 (-3)^2 x^{10} = 594x^{10}$ .

**492.** Имеем  $C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2} = 45$ ,  $n = 10$ .

Шестой член разложения бинома  $(y^3 + x^5)^{10}$  имеет коэффициент:  $C_{10}^5 = \frac{10!}{5! \cdot 5!} = 252$ .

## Глава 6

### Повторение

**498. 4)** Должно выполняться условие  $x - 5 > 0$ , т. е.  $x > 5$ . Заметим, что для этих значений  $x$  основание логарифма  $\frac{x+4}{x+1}$ , больше 1.

$\log_{\frac{x+4}{x+1}}(x-5) < 1$ ,  $\log_{\frac{x+4}{x+1}}(x-5) < \log_{\frac{x+4}{x+1}}\frac{x+4}{x+1}$ . В силу

возрастания логарифмической функции с основанием больше 1 имеем:  $0 < x - 5 < \frac{x+4}{x+1}$ ,  $\begin{cases} x > 5, \\ (x-5)(x+1) < x+4, \end{cases}$

$\begin{cases} x > 5, \\ x^2 - 5x - 9 < 0, \end{cases} \quad \begin{cases} x > 5, \\ \frac{5-\sqrt{61}}{2} < x < \frac{5+\sqrt{61}}{2}, \end{cases} \quad 5 < x < \frac{5+\sqrt{61}}{2}$ .

**505. 1) г)**  $\sin 10 = \sin(3\pi + (10 - 3\pi)) = -\sin(10 - 3\pi) = \sin(3\pi - 10)$ . Поскольку  $-\frac{\pi}{2} \leqslant 3\pi - 10 \leqslant \frac{\pi}{2}$  имеем:

$$\arcsin(\sin 10) = \arcsin(\sin(3\pi - 10)) = 3\pi - 10.$$

**4) д)**  $\operatorname{arcctg}(\operatorname{tg} 2) = \operatorname{arcctg}\left(\operatorname{ctg}\left(\frac{3\pi}{2} - 2\right)\right) = \frac{3\pi}{2} - 2$ .

**506. 1)**  $\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) < \arcsin(x^2 - 1,5x) \leqslant \arcsin\frac{1}{2}$ . Поскольку арксинус является возрастающей функцией, имеем:

$$-\frac{1}{2} < x^2 - 1,5x \leq \frac{1}{2}; -1 < 2x^2 - 3x \leq 1; \begin{cases} 2x^2 - 3x + 1 > 0, \\ 2x^2 - 3x - 1 \leq 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < 0,5 \text{ или } x > 1, \\ \frac{3 - \sqrt{17}}{4} \leq x \leq \frac{3 + \sqrt{17}}{4}. \end{cases}$$

Ответ:  $\frac{3 - \sqrt{17}}{4} \leq x < 0,5$  или  $1 < x \leq \frac{3 + \sqrt{17}}{4}$ .

2)  $-\frac{3}{2} < \arccos x < \frac{1}{3}$ . С учётом области значений арккосинуса имеем:

$$0 \leq \arccos x < \frac{1}{3}, \arccos 1 \leq \arccos x < \arccos \cos \frac{1}{3}.$$

Поскольку функция арккосинус убывает, окончательно получаем:  $\cos \frac{1}{3} < x \leq 1$ .

**525. 4)**  $\log_{7-x}(x^3 + 9) = \log_{7-x}((x+3)(x-1)^2); x^3 + 9 = (x+3)(x-1)^2$ . При этом должны выполняться условия:  $7-x > 0; 7-x \neq 1; x^3 + 9 > 0$ . Далее получаем:  $x^2 - 5x - 6 = 0$ ;  $x = 6$  или  $x = -1$ . Проверка:  $x = 6, 7-6 > 0$  — верно,  $7-6 \neq 1$  — неверно, следовательно, 6 — посторонний корень;  $x = -1, 7-(-1) > 0$  — верно,  $7-(-1) \neq 1$  — верно,  $(-1)^3 + 9 > 0$  — верно, следовательно,  $-1$  — корень исходного уравнения.

Ответ: **-1.** **6)**  $\log_{\cos x} \sin x + \frac{1}{\log_{\cos x} \sin x} = 2$ . Поскольку ни при каком значении  $x$   $\log_{\cos x} \sin x$  не равен нулю, имеем:  $\log_{\cos x}^2 \sin x - 2 \log_{\cos x} \sin x + 1 = 0; \log_{\cos x} \sin x = 1; \sin x = \cos x$  при условии, что  $\cos x > 0$  и  $\cos x \neq 1$ . С учётом этого условия окончательно получаем:  $x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ).

$$7) \operatorname{tg}^2 |x| = \frac{1 - \cos |x|}{1 - \sin |x|}, \frac{\sin^2 |x|}{\cos^2 |x|} = \frac{1 - \cos |x|}{1 - \sin |x|}.$$

При условии  $\cos^2 |x| \neq 0, 1 - \sin |x| \neq 0$ , получаем:

$$\sin^2 |x| - \sin^3 |x| = \cos^2 |x| - \cos^3 |x|;$$

$$(\cos |x| - \sin |x|)(\cos |x| + \sin |x|) = (\cos |x| - \sin |x|)(1 + \cos |x| \sin |x|);$$

$$(\cos |x| - \sin |x|)(1 + \cos |x| \sin |x| - \cos |x| - \sin |x|) = 0;$$

$$(\cos |x| - \sin |x|)(1 - \cos |x|) = 0; \cos |x| - \sin |x| = 0 \text{ или } 1 - \sin |x| = 0, \text{ или } 1 - \cos |x| = 0.$$

Условию удовлетворяет только первое и третье равенство:

$$\cos |x| = \sin |x| \text{ или } \cos |x| = 1, |x| = \frac{\pi}{4} + 2\pi k \text{ или } |x| = 2\pi k,$$

$$x = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi k \text{ или } x = 2\pi k (k \in \mathbb{Z}). \text{ Ответ: } \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi k, 2\pi k$$

( $k \in \mathbb{Z}$ ). 8)  $2 \sin 2x + \cos 2x + 1 = 0$ . Рассмотрим 2 случая:

$$a) x = \frac{\pi}{2} + \pi k (k \in \mathbb{Z}) \text{ и б) } \frac{4 \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg}^2 x} + \frac{1 - \operatorname{tg}^2 x}{1 + \operatorname{tg}^2 x} + 1 = 0.$$

a)  $2 \sin(\pi + 2\pi k) + \cos(\pi + 2\pi k) + 1 = 0; 0 - 1 + 1 = 0$ , следовательно,  $\frac{\pi}{2} + \pi k (k \in \mathbb{Z})$  — корни исходного уравнения.

$$b) 4 \operatorname{tg} x + 1 - \operatorname{tg}^2 x + 1 + \operatorname{tg}^2 x = 0; \operatorname{tg} x = -0,5;$$

$x = -\operatorname{arctg} 0,5 + \pi k$ . Объединяя результаты обоих случаев и записываям ответ:  $\frac{\pi}{2} + \pi k, -\operatorname{arctg} 0,5 + \pi k (k \in \mathbb{Z})$ .

$$530. 4) (6x - 5)\sqrt{2x^2 - 7x - 9} \geqslant 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 - 7x - 9 = 0, \\ 2x^2 - 7x - 9 > 0, \\ 6x - 5 \geqslant 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \text{ или } x = 4,5, \\ x < -1, \text{ или } x > 4,5, \\ x \geqslant \frac{5}{6} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1, \\ x \geqslant 4,5. \end{cases}$$

7)  $\lg(x-2)^2 < \lg(x^2-4) - \lg(-x-2); \lg(x-2)^2 < \lg((-x-2) \times (2-x)) - \lg(-x-2)$ . Должно выполняться условие  $-x-2 > 0$ ; т. е.  $x < -2$ . Тогда  $2-x > 0$ .  $2 \lg(2-x) < \lg(2-x)$ .  $\lg(2-x) < 0$ ,  $\lg(2-x) < \lg 1$ . Поскольку логарифмическая функция с основанием 10 возрастает, получаем  $0 < 2-x < 1$ ,  $1 < x < 2$ , что не удовлетворяет условию  $x < -2$ .

Ответ: нет решений.

$$534. 2) \sqrt{2x+3} + \sqrt{x-2} = 4 \Leftrightarrow 2x+3+x-2+2\sqrt{2x+3} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x-2} = 16 \Leftrightarrow 2\sqrt{2x+3} \cdot \sqrt{x-2} = 15 - 3x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x+3 \geqslant 0, \\ x-2 \geqslant 0, \\ 15-3x \geqslant 0, \\ 8x^2-4x-24=225+9x^2-90x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \leqslant x \leqslant 5, \\ x^2-86x+249=0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2 \leqslant x \leqslant 5, \\ x=3, \\ x=83 \end{cases} \Leftrightarrow x=3.$$

$$4) \log_{7-x}(x^3 + 9) = \log_{7-x}((x+3)(x-1)^2) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 7-x > 0, \\ 7-x \neq 1, \\ x^3 + 9 > 0, \\ x^3 + 9 = (x+3)(x-1)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7-x > 0, \\ 7-x \neq 1, \\ x^3 + 9 > 0, \\ x^2 - 5x - 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 7-x > 0, \\ 7-x \neq 1, \\ x^3 + 9 > 0, \Leftrightarrow x = -1, \\ [x = -1, \\ x = 6] \end{cases}$$

$$5) |\sin x| \cos x = \sin^2 x \Leftrightarrow |\sin x| \cos x = |\sin x|^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 0, \\ \cos x = |\sin x| \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pi n, \\ x = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbf{Z}. \end{cases}$$

$$7) \operatorname{tg}^2 x = \frac{1 - \cos x}{1 - \sin |x|} \Leftrightarrow \frac{\sin^2 |x|}{\cos^2 |x|} = \frac{1 - \cos |x|}{1 - \sin |x|} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos |x| \neq 0, \\ 1 - \sin |x| \neq 0, \\ (\cos |x| - \sin |x|)(1 - \sin |x|)(1 - \cos |x|) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos |x| \neq 0, \\ 1 - \sin |x| \neq 0, \\ \cos |x| = \sin |x|, \\ 1 - \sin |x| = 0, \\ 1 - \cos |x| = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi k, \quad k \in \mathbf{Z}, \\ x = 2\pi k, \end{cases}$$

$$537. 5) \log_{\frac{x^2 - 1}{3}}(x+4) > 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 1 > 0, \\ x + 4 > 0, \\ (x+3)\left(\frac{x^2 - 1}{3} - 1\right) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4 < x < -1, \\ x > 1, \\ (x+3)(x-2)(x+2) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -3 < x < -2, \\ x > 2. \end{cases}$$

$$11) \log_{x^2 + 3x - 4}(x+4) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 3x - 4 > 0, \\ x + 4 > 0, \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} (x^2 + 3x - 5)(x+3) > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x+4)(x-1) > 0, \\ x+4 > 0, \\ \left(x + \frac{-3 + \sqrt{29}}{2}\right)\left(x + \frac{3 - \sqrt{29}}{2}\right)(x+3) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x > 1, \\ \frac{3 - \sqrt{29}}{2} < x < -3, \\ x > \frac{-3 + \sqrt{29}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow x > \frac{-3 + \sqrt{29}}{2}.$$

**538.** 1)  $\log_{g(x)} f(x) < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} (f(x)-1)(g(x)-1) < 0, \\ f(x) > 0, \\ g(x) > 0. \end{cases}$

4)  $\log_{x+4} \frac{x^2 - 1}{3} < 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 1 > 0, \\ x+4 > 0, \\ (x+3)\left(\frac{x^2 - 1}{3} - 1\right) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4 < x < -1, \\ x > 1, \\ (x+3)(x-2)(x+2) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -4 < x < -3, \\ -2 < x < -1, \\ 1 < x < 2. \end{cases}$$

12)  $\log_{x+4} (x^2 + 3x - 4) < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 3x - 4 > 0, \\ x+4 > 0, \\ (x^2 + 3x - 5)(x+3) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x+4)(x-1) > 0, \\ x+4 > 0, \\ \left(x + \frac{3 + \sqrt{29}}{2}\right)\left(x + \frac{3 - \sqrt{29}}{2}\right)(x+3) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x > 1, \\ \left(x + \frac{3 + \sqrt{29}}{2}\right)\left(x + \frac{3 - \sqrt{29}}{2}\right) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x > 1, \\ \frac{-3 - \sqrt{29}}{2} < x < \frac{3 + \sqrt{29}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow 1 < x < \frac{3 + \sqrt{29}}{2}.$$

## Формулы

**ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ****Корни квадратного уравнения**

$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$	$x_{1;2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
$ax^2 + 2kx + c = 0 \quad (a \neq 0)$	$x_{1;2} = \frac{-k \pm \sqrt{k^2 - ac}}{a}$
$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0) \quad a + b + c = 0$	$x_1 = 1, x_2 = \frac{c}{a}$
$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0) \quad a - b + c = 0$	$x_1 = -1, x_2 = -\frac{c}{a}$
Формулы Виета	
$x^2 + px + q = 0$	$x_1 + x_2 = -p, x_1 \cdot x_2 = q$

Разложение квадратного трёхчлена на множители

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Координаты вершины параболы — графика квадратного трёхчлена  $y = ax^2 + bx + c$

$$x_0 = -\frac{b}{2a}, \quad y_0 = \frac{4ac - b^2}{4a}$$

Разложение на множители многочлена  $n$ -й степени, имеющего корень  $x_1$  (следствие из теоремы Безу),

$$P_n(x) = (x - x_1)P_{n-1}(x)$$

**Свойства корней**

квадратных	степени $n$
$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$	$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$	$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$
$\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$	$\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$
	$\sqrt[n^k]{a} = \sqrt[n]{\sqrt[k]{a}}$
	$\sqrt[n]{a^{mk}} = \sqrt[n]{a^m}$

**Степени и логарифмы**

$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ , $a > 0$	$\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$ $(b > 0, a > 0, a \neq 1)$
$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$	$a^{\log_a b} = b$
$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$	$\log_c(ab) = \log_c a  + \log_c b $
$(a^x)^y = a^{xy}$	$\log_c\left(\frac{a}{b}\right) = \log_c a  - \log_c b $
$a^x \cdot b^x = (ab)^x$	$\log_a(b^c) = c \log_a b$
$\frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x$	$\log_{a^c} b = \frac{1}{c} \log_a b$
	$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$
	$a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$

**Тригонометрия****Некоторые значения тригонометрических функций**

$\alpha$	$0^\circ$	$30^\circ$	$45^\circ$	$60^\circ$	$90^\circ$	$180^\circ$	$270^\circ$	$360^\circ$
	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\pi$	$\frac{3\pi}{2}$	$2\pi$
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1

Окончание табл.

$\alpha$	$0^\circ$	$30^\circ$	$45^\circ$	$60^\circ$	$90^\circ$	$180^\circ$	$270^\circ$	$360^\circ$
	$0$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\pi$	$\frac{3\pi}{2}$	$2\pi$
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0
$\operatorname{ctg} \alpha$	—	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	—	0	—

### Формулы приведения

$\alpha$	$\varphi + 2\pi n$	$-\varphi$	$\pi - \varphi$	$\pi + \varphi$	$\frac{\pi}{2} - \varphi$	$\frac{\pi}{2} + \varphi$	$\frac{3\pi}{2} - \varphi$	$\frac{3\pi}{2} + \varphi$
$\sin \alpha$	$\sin \varphi$	$-\sin \varphi$	$\sin \varphi$	$-\sin \varphi$	$\cos \varphi$	$\cos \varphi$	$-\cos \varphi$	$-\cos \varphi$
$\cos \alpha$	$\cos \varphi$	$\cos \varphi$	$-\cos \varphi$	$-\cos \varphi$	$\sin \varphi$	$-\sin \varphi$	$-\sin \varphi$	$\sin \varphi$
$\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{tg} \varphi$	$-\operatorname{tg} \varphi$	$-\operatorname{tg} \varphi$	$\operatorname{tg} \varphi$	$\operatorname{ctg} \varphi$	$-\operatorname{ctg} \varphi$	$\operatorname{ctg} \varphi$	$-\operatorname{ctg} \varphi$
$\operatorname{ctg} \alpha$	$\operatorname{ctg} \varphi$	$-\operatorname{ctg} \varphi$	$-\operatorname{ctg} \varphi$	$\operatorname{ctg} \varphi$	$\operatorname{tg} \varphi$	$-\operatorname{tg} \varphi$	$\operatorname{tg} \varphi$	$-\operatorname{tg} \varphi$

### Основные тождества

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = 1$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad 1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \quad 1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$

### Формулы сложения

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta}{1 \mp \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}$$

### Формулы двойного угла

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

**Переход от суммы к произведению**

$$\sin \alpha \pm \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha \pm \beta}{2} \cos \frac{\alpha \mp \beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta = \frac{\sin (\alpha \pm \beta)}{\cos \alpha \cos \beta}$$

**Переход от произведения к сумме**

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} (\cos (\alpha - \beta) - \cos (\alpha + \beta))$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\cos (\alpha - \beta) + \cos (\alpha + \beta))$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\sin (\alpha - \beta) - \sin (\alpha + \beta))$$

**Формулы понижения степени**

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \quad \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

$$\operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha}$$

**Вспомогательный угол**

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin (x + \varphi),$$

$$\text{где } \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

**Универсальная подстановка**

$$\sin 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} \quad \cos 2\alpha = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} \quad \operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

**Решение уравнений**

$$\sin x = a, |a| \leq 1, x = (-1)^n \arcsin a + \pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$\cos x = a, |a| \leq 1, x = \pm \arccos a + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$\operatorname{tg} x = a, x = \operatorname{arctg} a + \pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$\operatorname{ctg} x = a, x = \operatorname{arcctg} a + \pi n, n \in \mathbb{Z}$$

натуральный 98  
Логарифмическая функция 88  
Мантийса логарифма 100  
Метод интервалов 27  
Область значений функции 8, 218  
— определения функции 8, 217  
Обратные тригонометрические функции 224—225  
Объединение множеств 9  
Окрестность точки 25  
Основное логарифмическое тождество 88  
— тригонометрическое тождество 165, 313  
Ось котангенсов 124  
— тангенсов 123  
Парабола 19  
Пересечение множеств 9  
Перестановки 209  
Период функции 145  
Подкоренное выражение 53  
Подмножество 9  
Показатель степени 53  
— дробный 67  
— рациональный 67  
Потенцирование 96  
Преобразование графика 37, 229

## ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аргумент функции 8  
Арккосинус 129  
Арккотангенс 130  
Арксинус 129  
Арктангенс 130  
Асимптота 18  
— горизонтальная 18, 158  
— вертикальная 18, 158  
Биноминальные коэффициенты 213  
Вероятность события 203  
Вспомогательный угол 198, 314  
Геометрическое место точек 18  
Гипербола 16, 18  
Дробная часть числа 26  
Единичная окружность 116  
Исходы (результаты)  
— благоприятные 203  
— равновероятные 203  
Координаты вершины параболы 37, 311  
Корень  $n$ -й степени 52  
Корни квадратного уравнения 311  
Косинус угла 116  
Косинусоида 152  
Котангенс угла 124  
Котангенсоида 160  
Логарифм 87  
— десятичный 98

- Промежуток  
знакопостоянства 27  
— монотонности 29  
Прямая 18  
Равносильное преобразование неравенства 233  
— — уравнения 233  
Радиан 111  
Радианская мера угла 110  
Разложение многочлена на множители 311  
Размещения 210  
Синус угла 115, 116  
Синус числового аргумента 117  
Синусоида 146  
Свойства корней 61, 312  
— логарифмов 95, 312  
— степени 68, 312  
Скорость линейная 112  
— угловая 112  
Событие достоверное 203  
— невозможное 203  
Сочетания 211  
Таблица значений  
тригонометрических  
функций 312—313  
Тангенс угла 122  
Тангенсоида 159  
Теорема Безу 311  
Теорема о промежуточном  
значении 27  
Точка разрыва 25  
Тригонометрия 106  
Угловой коэффициент  
прямой 16  
Угол поворота 107, 108  
— отрицательный 107  
— положительный 107  
— наклона прямой 123  
Универсальная подстановка 239, 314
- Уравнение иррациональное 56  
— тригонометрическое 128  
Уравнения равносильные 232  
Формула бинома Ньютона 213  
— числа перестановок 209  
— — размещений 210  
— — сочетаний 211  
Формулы двойного угла 182, 313  
— перехода от суммы к произведению 189, 190, 314  
— — от произведения к сумме 188, 314  
— понижения степени 186, 314  
— приведения 136—139  
— сложения 172—173, 313  
Функция 8  
— возрастающая 29  
— константа 16  
— косеканс 151  
— кусочно-заданная 25  
— логарифмическая 88  
— монотонная 29, 223  
— непрерывная 24, 218  
— нечётная 48  
— обратимая 54, 223  
— периодическая 145, 228  
— показательная 76  
— секанс 151  
— степенная 46  
— чётная 48, 226  
— убывающая 29  
Функции взаимно обратные 54, 223  
Характеристика логарифма 100  
Целая часть числа 26

16. Учебник по предмету «Математика» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Математика в контексте проблем информационной культуры. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: ФГУП «Издательство МАКС ПРЕСС», 2008. — 128 с.

## СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

- Алгебра. Углублённый курс с решениями и указаниями: учебно-методическое пособие / Золотарева Н. Д., Попов Ю. А. и др. Под ред. М. В. Федотова. — М.: Издательство Московского университета, 2011.
- Босс В. Интуиция и математика. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012.
- Вилейтнер Г. Хрестоматия по истории математики. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010.
- Виленкин Н. Я., Шибасов Л. П., Шибасова З. Ф. За страницами учебника математики: Арифметика. Алгебра: пособие для учащихся 10–11 кл. — М.: Просвещение, 2008.
- Гашков С. Б. Занимательная компьютерная арифметика: Математика и искусство счёта на компьютерах и без них. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012.
- Говоров В. М. и др. Сборник конкурсных задач по математике для поступающих в вузы / П. Т. Дыбов, Н. В. Мирошин, С. Ф. Смирнова. — М.: Оникс, 21 век, 2006.
- Громов А. И., Савчин В. И. Математика для поступающих в вузы: учебное пособие. — М.: РУДН, 2008.
- Дорофеев Г. В., Потапов М. К., Розов Н. Х. Математика. Для поступающих в вузы: учебное пособие. — М.: Дрофа, 2002.
- Клейн М. Математика. Утрата определённости. — М.: Мир, 1984.
- Клейн М. Математика. Поиск истины. — М.: Мир, 1988.
- Колмогоров А. Н. Математика — наука и профессия. — М.: ЛКИ, 2008.
- Крамор В. С. Задачи на составление уравнений и методы их решения. — М.: Оникс, Мир и Образование, 2009.
- Лурье М. В. Тригонометрия. Техника решения задач. — М.: УНЦ ДО, 2006.
- Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Алгебраический тренажёр: Пособие для школьников и абитуриентов. — М: Илекса, 2007.

- Моденов В. П. Математика для школьников и абитуриентов. — М.: ИКИ; Наука, Физматлит, 2002.
- Понtryгин Л. С. Жизнеописание Льва Семеновича Понtryгина, математика, составленное им самим. — М.: КомКнига, 2012.
- Рывкин А. А., Ваховский Е. Б. Сборник задач по математике с решениями для поступающих в вузы. — М.: Оникс, 21 век, 2003.
- Садовничий Ю. В., Фролкина О. Д. Геометрия. Конкурсные задачи с решениями. В 5 ч.: учебное пособие. — М.: УНЦ ДО, 2009. (В помощь поступающим в вузы).
- Сборник задач по математике (с решениями). В 2 кн. / под ред. М. И. Сканави. — М.: Оникс, 21 век, 2005.
- Суходольский Г. В. Математика для гуманитариев. — М.: Гуманитарный центр, 2007.
- Хорошилова Е. В. Элементарная математика. В 2 ч. — М.: МГУ, 2010.
- Шарыгин И. Ф. Математика. Для поступающих в вузы. — М.: Дрофа, 2004.
- Шабунин М. И. Пособие по математике для поступающих в вузы. — М.: Физматлит, 2003.
- Шибасов Л. П., Шибасова З. Ф. За страницами учебника математики. Математический анализ. Теория вероятностей: пособие для учащихся 10–11 кл. — М.: Просвещение, 2008.
- Шибасов Л. П. От единицы до бесконечности. — М.: Дрофа, 2006.
- Юшкевич А. П. Из истории возникновения математического анализа. — М.: Знание, 1985.
- Якушев Г. М. Большая математическая энциклопедия. — М.: Олма-Пресс, 2005.

### Интернет-ресурсы

- <http://www.ege.edu.ru/> — Официальный информационный портал единого государственного экзамена.
- <http://school-collection.edu.ru/> — Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
- <http://www.turgor.ru/> — Международный математический турнир городов.
- <http://math.rusolymp.ru/> — Всероссийская олимпиада школьников по математике.
- <http://www.kenguru.sp.ru/> — Российская страница международного математического конкурса «Кенгуру».
- <http://kvant.mccme.ru/> — Научно-популярный физико-математический журнал «Квант» для школьников и студентов.
- <http://potential.org.ru/> — Образовательный журнал «Потенциал» для старшеклассников и учителей по разделам «Физика», «Математика», «Информатика».

<http://ilib.mccme.ru/> — Интернет-библиотека Московского центра непрерывного математического образования.

<http://www.etudes.ru/ru/> — Математические этюды: познавательные экскурсии по красивым математическим задачам.

<http://ru.wikipedia.org> — Википедия. История математики.

<http://www.geogebra.org> — Сибирский институт GeoGebra.

<http://geogebra.ru> — Математическая программа для самообучения школьников.

<http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html> — Программа WinPlot для работы с графиками и другими математическими объектами.

**Учебное издание**

**Муравин Георгий Константинович  
Муравина Ольга Викторовна**

**МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА  
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ  
АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА**

**Углубленный уровень**

**10 класс**

**Учебник**

**Зав. редакцией *О. В. Муравина***

**Редактор *Т. С. Зельдман***

**Художественный редактор *А. В. Пряхин***

**Технический редактор *И. В. Грибкова***

**Компьютерная верстка *С. Л. Мамедова***

**Корректор *Г. И. Мосякина***

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ  
знак информационной продукции на данное издание не ставится

Сертификат соответствия  
№ РОСС RU. AЕ51. N 16238.

Подписано к печати 23.03.13. Формат 60 × 90  $\frac{1}{16}$ .  
Бумага офсетная. Гарнитура «Школьная». Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 20,0. Тираж 1000 экз. Заказ С-1280.

ООО «Дрофа». 127018, Москва, Сущевский вал, 49.

Предложения и замечания по содержанию и оформлению книги  
просим направлять в редакцию общего образования издательства «Дрофа»:  
127018, Москва, а/я 79. Тел.: (495) 795-05-41. E-mail: chief@drofa.ru

По вопросам приобретения продукции издательства «Дрофа»  
обращаться по адресу: 127018, Москва, Сущевский вал, 49.  
Тел.: (495) 795-05-50, 795-05-51. Факс: (495) 795-05-52.

Сайт ООО «Дрофа»: [www.drofa.ru](http://www.drofa.ru)

Электронная почта: [sales@drofa.ru](mailto:sales@drofa.ru)

Тел.: 8-800-200-05-50 (звонок по России бесплатный)

При участии ООО «Медиа-Принт»

Отпечатано в типографии филиала ОАО «ТАТМЕДИА» «ПИК „Илэл-Пресс»,  
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.