НОВАЯ ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Л.И. СЛОНИМСКИЙ, И.С. СЛОНИМСКАЯ

МАТЕМАТИКА

в таблицах
и схемах

Справочное пособие

5-9
классы

Л. И. СЛОНИМСКИЙ
И. С. СЛОНИМСКАЯ

МАТЕМАТИКА

В ТАБЛИЦАХ И СХЕМАХ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

к ОГЭ

Москва
Издательство АСТ
2020

УДК 373:51
ББК 22.1я721
С48

Слонимский, Лев Иосифович.

С48 Математика в таблицах и схемах : для подготовки к ОГЭ / Л.И. Слонимский, И.С. Слонимская. — Москва : Издательство АСТ, 2020. — 175, [1] с.: ил.

ISBN 978-5-17-127507-5

(Новая школьная программа)

ISBN 978-5-17-127506-8

(Подготовка к основному государственному экзамену)

Справочник содержит материал курса «Математика» в объёме, проверяемом на основном государственном экзамене.

Структура книги соответствует современному кодификатору элементов содержания по предмету, на основе которого формируются экзаменационные задания.

Наглядность и доступность подачи материала в табличной форме позволяет легко и быстро обобщить, систематизировать и повторить материал школьного курса математики за 5–9 классы и успешно подготовиться к сдаче ОГЭ.

УДК 373:51

ББК 22.1я721

Справочное издание

Лев Иосифович Слонимский, Ирина Семёновна Слонимская
МАТЕМАТИКА В ТАБЛИЦАХ И СХЕМАХ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ

Редакция «Образовательные проекты»

Ответственный редактор *Н. А. Шармай*, Технический редактор

Е. П. Кудиярова, Компьютерная вёрстка *Л. А. Быковой*

Подписано в печать 22.06.2020. Формат 70×90^{1/32}. Усл. печ. л. 6,44.

Тираж 3500 экз. Заказ № (Новая школьная программа)

Тираж 6500 экз. Заказ № (Подготовка к основному государственному экзамену)

Произведено в Российской Федерации

Дата изготовления: июль 2020 г. Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»

Российская Федерация, г. Москва, 129085, Звездный бульвар, д. 21,

строение 3, комната 705, помещение 1, 7 этаж

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Российская Федерация, г. Москва, 123317, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Общероссийский классификатор продукции ОК-034-2014

(КПЕС 2008); 58.11.1 — книги, брошюры печатные

Наш электронный адрес:

www.ast.ru; e-mail: stelliferovskiy@ast.ru; www.book24.ru

По вопросам приобретения книг обращаться по адресу: 123317, г. Москва,

Пресненская наб., д. 6, стр. 2, Деловой комплекс «Империya», а/я № 5

© Слонимский Л.И., Слонимская И.С., 2020

© ООО «Издательство АСТ», 2020

Содержание

АЛГЕБРА

---

1. Числа и вычисления

1.1. Натуральные числа	12
1.1.1. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Цифры	12
1.1.2. Арифметические действия над натуральными числами	13
1.1.3. Степень с натуральным показателем	17
1.1.4. Делимость натуральных чисел. Простые и составные числа, разложение натурального числа на простые множители	18
1.1.5. Признаки делимости	20
1.1.6. Наибольший общий делитель (НОД) и наименьшее общее кратное (НОК)	21
1.1.7. Деление с остатком	23
1.2. Дроби	24
1.2.1. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Сокращение дроби	24
1.2.2. Арифметические действия с обыкновенными дробями	28
1.2.3. Нахождение части от целого и целого по его части.	34
1.2.4. Десятичная дробь, сравнение десятичных дробей.	36
1.2.5. Арифметические действия с десятичными дробями.	37
1.2.6. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби	39

1.3. Рациональные числа	40
1.3.1. Целые числа	40
1.3.2. Модуль (абсолютная величина) числа	40
1.3.3. Сравнение рациональных чисел	41
1.3.4. Арифметические действия с рациональными числами	42
1.3.5. Степень с целым показателем	43
1.3.6. Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок	44
1.4. Действительные числа	45
1.4.1. Квадратный корень из числа	45
1.4.2. Корень третьей степени	46
1.4.3. Нахождение приближённого значения корня	46
1.4.4. Запись корней с помощью степени с дробным показателем	47
1.4.5. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения иррациональных чисел. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби.	47
1.4.6. Сравнение действительных чисел.	47
1.5. Измерения, приближения, оценки	48
1.5.1. Единицы измерения	48
1.5.2. Стандартный вид числа	50
1.5.3. Представление зависимости между величинами в виде формул	50
1.5.4. Проценты. Нахождение процента от величины и величины по её проценту	51
1.5.5. Отношение, выражение отношения в процентах.	52
1.5.6. Пропорция. Прямая и обратно пропорциональная зависимости	53
1.5.7. Округление чисел.	54

2. Алгебраические выражения	
2.1. Буквенные выражения (выражения с переменными)	56
2.1.1. Буквенные выражения.	
Числовое значение буквенного выражения	56
2.1.2. Допустимые значения переменных, входящих в выражения с переменными	57
2.1.3. Подстановка выражений вместо переменных	57
2.1.4. Равенство буквенных выражений, тождество. Преобразования выражений	58
2.2. Свойства степени с целым показателем	58
2.3. Многочлены	59
2.3.1. Многочлен. Сложение, вычитание, умножение многочленов	59
2.3.2. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности, формула разности квадратов	60
2.3.3. Разложение многочлена на множители	61
2.3.4. Квадратный трёхчлен. Теорема Виета. Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители	62
2.3.5. Степень и корень многочлена с одной переменной	62
2.4. Алгебраическая дробь	63
2.4.1. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей	63
2.4.2. Рациональные выражения и их преобразования	63
2.5. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях	64
3. Уравнения и неравенства	
3.1. Уравнения	65
3.1.1. Уравнение с одной переменной, корень уравнения	65

3.1.2. Линейное уравнение	65
3.1.3. Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения	67
3.1.4. Решение рациональных уравнений	69
3.1.5. Примеры решения уравнений высших степеней. Решение уравнений методом замены переменной. Решение уравнений методом разложения на множители	71
3.1.6. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными.	72
3.1.7. Система уравнений; решение системы.	73
3.1.8. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим способом.	74
3.2. Неравенства.	78
3.2.1. Числовые неравенства и их свойства	78
3.2.2. Неравенства с одной переменной. Решение неравенства.	80
3.2.3. Линейное неравенство с одной переменной.	81
3.2.4. Системы линейных неравенств.	82
3.2.5. Квадратные неравенства.	84
3.3. Текстовые задачи	88
3.3.1. Решение текстовых задач арифметическим способом	88
3.3.2. Решение текстовых задач алгебраическим способом	90
4. Числовые последовательности	
4.1 Понятие последовательности	95
4.1.1. Понятие последовательности	95
4.2. Арифметическая и геометрическая прогрессии	96
4.2.1. Арифметическая прогрессия	96
4.2.2. Геометрическая прогрессия	97
4.2.3. Сложные проценты	98

5. Функции

5.1. Числовые функции.	99
5.1.1. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции	99
5.1.2. График функции, возрастание и убывание, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства	100
5.1.3. Пример графических зависимостей, отражающих реальные процессы	101
5.1.4. Линейная функция, её график, геометрический смысл коэффициентов	102
5.1.5. Функция, описывающая обратно пропорциональную зависимость, её график. Гипербола	103
5.1.6. Квадратичная функция, её график. Парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии	104
5.1.7. График функции $y = \sqrt{x}$	105
5.1.8. График функции $y = \sqrt[3]{x}$	105
5.1.9. График $y = x $	106
5.1.10. Использование графиков функций для решения уравнений и систем	106

6. Координаты на прямой и в плоскости

6.1. Координатная прямая.	108
6.1.1. Изображение чисел точками координатной прямой	108
6.1.2. Геометрический смысл модуля	108
6.1.3. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч.	109
6.2. Декартовы координаты на плоскости.	110
6.2.1. Декартовы координаты на плоскости; координаты точки	110

6.2.2. Координаты середины отрезка	110
6.2.3. Формула расстояния между двумя точками плоскости	111
6.2.4. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых	111
6.2.5. Уравнение окружности	112
6.2.6. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем	112
7. Статистика и теория вероятности	114

ГЕОМЕТРИЯ

---

8. Геометрия

8.1. Геометрические фигуры и их свойства.

Измерение геометрических величин. 120

8.1.1. Начальные понятия геометрии. 120

8.1.2. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы.

Вертикальные и смежные углы.

Биссектриса угла и её свойства 122

8.1.3. Прямая. Параллельность

и перпендикулярность прямых. 124

8.1.4. Отрезок. Свойство серединного

перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр

и наклонная к прямой 127

8.1.5. Понятие о геометрическом месте точек 129

8.1.6. Преобразования плоскости. Движения.

Симметрия 130

8.2. Треугольник. 132

8.2.1. Высота, медиана, биссектриса,

средняя линия треугольника; точки пересечения

серединных перпендикуляров, биссектрис,

медиан, высот или их продолжений 132

8.2.2. Равнобедренный и равносторонний

треугольники. Свойства и признаки

равнобедренного треугольника 133

8.2.3. Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора	136
8.2.4. Признаки равенства треугольников	138
8.2.5. Неравенство треугольника	139
8.2.6. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника	139
8.2.7. Теорема Фалеса	140
8.2.8. Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников.	140
8.2.9. Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°	143
8.2.10. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Теорема косинусов и теорема синусов.	144
8.3. Многоугольники	146
8.3.1. Параллелограмм, его свойства и признаки . .	146
8.3.2. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки	148
8.3.3. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция	150
8.3.4. Сумма углов выпуклого многоугольника. . .	151
8.3.5. Правильные многоугольники	152
8.4. Окружность и круг	153
8.4.1. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла	153
8.4.2. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей	155
8.4.3. Касательная и секущая к окружности; равенство отрезков касательных, проведённых из одной точки	156
8.4.4. Окружность, вписанная в треугольник	157
8.4.5. Окружность, описанная около треугольника . .	157
8.4.6. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника	159
8.4.7. Вписанные и описанные четырёхугольники. . .	160

8.5. Измерение геометрических величин	161
8.5.1. Длина отрезка, длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой . . .	161
8.5.2. Длина окружности.	162
8.5.3. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности	162
8.5.4. Площадь и её свойства. Площадь прямоугольника	163
8.5.5. Площадь параллелограмма.	164
8.5.6. Площадь трапеции.	164
8.5.7. Площадь треугольника	165
8.5.8. Площадь круга, площадь сектора	166
8.5.9. Формулы объёма прямоугольного параллелепипеда, куба, шара	167
8.6. Векторы на плоскости	168
8.6.1 Вектор, длина (модуль) вектора	168
8.6.2. Равенство векторов	169
8.6.3. Операции над векторами (сумма векторов, умножение вектора на число).	170
8.6.4. Угол между векторами.	172
8.6.5. Коллинеарные векторы, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.	173
8.6.6. Координаты вектора	174
8.6.7. Скалярное произведение векторов	176

АЛГЕБРА

---

1. ЧИСЛА И ВЫЧИСЛЕНИЯ

1.1. Натуральные числа

1.1.1. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Цифры

Цифры — знаки для записи чисел.

Система счисления — способ записи чисел в виде, удобном для чтения и выполнения арифметических операций.

В десятичной системе счисления используют цифры: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Всего 10 цифр.

Римские цифры	I	V	X	L	C	D	M
Арабские цифры	1	5	10	50	100	500	1000

Примеры

1) XXVII = $10 + 10 + 5 + 1 + 1 = 27$.

2) MDCCLXIV = $1000 + 500 + 100 + 100 + 50 + 10 + (5 - 1) = 1764$.

1.1.2. Арифметические действия над натуральными числами

Натуральные числа — числа, которые используют при счёте предметов.	
Действия над натуральными числами	
Сложение	$a + b = c, a = c - b, b = c - a,$ где a — слагаемое, b — слагаемое, c — сумма
Вычитание	$a - b = c, a = b + c, b = a - c,$ где a — уменьшаемое, b — вычитаемое, c — разность
Умножение	$ab = c, a = \frac{c}{b}, b = \frac{c}{a}, a \neq 0, b \neq 0,$ где a — множитель, b — множитель, c — произведение
Деление	$\frac{a}{b} = c$ или $a : b = c, a = bc, b = \frac{a}{c},$ $b \neq 0, c \neq 0,$ где a — делимое, b — делитель, c — частное

Свойства сложения и умножения	
Переместительное свойство сложения	$a + b = b + a$
Сочетательное свойство сложения	$(a + b) + c = a + (b + c)$
Переместительное свойство умножения	$ab = ba$
Сочетательное свойство умножения	$(ab)c = a(bc)$

Распределительное свойство умножения относительно сложения	$a(b + c) = ab + ac$

Общие правила при действиях с 0 и 1	
$a + 0 = a$	$a : 1 = a$
$a - 0 = a$	$a : a = 1$
$a - a = 0$	$a \cdot 0 = 0$
$a \cdot 1 = a$	$0 : a = 0$
$a : 0$ — нет числового решения	

Проверка результатов арифметических действий с помощью остатков от деления на 9
<i>Действия</i>
• Остаток любого числа от деления на 9 можно получить, складывая цифры числа, при этом в полученной сумме нужно продолжить сложение цифр до получения однозначного остатка. При сложении цифр суммы и отдельные числа, кратные 9, а также нуль можно игнорировать, они не влияют на конечный результат.   • Умножаем или складываем остатки. В результате вычислений тем же способом находим остаток и сравниваем его с остатком суммы или произведения. При верном решении они должны совпадать.   • При делении и вычитании проверку этим способом можно производить, умножая остаток частного на остаток делителя, соответственно складывая остаток разности с остатком вычитаемого.

Примеры

1) $44 \cdot 46 = 2024$

$4 + 4 = 8; 4 + 6 = 10 \rightarrow 1 + 0 = 1;$

$2 + 0 + 2 + 4 = 8;$

$8 \cdot 1 = 8$ (верно)

2) $327 + 48 = 375$

$3 + 2 + 7 = 12 \rightarrow 1 + 2 = 3;$

$4 + 8 = 12 \rightarrow 1 + 2 = 3;$

$3 + 7 + 5 = 15 \rightarrow 1 + 5 = 6;$

$3 + 3 = 6$ (верно)

3) $156 : 12 = 13 \rightarrow 13 \cdot 12 = 156$

$1 + 3 = 4; 1 + 2 = 3;$

$1 + 5 + 6 = 12 \rightarrow 1 + 2 = 3;$

$4 \cdot 3 = 12 \rightarrow 1 + 2 = 3$ (верно)

4) $58 - 22 = 36 \rightarrow 36 + 22 = 58$

$3 + 6 = 9; 2 + 2 = 4; 5 + 8 = 13 \rightarrow 1 + 3 = 4;$

$9 + 4 = 13 \rightarrow 1 + 3 = 4$ (верно)

Приёмы быстрого устного счёта

Умножение чисел от 101 до 109 между собой
 $(100 + a)(100 + b) = 10\,000 + 100(a + b) + ab$

Порядок действий

Примеры

1) Записываем число 1.

2) Справа записываем сумму чисел из разряда единиц у множителей.

3) Ещё правее записываем произведение этих же чисел.

1) $102 \cdot 104 = 10\,000 + 100(2 + 4) + 2 \cdot 4 = 10\,000 + 600 + 8 = 10\,608.$

2) $109 \cdot 108 = 10\,000 + 100(9 + 8) + 9 \cdot 8 = 10\,000 + 1700 + 72 = 11\,772.$

Умножение чисел, бóльших 10 $(10 + a)(10 + b) = 10(10 + a + b) + ab$	
<i>Порядок действий</i>	<i>Примеры</i>
1. К одному из множителей прибавляем единицы второго множителя, получаем десятки. 2. Перемножаем единицы. 3. Складываем десятки с произведением единиц.	1) $12 \cdot 19 = 10(10 + 2 + 9) + 2 \cdot 9 = 210 + 18 = 228$ 2) $16 \cdot 13 = 10(10 + 6 + 3) + 6 \cdot 3 = 190 + 18 = 208$
Умножение двузначных чисел на 11	
Чтобы умножить двузначное число на 11, надо сложить цифры этого числа и результат записать между ними, если это однозначное число. Если полученная сумма — двузначное число, то левую цифру прибавляем к числу десятков первоначального числа.	
<i>Примеры</i> 1) $22 \cdot 11 = 2 \cdot 100 + (2 + 2) \cdot 10 + 2 = 242$ 2) $45 \cdot 11 = 4 \cdot 100 + (4 + 5) \cdot 10 + 5 = 495$ 3) $57 \cdot 11 = 5 \cdot 100 + (5 + 7) \cdot 10 + 7 = 627$	
Умножение чисел с одинаковыми десятками и числом единиц, дающих в сумме 10 $(1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6 = 5 + 5 = 10)$	
• <i>Десятки</i> умножаем на следующее натуральное число: $2 \cdot 3; 3 \cdot 4; 5 \cdot 6; 9 \cdot 10; 11 \cdot 12$.	

• *Единицы* просто перемножаем (если в произведении получилось однозначное число, то слева приписываем 0):

$$1 \cdot 9 = 09, 2 \cdot 8 = 16, 3 \cdot 7 = 21, 4 \cdot 6 = 24, 5 \cdot 5 = 25.$$

• *В результате*: слева — произведение десятков, справа — произведение единиц.

Примеры

$$1) 42 \cdot 48 = (4 \cdot 5) \cdot 100 + (2 \cdot 8) = 2000 + 16 = \underline{2016}$$

$$2) 51 \cdot 59 = (5 \cdot 6) \cdot 100 + (1 \cdot 9) = 3000 + 9 = \underline{3009}$$

$$3) 83 \cdot 87 = (8 \cdot 9) \cdot 100 + (3 \cdot 7) = 7200 + 21 = \underline{7221}$$

$$4) 115^2 = 115 \cdot 115 = (11 \cdot 12) \cdot 100 + (5 \cdot 5) = \\ = 13200 + 25 = \underline{13225}$$

1.1.3. Степень с натуральным показателем

Степень — пятое математическое действие, считая сложение и вычитание, умножение и деление.	
Определение степени числа a с натуральным показателем n ; a — основание степени	$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_n$; где $n = 2, 3, 4, \dots$; $a^1 = a$
Определение степени числа с нулевым показателем	$a^0 = 1$, где $a \neq 0$
Умножение степеней с одинаковыми основаниями	$a^n \cdot a^k = a^{n+k}$
Деление степеней с одинаковыми основаниями	$a^n : a^k = a^{n-k}$, где $n \geq k$
Возведение степени в степень	$(a^n)^k = a^{nk}$

Умножение степеней с одинаковыми показателями	$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$
Деление степеней с одинаковыми показателями	$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$, где $b \neq 0$
Возведение в степень 0 и 1	$1^n = 1$; $0^n = 0$;
Возведение в степень положительных и отрицательных чисел с чётным или нечётным показателем	Если $a > 0$, то $a^{2n} > 0$, $a^{2n-1} > 0$. Если $a < 0$, то $a^{2n} > 0$, $a^{2n-1} < 0$.

1.1.4. Делимость натуральных чисел. Простые и составные числа, разложение натурального числа на простые множители

Делитель числа a	Кратное числа a
↓	↓
Число, на которое a делится без остатка	Число, которое делится на a без остатка

Простые числа	Составные числа
↓	↓
Имеют только два делителя: 1 и само число. <i>Например</i> , делители числа 17: 1 и 17	Имеют более двух делителей. <i>Например</i> , число 6 имеет делители: 1, 2, 3, 6
Число 1 имеет только один делитель — само это число. Поэтому его не относят ни к простым, ни к составным числам.	

- **Разложение составного числа на простые множители** — представление этого числа в виде произведения простых чисел.
- Всякое составное число можно разложить на простые множители. При любом способе получится одно и то же разложение, если не учитывать порядок записи множителей.

Правило разложения на простые множители

1. Записать данное число, а справа от него провести вертикальную черту.
2. Разделить данное число нацело на наименьшее простое число — делитель данного.
3. Результат деления написать под данным числом, а делитель — справа за чертой.
4. Полученное частное так же нацело разделить на наименьшее возможное простое число, далее делать как в пункте 3.
5. Деление продолжать до получения в частном единицы.
6. Числа, записанные за вертикальной чертой в столбик, и есть простые множители, на которые раскладывается данное число.

Пример

$$\begin{array}{r|l}
 1850 & 2 \\
 925 & 5 \\
 185 & 5 \\
 37 & 37 \\
 1 &
 \end{array}$$

$$1850 = 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 37 = 2 \cdot 5^2 \cdot 37.$$

1.1.5. Признаки делимости

на 2	Число оканчивается на чётную цифру (0, 2, 4, 6, 8).
на 3	Сумма цифр делится на 3.
на 4	Две последние цифры числа — или нули, или число, делящееся на 4.
на 5	Последняя цифра числа — 0 или 5.
на 6	Одновременное выполнение признаков делимости на 2 и на 3.
на 7	Отбросить последнюю цифру, умножить её на 2. Если получилось число, большее числа из оставшихся цифр, то следует вычесть из удвоенной последней цифры это число. Если число из оставшихся цифр больше, то надо из него вычесть удвоенную последнюю цифру.
на 8	Три последние цифры числа — нули или образуют число, делящееся на 8.
на 9	Сумма цифр числа делится на 9.
на 10	Последняя цифра числа — 0.
на 11	Разность между суммой цифр, стоящих на нечётных местах, и суммой цифр, стоящих на чётных местах, делится на 11.
на 13	Отбросить последнюю цифру, умножить её на 4 и прибавить к числу из оставшихся цифр.
на 25	Две последние цифры — нули или число, делящееся на 25.

1.1.6. Наибольший общий делитель (НОД) и наименьшее общее кратное (НОК)

Наибольший общий делитель (НОД) нескольких натуральных чисел — наибольшее натуральное число, на которое делятся без остатка данные числа.

Например, 8 — наибольший общий делитель чисел 24 и 40, так как делители числа 24 — числа 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, а делители числа 40 — числа 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40.

Правило для нахождения НОД

1. Разложить на простые множители каждое из данных чисел.
2. Выписать все общие делители чисел и перемножить их.

Пример

Найдём НОД чисел 12, 18, 30.

Решение.

12		2	18		2	30		2
6		2	9		3	15		3
3		3	3		3	5		5
1			1			1		

$$\text{НОД}(12, 18, 30) = 2 \cdot 3 = 6.$$

• Если все данные числа делятся на одно из них, то это число и является НОД этих чисел.

Например, НОД чисел 45, 60, 15 является число 15, так как $45 : 15 = 3$, $60 : 15 = 4$, $15 : 15 = 1$.

• **Взаимно простые числа** — натуральные числа, НОД которых равен 1.

Например, числа 8 и 9 — взаимно простые, так как $8 = 2 \cdot 2 \cdot 2$; $9 = 3 \cdot 3$, НОД (8, 9) = 1.

Наименьшее общее кратное нескольких натуральных чисел (НОК) — наименьшее натуральное число, которое кратно каждому из данных чисел.

Например, наименьшее общее кратное чисел 9 и 12 — число 36, так как кратные 9 — числа 9, 18, 27, 36, 45 и т. д., а 12 — числа 12, 24, 36, 48 и т. д.

Правило для нахождения НОК

1. Разложить на простые множители каждое из данных чисел.
2. Выписать множители, которые есть в разложении одного из данных чисел.
3. Добавить к ним недостающие множители из разложений остальных чисел.
4. Найти произведение получившихся множителей.

Пример

Найти НОК чисел 10, 12, 15.

Решение.

10		2	12		2	15		3
5		5	6		2	5		5
1			3		3	1		
			1					

$$\text{НОК}(10, 12, 15) = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 60.$$

- Если одно из данных чисел делится на все остальные числа, то это число и является наименьшим общим кратным данных чисел.

Например, для чисел 18, 40, 360 наименьшее общее кратное — число 360, так как $360 : 18 = 20$; $360 : 40 = 9$; $360 : 360 = 1$.

- Для взаимно простых чисел НОК равен произведению этих чисел.

Например, для чисел 8 и 9 НОК равен $8 \cdot 9 = 72$.

- Связь между НОК и НОД:

$$\text{НОК}(a; b) = \frac{a \cdot b}{\text{НОД}(a; b)}.$$

1.1.7. Деление с остатком

Правила деления с остатком

1. Если делимое не делится без остатка, то нужно подобрать ближайшее к делимому число, которое делится на делитель без остатка. При делении с остатком результат записывают двумя числами. Первое число называют **неполным частным**, второе — **остатком**.

Например, $190 : 27 = 7$ (остаток 1).

2. При делении с остатком остаток всегда должен быть меньше делителя.

Например, $190 : 27 = 7$ (остаток 1), $1 < 27$.

Делимое	Делитель
$\begin{array}{r} \rightarrow 190 \\ - 189 \\ \hline 1 \end{array}$	$\begin{array}{r} 27 \\ \hline 7 \end{array}$
$ \rightarrow 1$	$ \rightarrow 7$
Остаток	Неполное частное

Форма записи деления с остатком	
$190 : 27 = 7$ (остаток 1) Запись показывает результат деления	$190 = 27 \cdot 7 + 1$ Запись позволяет сделать проверку

1.2. Дроби

1.2.1. Обыкновенная дробь.

Основное свойство дроби. Сравнение дробей.
Сокращение дроби

Обыкновенная дробь — запись вида $\frac{a}{b}$, где a — числитель, b — знаменатель. Числитель дроби — число, которое пишут над чертой. Числитель показывает, сколько равных долей единицы взято. Знаменатель дроби — число, которое пишут под чертой. Знаменатель показывает, на сколько долей разделили единицу.		
Правильная дробь — обыкновенная дробь, числитель которой меньше знаменателя. Например, $\frac{1}{3}; \frac{3}{7}; \frac{23}{45}$.	Неправильная дробь — обыкновенная дробь, числитель которой больше знаменателя или равен ему. Например, $\frac{4}{3}; \frac{25}{5}; \frac{6}{6}$.	
Неправильная дробь	>	Правильная дробь
Неправильная дробь	≥	1
Правильная дробь	<	1

Основное свойство дроби

Если числитель и знаменатель дроби умножить или разделить на одно и то же натуральное число, то получится равная ей дробь. Две равные дроби являются различными записями одного и того же числа.

Например,

$$1) \frac{2}{7} = \frac{4}{14} = \frac{6}{21} = \frac{10}{35}.$$

$$2) \frac{5}{6} = \frac{5 \cdot 8}{6 \cdot 8} = \frac{40}{48}.$$

$$3) \frac{50}{8} = \frac{50 : 2}{8 : 2} = \frac{25}{4}.$$

Сравнение дробей

Из двух дробей с одинаковыми знаменателями больше та, у которой числитель больше.

Например, $\frac{4}{7} > \frac{3}{7}$; $\frac{14}{29} < \frac{19}{29}$.

Из двух дробей с одинаковыми числителями больше та, у которой знаменатель меньше.

Например, $\frac{7}{11} < \frac{7}{9}$; $\frac{15}{37} > \frac{15}{43}$.

Сокращение дроби

Сокращение дроби — деление числителя и знаменателя дроби на их общий делитель, не равный единице.

Наибольшее число, на которое можно сократить дробь, — **НОД числителя и знаменателя дроби**.

Задание «сократить дробь» подразумевает ответ в виде *несократимой дроби*.

Несократимая дробь

Несократимая дробь — дробь, числитель и знаменатель которой — взаимно простые числа.

Примеры

1) $\frac{5}{8}$ — несократимая дробь, так как НОД (5, 8) = 1.

2) $\frac{20}{27}$ — несократимая дробь, так как НОД (20, 27) = 1.

Способы сокращения дробей

- Дробь можно сократить на НОД числителя и знаменателя, предварительно найдя НОД.
- Дробь можно постепенно сокращать на общие делители числителя и знаменателя, применяя для их нахождения признаки делимости.
- Числитель и знаменатель дроби можно разложить на множители, а затем сокращать.

Примеры

1) Сократите дробь $\frac{875}{1000}$.

Решение. Найдём НОД (875, 1000).

875		5	1000		2
175		5	500		2
35		5	250		2
7		7	125		5
1			25		5
			5		5
			1		

НОД (875, 1000) = $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$.

$$\frac{875}{1000} = \frac{875 : 125}{1000 : 125} = \frac{7}{8}.$$

2) Представьте в виде обыкновенной несокращенной дроби десятичные дроби 0,5; 0,25.

Решение.

$$0,5 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}, 0,25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}.$$

Приведение дроби к новому знаменателю — умножение числителя дроби на дополнительный множитель.

Дополнительный множитель — число, равное частному от деления нового знаменателя на старый.

Пример

Приведите дробь $\frac{2}{7}$ к знаменателю 21.

Решение. $21 : 7 = 3$ — дополнительный множитель.

$$\frac{2}{7} = \frac{2 \cdot 3}{21} = \frac{6}{21}.$$

Наименьший общий знаменатель нескольких дробей (НОЗ) — наименьшее общее кратное знаменателей данных дробей.

Правило нахождения наименьшего общего знаменателя (НОЗ)

- Если один из знаменателей делится на другие, то он и будет НОЗ.
- Если все знаменатели данных дробей взаимно простые числа, то НОЗ находят перемножением знаменателей.
- Во всех остальных случаях находят НОЗ разложением на множители.

**Способ приведения дробей
к наименьшему общему знаменателю**

1. Найти наименьший общий знаменатель.
2. Найти дополнительные множители для каждой дроби.
3. Умножить числитель каждой дроби на соответствующий дополнительный множитель.
Знаменателем каждой дроби будет НОЗ всех дробей.

Пример

Приведите к наименьшему общему знаменателю дроби $\frac{6}{7}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{1}{6}$.

Р е ш е н и е.

$$\text{НОЗ}(7, 5, 6) = 7 \cdot 5 \cdot 6 = 210.$$

$$\frac{6}{7} = \frac{6 \cdot 30}{210} = \frac{180}{210}, \quad \frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 42}{210} = \frac{126}{210},$$

$$\frac{1}{6} = \frac{1 \cdot 35}{210} = \frac{35}{210}.$$

**1.2.2. Арифметические действия
с обыкновенными дробями**

Сложение и вычитание дробей

Одинаковые
знаменатели

$$\frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c}$$

Различные
знаменатели

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$$

Правило сравнения, сложения и вычитания дробей с разными знаменателями

1. Привести дроби к наименьшему общему знаменателю.

2. Соответственно сравнить, сложить или вычесть полученные дроби с одинаковыми знаменателями.

Примеры

1) Сравните дроби $\frac{2}{7}$ и $\frac{3}{8}$.

Решение. НОЗ (7, 8) = $7 \cdot 8 = 56$, так как 7 и 8 являются взаимно простыми числами.

$$\frac{2}{7} = \frac{2 \cdot 8}{56} = \frac{16}{56}, \quad \frac{3}{8} = \frac{3 \cdot 7}{56} = \frac{21}{56}, \quad \frac{16}{56} < \frac{21}{56},$$

значит, $\frac{2}{7} < \frac{3}{8}$.

2) Выполните сложение дробей с разными знаменателями: $\frac{3}{16} + \frac{5}{14} + \frac{1}{30}$.

Решение.

$$\begin{array}{r|l} 16 & 2 \\ 8 & 2 \\ 4 & 2 \\ 2 & 2 \\ 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 14 & 2 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$$

НОЗ (14, 16, 30) = $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 5 = 1680$;

$$\begin{aligned} \frac{3}{16} + \frac{5}{14} + \frac{1}{30} &= \frac{3 \cdot 105}{1680} + \frac{5 \cdot 120}{1680} + \frac{1 \cdot 56}{1680} = \\ &= \frac{315 + 600 + 56}{1680} = \frac{971}{1680}. \end{aligned}$$

3) Выполните вычитание дробей с разными знаменателями: $\frac{20}{27} - \frac{4}{81}$.

Решение.

$$\frac{20}{27} - \frac{4}{81} = \frac{20 \cdot 3}{81} - \frac{4}{81} = \frac{60 - 4}{81} = \frac{56}{81}.$$

Правило сложения смешанных чисел

1. Дробные части смешанных чисел приводят к наименьшему общему знаменателю.
2. Складывают отдельно целые части и отдельно дробные части смешанных чисел.
3. Если при сложении дробных частей получают неправильную дробь, то необходимо выделить из неё целую часть и сложить с целой частью результата.

Пример

1) Сложите числа $6\frac{2}{7}$ и $5\frac{3}{8}$.

Решение.

$$\begin{aligned} 6\frac{2}{7} + 5\frac{3}{8} &= 6\frac{16}{56} + 5\frac{21}{56} = (6 + 5) + \left(\frac{16}{56} + \frac{21}{56}\right) = \\ &= 11\frac{37}{56}. \end{aligned}$$

2) Сложите числа $1\frac{2}{3}$ и $2\frac{3}{5}$.

Решение.

$$1\frac{2}{3} + 2\frac{3}{5} = 1\frac{10}{15} + 2\frac{9}{15} = 3\frac{19}{15} = 4\frac{4}{15}.$$

Правило вычитания смешанных чисел

1. Дробные части смешанных чисел приводят к наименьшему общему знаменателю.
2. Если дробная часть уменьшаемого меньше дробной части вычитаемого, то её превращают в неправильную дробь, предварительно уменьшив целую часть на единицу.
3. Отдельно выполняют вычитание целых частей и отдельно — дробных частей.

Примеры

1) Выполните вычитание: $7 - 3\frac{5}{7}$.

Решение.

$$7 - 3\frac{5}{7} = 6\frac{7}{7} - 3\frac{5}{7} = 3\frac{2}{7}.$$

2) Выполните вычитание: $16\frac{5}{6} - 9\frac{7}{8}$.

Решение.

$$\begin{aligned} 16\frac{5}{6} - 9\frac{7}{8} &= 16\frac{20}{24} - 9\frac{21}{24} = \\ &= 15\frac{44}{24} - 9\frac{21}{24} = 6\frac{23}{24}; \end{aligned}$$

Умножение и деление дробей

Умножение дробей

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

Деление дробей

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{ad}{bc}$$

Правило умножения дроби на натуральное число

1. Числитель дроби умножают на натуральное число и это выражение записывают в числитель произведения.
2. Знаменатель дроби оставляют без изменения.
3. Если возможно, то дробь сокращают.
4. Перемножают оставшиеся множители в числителе.
5. Если дробь неправильная, то выделяют целую часть.

Пример

Выполните умножение: $4 \cdot \frac{5}{8}$.

Решение.

$$4 \cdot \frac{5}{8} = \frac{4 \cdot 5}{8} = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}.$$

Умножение дроби на дробь — действие, которое состоит в умножении числителя одной дроби на числитель другой дроби и знаменателя первой дроби на знаменатель второй.

Например,

$$1) \frac{2}{7} \cdot \frac{3}{11} = \frac{2 \cdot 3}{7 \cdot 11} = \frac{6}{77}.$$

$$2) \frac{3}{8} \cdot \frac{16}{27} = \frac{3 \cdot 16}{8 \cdot 27} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 8}{8 \cdot 3 \cdot 9} = \frac{2}{9}.$$

Правило умножения обыкновенных дробей

1. Перемножают числители данных дробей, записывая это выражение в числитель произведения.
2. Перемножают знаменатели данных дробей, записывая это выражение в знаменатель произведения.
3. Если возможно, то производят сокращение.
4. Выполняют умножение оставшихся множителей в числителе и знаменателе.
5. Если в результате получают неправильную дробь, то из неё выделяют целую часть.

Взаимно обратные числа

Два числа, произведение которых равно 1.

Например, взаимно обратные числа:

$$\frac{2}{7} \text{ и } \frac{7}{2}, 5 \text{ и } \frac{1}{5}, 2\frac{3}{8} \text{ и } \frac{8}{19}.$$

Правило деления дроби на дробь

1. Знак деления заменить знаком умножения.
2. Делитель заменить на обратное число.
3. Выполнить умножение дробей.

Примеры

1) Вычислите $\frac{6}{7} : \frac{5}{21}$.

Решение.

$$\frac{6}{7} : \frac{5}{21} = \frac{6}{7} \cdot \frac{21}{5} = \frac{6 \cdot 21}{7 \cdot 5} = \frac{6 \cdot 3}{5} = \frac{18}{5} = 3\frac{3}{5}.$$

2) Вычислите $2\frac{5}{8} : 1\frac{5}{9}$.

Решение.

$$2\frac{5}{8} : 1\frac{5}{9} = \frac{21}{8} : \frac{14}{9} = \frac{21}{8} \cdot \frac{9}{14} = \frac{21 \cdot 9}{8 \cdot 14} = \frac{3 \cdot 9}{8 \cdot 2} = \\ = \frac{27}{16} = 1\frac{11}{16}.$$

3) Вычислите $\frac{5}{7} : 20$.

Решение.

$$\frac{5}{7} : 20 = \frac{5}{7} \cdot \frac{1}{20} = \frac{5}{7 \cdot 20} = \frac{1}{28}.$$

1.2.3. Нахождение части от целого и целого по его части

Нахождение части от целого и целого по его части	
Нахождение части от целого	Чтобы найти часть от числа, выраженную дробью, нужно это число умножить на данную дробь. <i>Пример</i> В школе из 200 учеников $\frac{3}{4}$ занимаются спортом. Сколько учеников школы занимаются спортом? Решение. $200 \cdot \frac{3}{4} = \frac{200 \cdot 3}{4} = 150 \text{ учеников.}$

Нахождение целого по части	Чтобы найти число по его части, выраженной дробью, нужно разделить на эту дробь число, ей соответствующее. <i>Пример</i> 150 учеников занимаются спортом, это $\frac{3}{4}$ всех учащихся. Сколько всего учеников в данной школе? Решение. $150 : \frac{3}{4} = \frac{150 \cdot 4}{3} = 200 \text{ учеников.}$
Нахождение части в долях целого	Чтобы выразить часть в долях целого, надо разделить часть на целое. <i>Примеры</i> 1) 150 школьников из 200 учеников данной школы занимаются спортом. Какая часть школьников занимается спортом? Решение. $\frac{150}{200} = \frac{15}{20} = \frac{3}{4} \text{ всех школьников.}$ 2) Какую часть составляет 20 от 100? Решение. $\frac{20}{100} = \frac{2}{10} = 0,2 = \frac{1}{5}.$

1.2.4. Десятичная дробь, сравнение десятичных дробей

Десятичная дробь — это запись чисел, у которых знаменатели дробной части являются числами, кратными 10, в виде целой части и числителя дробной части, разделённых запятой. При этом числитель дробной части должен иметь столько цифр, сколько нулей в знаменателе.

Недостающие цифры записываются нулями перед числителем.

Если дробь правильная, то перед запятой пишут цифру 0.

Например,

$$5\frac{14}{1000} = 5\frac{014}{1000} = 5,014; \quad \frac{3}{100} = \frac{03}{100} = 0,03.$$

Сравнение десятичных дробей

1 способ

1. Уравнять число знаков после запятой, приписав справа нули.
2. Отбросить запятую, получив натуральное число.
3. Сравнить полученные натуральные числа.

Пример

Сравните 4,032 и 4,07.

Р е ш е н и е.

$4,07 = 4,070$; $4032 < 4070$; значит, $4,032 < 4,07$.

2 способ

1. Уравнять число знаков после запятой, приписав справа нули.
2. Сравнить десятичные дроби, начиная со старшего разряда.

Пример

Сравните числа 4,032 и 4,07.

Решение.

$4,07 = 4,070$; $4,032 < 4,070$, так как $3 < 7$ в разряде сотен, значит, $4,032 < 4,07$.

1.2.5. Арифметические действия с десятичными дробями

Сложение и вычитание

1. В числах, участвующих в данном действии, уравнять количество знаков справа от запятой.
2. Записать запятую под запятой, разряд под разрядом.
3. В ответе поставить запятую под запятыми.
4. Выполнить действие, как с натуральными числами.

Примеры

1) $2,31 + 53,407 = 55,717$.

$$\begin{array}{r} 2,310 \\ + 53,407 \\ \hline 55,717 \end{array}$$

2) $26,04 - 8,987 = 26,040 - 8,987 = 17,053$.

$$\begin{array}{r} 26,040 \\ - 8,987 \\ \hline 17,053 \end{array}$$

Умножение

1. Записать множители один под другим.
2. Выполнить умножение, как с натуральными числами.
3. Отделить запятой справа от неё столько цифр, сколько было в обоих множителях.

Примеры

1) $4,8 \cdot 6,3 = 30,24$.   2) $6,005 \cdot 13,1 = 78,6655$.

$$\begin{array}{r} 4,8 \\ \times 6,3 \\ \hline 144 \\ + 288 \\ \hline 30,24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6,005 \\ \times 13,1 \\ \hline 6005 \\ + 18015 \\ \hline 78,6655 \end{array}$$

Деление

1. Сдвинуть запятую в делителе до конца вправо, чтобы делитель стал натуральным числом.
2. На столько же знаков сдвинуть запятую в делимом.
3. Выполнить деление на натуральное число.

Пример

$6,36 : 0,006 = 6360 : 6 = 1060$.

$$\begin{array}{r} 6360 \mid 6 \\ - 6 \\ \hline 36 \\ 3 \\ - 0 \\ \hline 36 \\ - 36 \\ \hline 0 \end{array}$$

1.2.6. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби

Правило записи десятичной дроби в обыкновенную дробь или смешанное число

1. Целую часть десятичной дроби (слева от запятой) записывают как целую часть смешанного числа.
2. Если целая часть десятичной дроби равна нулю, то обыкновенная дробь будет правильной.
3. Дробную часть десятичной дроби (справа от запятой) записывают в числитель дробной части смешанного числа или в числитель правильной дроби.
4. В знаменатель дробной части смешанного числа или в знаменатель правильной дроби записывают единицу с таким количеством нулей, сколько цифр было в дробной части (справа от запятой) десятичной дроби.

Примеры

$$1) 5,008 = 5 \frac{8}{1000};$$

$$2) 17,03 = 17 \frac{3}{100};$$

$$3) 0,3 = \frac{3}{10}.$$

1.3. Рациональные числа

1.3.1. Целые числа

1.3.2. Модуль (абсолютная величина) числа

Определение модуля числа
$ x = \begin{cases} x, & \text{если } x \geq 0, \\ -x, & \text{если } x < 0. \end{cases}$
Геометрический смысл модуля
Модуль числа — это расстояние на координатной прямой от начала отсчёта до точки, обозначающей соответствующее число.   Данное расстояние измеряется в единичных отрезках.

Свойства модуля

$$|a| \geq 0;$$

$$|-a| = |a|;$$

$$|a^2| = |a|^2 = a^2;$$

$$|ab| = |a| \cdot |b|;$$

$$|a : b| = |a| : |b|, b \neq 0;$$

$$|a + b| \leq |a| + |b|;$$

$$|a - b| \geq |a| - |b|;$$

$$a^2 + b^2 \geq 2|ab|;$$

$$|x| = c, c \geq 0; x_1 = c, x_2 = -c;$$

$$|x| < c, c > 0; -c < x < c;$$

$$|x| > c, c > 0; x < -c, x > c.$$

1.3.3. Сравнение рациональных чисел

- Из двух чисел больше то, которое на координатной прямой расположено правее.

- Любое положительное число больше нуля и больше отрицательного числа.

Например, $5 > 0$; $7 > -5$.

- Любое отрицательное число меньше нуля.

Например, $-8 < 0$.

- Из двух отрицательных чисел больше то, модуль которого меньше.

Например, $-12 > -15$, так как $|-12| < |-15|$.

1.3.4. Арифметические действия с рациональными числами

Сложение

• Чтобы сложить рациональные числа с одинаковыми знаками, надо сложить их модули и перед суммой поставить их общий знак.

Например, $(-4) + (-8) = -12$.

• Чтобы сложить два рациональных числа с разными знаками, надо из большего модуля вычесть меньший и поставить знак числа большего модуля.

Например, $-4 + 8 = 4$, $-8 + 4 = -(8 - 4) = -4$.

• Сумма двух противоположных чисел равна 0.

Например, $-2\frac{1}{3} + 2\frac{1}{3} = 0$.

Вычитание

Чтобы вычесть одно число из другого, надо к уменьшаемому прибавить число, противоположное вычитаемому.

Например, $-6 - (-4,2) = -6 + 4,2 = -1,8$.

Упрощённое правило сложения чисел с разными и одинаковыми знаками

• Знак суммы берётся всегда от числа с бóльшим модулем.

• Если знаки одинаковые, то модули складываем.

• Если знаки разные, то из бóльшего модуля вычитаем меньший.

Например, $-5 + 7 = 7 - 5 = 2$;

7 — бóльший модуль, имеет знак «+».

$-9 - 10 = -(9 + 10) = -19$;

$|-10| = 10$ — бóльший модуль имеет знак «-».

Упрощённое правило умножения и деления чисел с одинаковыми и разными знаками

- Если у чисел одинаковые знаки, то в результате получаем число со знаком «плюс».
- Если знаки разные — «минус».
- Модули перемножаем или делим соответственно.

Примеры

$$1) -5,2 \cdot 3 = -(5,2 \cdot 3) = -15,6.$$

$$2) -6 \cdot (-4) = 6 \cdot 4 = 24.$$

$$3) 24 : (-1,2) = -(24 : 1,2) = -20.$$

$$4) -6 : (-4) = 6 : 4 = 1,5.$$

1.3.5. Степень с целым показателем

$$a^{-m} = \frac{1}{a^m}, a \neq 0$$

$$\frac{1}{a^{-m}} = a^m, a \neq 0$$

$$a^0 = 1$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-m} = \left(\frac{b}{a}\right)^m, a \neq 0, b \neq 0$$

1.3.6. Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок

Числовое выражение — запись, состоящая из чисел и различных действий.

Например, $5 \cdot (7,3 - 3)$; $18 + 6 \cdot 8$; $60 : 8$.

Значение числового выражения — число, получаемое в результате выполнения всех действий в числовом выражении.

Например, 9 — значение выражения $18 : 2$; 7 — значение выражения $(2 + 6 \cdot 4 + 2) : 4$.

- Действия первой ступени — сложение и вычитание.
- Действия второй ступени — умножение и деление.
- Действие третьей ступени — степень, частным случаем которой являются квадрат и куб числа.

Правила выполнения действий при нахождении значений выражений

- Если в выражении нет скобок и оно содержит действия только одной ступени, то их выполняют по порядку слева направо.
- Если выражение содержит действия первой, второй, третьей ступени и в нём нет скобок, то сначала выполняют действия третьей ступени, затем второй ступени и, наконец, действия первой ступени.
- Если в выражении есть скобки, то сначала выполняют действия в скобках (учитывая два предыдущих правила).

1.4. Действительные числа

Понятия числа от натурального до действительного

1.4.1. Квадратный корень из числа

Квадратный корень из числа a — число, квадрат которого равен a .

Например, квадратный корень из числа 25 равен -5 и 5 , так как $(-5)^2 = 25$ и $5^2 = 25$.

Арифметический квадратный корень из числа a — неотрицательное число, квадрат которого равен a . Знак « $\sqrt{\quad}$ » — знак арифметического квадратного корня (радикал).

Подкоренное выражение — выражение, стоящее под знаком корня.

Арифметический квадратный корень из числа a обозначается так: $\sqrt{a}$.

Извлечение квадратного корня — нахождение арифметического квадратного корня из числа.

Например, $\sqrt{16} = 4$; $\sqrt{49} = 7$; $\sqrt{1,96} = 1,4$; $\sqrt{0} = 0$.

- Если $a < 0$, то выражение не имеет смысла, так как квадрат любого числа неотрицателен.
- При $a \geq 0$ верно равенство $(\sqrt{a})^2 = a$.
- Выражение $\sqrt{a}$ имеет смысл при любом $a \geq 0$.

1.4.2. Корень третьей степени

Корень третьей степени из числа a — такое число, третья степень которого равна a .

Обозначается: $\sqrt[3]{a}$.

$$(\sqrt[3]{a})^3 = a.$$

1.4.3. Нахождение приближённого значения корня

Находить приближённые значения арифметического квадратного корня можно с помощью постепенного уточнения левой и правой границ.

Например, найдём приближённое значение $\sqrt{2}$ с тремя знаками после запятой.

Решение. $1 < \sqrt{2} < 2$, так как $1 < 2 < 4$. Определим цифру десятых, для этого возведём в квадрат числа 1,1; 1,2; 1,3 и т. д., пока не получим число, большее двух. $1,1^2 = 1,21$; $1,2^2 = 1,44$; $1,3^2 = 1,69$; $1,4^2 = 1,96$; $1,5^2 = 2,25$, следовательно, $1,4 < \sqrt{2} < 1,5$. Постепенно продолжая этот процесс, получим $\sqrt{2} \approx 1,414$.

1.4.4. Запись корней с помощью степени с дробным показателем

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

Например, $\sqrt{9} = 9^{\frac{1}{2}}$; $\sqrt[3]{27} = 27^{\frac{1}{3}}$; $\sqrt[5]{39^2} = 39^{\frac{2}{5}}$.

1.4.5. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения иррациональных чисел. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби

Иррациональные числа — числа, которые в десятичной записи представляют собой бесконечные непериодические десятичные дроби. Иррациональные числа могут быть положительными и отрицательными.

Например, $3,010011000111\dots$; $\sqrt{2} \approx 1,4142\dots$;
 $\pi \approx 3,1415926\dots$

1.4.6. Сравнение действительных чисел

Действительные числа, записанные с помощью бесконечных десятичных дробей, сравнивают по тем же правилам, что и конечные десятичные дроби.

Примеры

- 1) Сравним числа $2,36366\dots$ и $2,37011\dots$. В этих положительных бесконечных десятичных дробях совпадают целые части и цифры десятых, а в разряде сотых у первой дроби число единиц меньше, чем у второй. Поэтому $2,36366\dots < 2,37011\dots$
- 2) Сравним числа $0,253$ и $-0,149\dots$. Первое из этих чисел положительное, а второе отрицательное. Поэтому $0,253 > -0,149\dots$

1.5. Измерения, приближения, оценки

1.5.1. Единицы измерения

Единицы длины	
Миллиметр	$1 \text{ мм} = 0,1 \text{ см} = 0,01 \text{ дм} = 0,001 \text{ м}$
Сантиметр	$1 \text{ см} = 10 \text{ мм} = 0,1 \text{ дм} = 0,01 \text{ м}$
Дециметр	$1 \text{ дм} = 100 \text{ мм} = 10 \text{ см} = 0,1 \text{ м}$
Метр	$1 \text{ м} = 1000 \text{ мм} = 100 \text{ см} = 10 \text{ дм} = 0,001 \text{ км}$
Километр	$1 \text{ км} = 1000 \text{ м}$
Единицы площади	
Квадратный миллиметр	$1 \text{ мм}^2 = 0,01 \text{ см}^2 = 0,0001 \text{ дм}^2$
Квадратный сантиметр	$1 \text{ см}^2 = 100 \text{ мм}^2 = 0,01 \text{ дм}^2 = 0,0001 \text{ м}^2$
Квадратный дециметр	$1 \text{ дм}^2 = 10\,000 \text{ мм}^2 = 100 \text{ см}^2 = 0,01 \text{ м}^2$
Квадратный метр	$1 \text{ м}^2 = 10\,000 \text{ см}^2 = 100 \text{ дм}^2 = 0,01 \text{ а} = 0,0001 \text{ га}$
Ар	$1 \text{ а} = 100 \text{ м}^2 = 0,01 \text{ га} = 0,0001 \text{ км}^2$
Гектар	$1 \text{ га} = 10\,000 \text{ м}^2 = 100 \text{ а} = 0,01 \text{ км}^2$
Квадратный километр	$1 \text{ км}^2 = 100 \text{ га} = 10\,000 \text{ а}$

Единицы объёма	
Кубический миллиметр	$1 \text{ мм}^3 = 0,001 \text{ см}^3 = 0,000001 \text{ дм}^3$
Кубический сантиметр	$1 \text{ см}^3 = 1000 \text{ мм}^3 = 0,001 \text{ дм}^3$
Кубический дециметр	$1 \text{ дм}^3 = 1000 \text{ см}^3 = 1\,000\,000 \text{ мм}^3 = 0,001 \text{ м}^3$
Кубический метр	$1 \text{ м}^3 = 1\,000\,000 \text{ см}^3 = 1000 \text{ дм}^3 = 0,000000001 \text{ км}^3$
Кубический километр	$1 \text{ км}^3 = 1\,000\,000\,000 \text{ м}^3$
Единицы массы	
Грамм	$1 \text{ г} = 1000 \text{ мг}$
Килограмм	$1 \text{ кг} = 1000 \text{ г}$
Центнер	$1 \text{ ц} = 100 \text{ кг} = 0,1 \text{ т}$
Тонна	$1 \text{ т} = 1000 \text{ кг} = 10 \text{ ц}$
Единицы времени	
Секунда	$1 \text{ с} = \frac{1}{60} \text{ мин} = \frac{1}{3600} \text{ ч}$
Минута	$1 \text{ мин} = 60 \text{ с} = \frac{1}{60} \text{ ч}$
Час	$1 \text{ ч} = 60 \text{ мин} = 3600 \text{ с}$
Сутки	$1 \text{ сутки} = 24 \text{ ч} = 1440 \text{ мин}$
Неделя	$1 \text{ нед} = 7 \text{ суток}$

1.5.2. Стандартный вид числа

Стандартный вид числа a — запись числа в виде $b \cdot 10^n$, где $1 \leq b < 10$ и n — порядок числа a .

Порядок числа показывает, насколько оно велико или мало.

Так, если порядок числа a равен 3, то это означает, что $1000 \leq a < 10\,000$; если порядок числа a равен -2 , то $0,01 \leq a < 0,1$.

1.5.3. Представление зависимости между величинами в виде формул

Формула — запись какого-либо правила с помощью букв.

Примеры формул

Формула пути	$s = vt$	s — путь, v — скорость, t — время
Формула площади прямоугольника	$S = ab$	S — площадь прямоугольника, a — длина, b — ширина прямоугольника
Формула площади квадрата	$S = a^2$	S — площадь квадрата, a — сторона квадрата
Формула объёма прямоугольного параллелепипеда	$V = abc$	V — объём, a — длина, b — ширина, c — высота
Формула объёма куба	$V = a^3$	V — объём, a — длина ребра куба

1.5.4. Проценты. Нахождение процента от величины и величины по её проценту

Процент (%) — сотая часть числа.

$$\frac{1}{100} = 0,01 = 1 \%$$

Нахождение процента от величины

Например, требуется найти 13% от 80.

Решение.

$$0,13 \cdot 80 = 10,4.$$

Нахождение величины по её проценту

Например, имеем 10,4 — это 13%. Необходимо найти 100%.

Решение.

$$10,4 : 0,13 = 80.$$

• Если в условии задачи сказано, что число увеличилось (уменьшилось) на r %, то надо прибавить (вычесть) r % к(из) 100 %, то есть получится $100 \% + r \%$ ($100 \% - r \%$), затем записать результат в виде дроби и умножить на первоначальное число.

Примеры

1) Цена товара 200 руб. Через месяц эта цена выросла на 30 %. Какова новая цена товара?

Решение. $100 \% + 30 \% = 130 \% = 1,3$.

$$200 \cdot 1,3 = 260 \text{ (руб.)}$$

Ответ: 260 рублей.

2) Первоначальная цена товара 300 руб. Скидка составила 40 %. Найти новую цену.

Решение. $100 \% - 40 \% = 60 \% = 0,6$.

$$300 \cdot 0,6 = 180 \text{ (руб.)}$$

Ответ: 180 рублей.

1.5.5. Отношение, выражение отношения в процентах

Отношение двух чисел — частное двух чисел.

• Отношение двух чисел показывает, во сколько первое число больше второго или какую часть первое число составляет от второго.

Пример

Отношение числа 12 к числу 4 есть частное $12 : 4 = 3$, значит, 12 больше 4 в 3 раза. Отношение числа $5\frac{1}{4}$ к числу $6\frac{1}{8}$ есть частное $5\frac{1}{4} : 6\frac{1}{8} = \frac{6}{7}$, следовательно, число $5\frac{1}{4}$ составляет $\frac{6}{7}$ от числа $6\frac{1}{8}$.

Отношение величин (отношение длин, отношение масс, отношение площадей и т. д.) — отношение значений этих величин, измеренных одной и той же единицей измерения.

Пример

Известно, что масса ребёнка — 20 кг, а масса взрослого человека 70 кг, тогда отношение масс равно $20 \text{ кг} : 70 \text{ кг} = \frac{20 \text{ кг}}{70 \text{ кг}} = \frac{2}{7}$, т. е. масса ребёнка составляет $\frac{2}{7}$ от массы взрослого человека.

• Отношения часто выражают в процентах.

Пример

В классе 5 отличников из 25 учеников.

$$\frac{5}{25} = \frac{1}{5} = 0,2 = 20 \%$$

Значит, в этом классе 20 % отличников.

1.5.6. Пропорция. Прямая и обратно пропорциональная зависимости

Пропорция — равенство двух отношений:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ или } a : b = c : d, \text{ где}$$

a, d — крайние члены пропорции;

b, c — средние члены пропорции.

Основное свойство пропорции

Если $ad = bc$, то $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ верно.

Прямо пропорциональная зависимость

Если при увеличении (или уменьшении) величины m величина n во столько же раз увеличивается (или уменьшается), то m и n прямо пропорциональны.

Примеры прямо пропорциональных величин

- Количество товара и его стоимость при постоянной цене.
- Скорость и длина пути при постоянном времени.
- Длина пути, проходимого равномерно движущимся телом, и время его движения.
- Длина прямоугольника и его площадь при постоянной ширине.
- Объём параллелепипеда и площадь его основания при постоянной высоте.
- Величина дроби и её числитель при постоянном знаменателе.
- Объём выполненной работы и затраченное на неё время при постоянной производительности труда.
- Производительность труда и объём выполненной работы при постоянном времени.

Обратно пропорциональная зависимость

Если при увеличении (при уменьшении) величины m величина n во столько же раз соответственно уменьшается (увеличивается), то эти величины обратно пропорциональны.

Примеры обратно пропорциональных величин

- Количество товара и его цена при одинаковой стоимости покупки.
- Скорость и время движения равномерно движущегося объекта при одинаковой длине пути.
- Производительность труда и время работы при одинаковом объёме работы.
- Число рабочих и время выполнения ими заданной работы при одинаковой производительности труда всех рабочих.
- Величина дроби и её знаменатель при постоянном числителе.

1.5.7. Округление чисел

Округление числа до целых — замена числа ближайшим к нему натуральным числом или нулём.

Округление числа до какого-либо десятичного разряда — замена данного числа ближайшим к нему числом, в котором следующие за этим разрядом цифры заменяют нулями, а если они стоят после запятой, то их отбрасывают.

**Правило округления чисел
до какого-либо десятичного разряда**

1. Заменяют нулями цифры, стоящие правее данного разряда, а если они стоят после запятой, то их отбрасывают.
2. Если цифра в следующем разряде после данного разряда равна 0, 1, 2, 3, 4, то в данном разряде оставляют ту же цифру, которая была.
3. Если цифра в следующем разряде после данного разряда равна 5, 6, 7, 8, 9, то к цифре данного разряда прибавляют единицу.

Примеры

1) Округлим число 3,76 до десятых.

Решение.

В разряде сотых цифра 6, поэтому десятые увеличиваем на 1, остальные разряды обнуляем, а так как нули оказываются после запятой, то отбрасываем их, $3,76 \approx 3,8$.

2) Округлим число 6324,5 до тысяч.

Решение.

В разряде сотен цифра 3, значит, тысячи оставляем без изменения, остальные разряды обнуляем, а стоящие после запятой отбрасываем, $6324,5 \approx 6000$.

3) Округлим 7835 до сотен; до тысяч.

Решение.

$7835 \approx 7800$ — округление до сотен; $7835 \approx 8000$ — округление до тысяч.

2. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ

2.1. Буквенные выражения (выражения с переменными)

2.1.1. Буквенные выражения.

Числовое значение буквенного выражения

Числовые выражения — выражения, составленные из чисел, знаков математических действий и скобок.

Значение числовых выражений — число, которое получается в результате выполнения действий.

Например, $7 - (6,5 + 9)$; $(8 - 6,3)^2$ — числовые выражения.

Буквенные выражения (выражения с переменными) — выражения, составленные из чисел, букв, знаков математических действий и скобок.

Например, $(a + b)^2$; $x - 2y + 5z$; $\frac{a - 7c}{5}$ — буквенные выражения.

Значения выражения с переменными — значение числового выражения, полученного, если в выражении с переменными подставить вместо каждой переменной какое-либо её значение.

Примеры

1) Если $a = 4$, $b = 0,6$, то $2a + 3b = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 0,6 = 8 + 1,8 = 9,8$.

2) Если $a = -2$, $b = 6$, то $2a + 3b = 2 \cdot (-2) + 3 \cdot 6 = -4 + 18 = 14$.

2.1.2. Допустимые значения переменных, входящих в выражения с переменными

Допустимые значения переменных — значения, при которых выражение с переменными имеют смысл, т. е. при которых не образуется числовое выражение, содержащее деление на нуль.

Например, выражение $\frac{a}{x-4}$ имеет смысл при любом значении a и при любом x , кроме $x = 4$; выражение $a(a-4)$ имеет смысл при любом значении a , выражение $\frac{a}{2x+4}$ имеет смысл при $x \neq -2$.

2.1.3. Подстановка выражений вместо переменных

Вместо переменных можно подставлять не только числа, но и выражения. Это применяется при:

• подстановке выражений в формулы.

Пример

Задана формула $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.

Если $a = x + 3$, $b = x - 4$, то $(x+3)^2 - (x-4)^2 = (x+3-x+4)(x+3+x-4) = 7(2x-1)$.

• подстановке выражений при решении систем методом подстановки.

Примеры

$$\begin{cases} x + y = 8, \\ 5(x - y) = 6; \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = 8 - x, \\ 5(x - 8 + x) = 6. \end{cases}$$

2.1.4. Равенство буквенных выражений, тождество. Преобразования выражений

Тождество — равенство, верное при всех допустимых значениях входящих в него переменных.

Тождественно равные выражения — два выражения, принимающие равные значения при всех допустимых для них значениях переменных, причём области допустимых значений у них должны совпадать.

Тождественное преобразование выражения — замена одного выражения другим, тождественно равным ему.

2.2. Свойства степени с целым показателем

$$a^{-m} = \frac{1}{a^m}, a \neq 0$$

$$a^n \cdot a^k = a^{n+k}$$

$$a^n : a^k = a^{n-k}$$

$$(a^n)^k = a^{nk}$$

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

$$\left(\frac{a^n}{b^n}\right) = \left(\frac{a}{b}\right)^n, \text{ где } b \neq 0$$

2.3. Многочлены

2.3.1. Многочлен. Сложение, вычитание, умножение многочленов

Одночлен — выражение, которое может состоять из одного числа, одной переменной, степени переменной, а также любых произведений чисел, переменных и их степеней.

Стандартный вид одночлена — такой вид одночлена, в котором он представлен как произведение числового множителя (который обычно записывают перед остальными множителями слева и называют **коэффициентом одночлена**) и натуральных степеней различных переменных.

Многочлен — выражение, которое представляет собой сумму одночленов, в том числе многочленом считают и один одночлен.

Например, $-ax^2 + bx + 7$; $4x - 8$; $3x$; $a^2 - 2ab + b^2$.

Члены многочлена — одночлены, из которых составлен многочлен.

Например, в многочлене $13x + 0,5x^2 - ab$ членами являются $13x$; $0,5x^2$; $-ab$.

Многочлен стандартного вида — многочлен, в котором каждый член — одночлен стандартного вида, и многочлен не содержит подобных членов.

Сложение и вычитание многочленов

1. Раскрыть скобки.
2. Привести каждый одночлен к стандартному виду.
3. Привести подобные слагаемые.

Умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен

- Чтобы умножить одночлен на многочлен, нужно умножить этот одночлен на каждый член многочлена и полученные произведения сложить.
- Чтобы умножить многочлен на многочлен, нужно каждый член одного многочлена умножить на каждый член другого многочлена и полученные произведения сложить.

2.3.2. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности, формула разности квадратов

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2.$$

Примеры

$$1) (3 + a)^2 = 9 + 6a + a^2.$$

$$2) (7 - 5x)^2 = 49 - 70x + 25x^2.$$

$$3) (4 - 2m)(4 + 2m) = 16 - 4m^2.$$

2.3.3. Разложение многочлена на множители

Вынесение общего множителя за скобки
$mk + mp = m(k + p)$

Формулы сокращённого умножения
$m^2 - k^2 = (m - k)(m + k)$
$m^2 + 2mk + k^2 = (m + k)^2$
$m^2 - 2mk + k^2 = (m - k)^2$
$m^3 + k^3 = (m + k)(m^2 - mk + k^2)$
$m^3 - k^3 = (m - k)(m^2 + mk + k^2)$
$m^3 + 3m^2k + 3mk^2 + k^3 = (m + k)^3$
$m^3 - 3m^2k + 3mk^2 - k^3 = (m - k)^3$
$m^4 - k^4 = (m^2 - k^2)(m^2 + k^2) = (m - k)(m + k)(m^2 + k^2)$
<i>Примеры</i>
1) $3xm^3 - 6x^2m^2 = 3xm^2(m - 2x)$.
2) $25x^2 - 36y^2m^4 = (5x - 6ym^2)(5x + 6ym^2)$.
3) $4 + 12x + 9x^2 = (2 + 3x)^2$.
4) $9a^2m^2 - 24am + 16 = (3am - 4)^2$.
5) $x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$.
6) $27m^3 - 64 = (3m - 4)(3m^2 + 12m + 16)$.

Метод группировки
$mk + mp + tk + tp = m(k + p) + t(k + p) = (k + p)(m + t)$
<i>Пример</i>
$3x - 21 + mx - 7m = 3(x - 7) + m(x - 7) = (x - 7)(3 + m)$.

**2.3.4. Квадратный трёхчлен.
Теорема Виета.
Разложение квадратного трёхчлена
на линейные множители**

Квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c, a \neq 0$	
$ax_1^2 + bx_1 + c = 0,$ $ax_2^2 + bx_2 + c = 0,$ где x_1 и x_2 — корни квадратного трёхчлена	Теорема Виета $\begin{cases} x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}, \\ x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}. \end{cases}$
Разложение на множители $ax^2 + bx + c =$ $= a(x - x_1)(x - x_2),$ если x_1 и x_2 существуют	Если $a = 1,$ то $\begin{cases} x_1 \cdot x_2 = c, \\ x_1 + x_2 = -b. \end{cases}$

**2.3.5. Степень и корень многочлена
с одной переменной**

Многочлен с одной переменной $p(x) = a_1x^n + a_2x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$	
n — степень многочлена с одной переменной, записанного в стандартном виде.	$p(x_n) = 0,$ где x_n — корень многочлена с одной переменной.

2.4. Алгебраическая дробь

2.4.1. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей

Алгебраическая дробь — выражение $\frac{P}{Q}$, где P и Q — многочлены. P — числитель алгебраической дроби; Q — знаменатель алгебраической дроби.

Над алгебраическими дробями можно осуществлять преобразования, аналогичные тем, которые выполняются для обыкновенных дробей (см. п. 1.2.2).

Примеры алгебраических дробей:

$$\frac{x+3}{x^2-7}; \frac{2x^2-x^3}{x}; \frac{7}{-x+1}.$$

Сокращение алгебраической дроби на ненулевое рациональное алгебраическое выражение — это деление числителя и знаменателя алгебраической дроби на это выражение.

Пример

$$\frac{x^2+6x}{3x} = \frac{x(x+6)}{3x} = \frac{x+6}{3}.$$

2.4.2. Рациональные выражения и их преобразования

Рациональные выражения	
Целые выражения <i>Например, $8a^2b$;</i> $a^5 + b^5; \frac{3x-y}{2}.$	Дробные выражения <i>Например,</i> $\frac{2x+y}{4x^2}; \frac{ax+by}{2+y}; a + \frac{a+3}{b-4}.$

Преобразования рациональных выражений

Преобразование любого рационального выражения сводится к сложению, вычитанию, умножению и делению рациональных дробей с учётом порядка выполнения действий.

Из правил действия с дробями следует, что сумму, разность, произведение и частное рациональных дробей всегда можно представить в виде рациональной дроби. Значит, и всякое рациональное выражение можно представить в виде рациональной дроби.

2.5. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях

Квадратный корень из числа a — число, квадрат которого равен a .

Свойства квадратных корней

$$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$
$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}, b > 0, a \geq 0$$

$$(\sqrt{a})^2 = a$$
$$\sqrt{a^2} = |a|$$

Примеры

1) $\sqrt{36} = 6$;

2) $\sqrt{0,64} = 0,8$;

3) $\sqrt{49} \cdot \sqrt{16} = 7 \cdot 8 = 28$;

4) $\sqrt{36} \cdot \sqrt{0,36} = 6 \cdot 0,6 = 3,6$;

5) $\sqrt{75 \cdot 48} = \sqrt{25 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 16} = 5 \cdot 3 \cdot 4 = 60$;

6) $\frac{\sqrt{25}}{\sqrt{64}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{64}} = \frac{5}{8}$;

7) $\sqrt{(-21)^2} = |-21| = 21$.

3. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА

3.1. Уравнения

3.1.1. Уравнение с одной переменной, корень уравнения

Уравнение с одной переменной (уравнение с одной неизвестной) — равенство, содержащее переменную.

Корень уравнения — значение переменной, при котором уравнение обращается в верное равенство.

Решить уравнение — найти все его корни или доказать, что корней нет.

Правила решения уравнений

- Если любое слагаемое перенести из одной части уравнения в другую, изменив при этом знак слагаемого, то корни уравнения не изменятся.
- Если обе части уравнения умножить или разделить на одно и то же число, не равное нулю, то корни уравнения не изменятся.

3.1.2. Линейное уравнение

Линейные уравнения — целые уравнения вида $ax + b = 0$, где x — переменная, a и b — некоторые числа.

Решение линейных уравнений

- Если $a \neq 0, b \neq 0$, то $x = -\frac{b}{a}$;
- если $a \neq 0, b = 0$, то $x = 0$;
- если $a = 0, b \neq 0$, то корней нет;
- если $a = 0, b = 0$, то x — любое число.

Алгоритм решения уравнений

Слагаемые, содержащие переменную, перенести в левую часть уравнения, при этом меняя знаки на противоположные.

Числа перенести в правую часть уравнения, при этом меняя знаки на противоположные.

Привести подобные слагаемые в левой части.

Привести подобные слагаемые в правой части.

Разделить число правой части на коэффициент при переменной.

Записать ответ.

3.1.3. Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения

Квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$

Неполные квадратные уравнения

↓	↓	↓
• при $c = 0, b \neq 0$ $ax^2 + bx = 0$ $x(ax + b) = 0$ $x = 0$ или $x = -\frac{b}{a}$	• при $c = 0, b = 0$ $ax^2 = 0$ $x^2 = 0$ $x = 0$	• при $c \neq 0, b = 0$ $ax^2 + c = 0$ $x^2 = -\frac{c}{a}$ $x = \pm \sqrt{-\frac{c}{a}}$ если $-\frac{c}{a} < 0$, то корней нет

Вычисление дискриминанта
и корней квадратного уравнения

- $D = b^2 - 4ac, x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$
- Если b — чётное, то $D_1 = k^2 - ac, k = \frac{b}{2}$,
 $x_{1,2} = \frac{-k \pm \sqrt{D_1}}{a}$

Теорема Виета

$ax^2 + bx + c = 0$ $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$ $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$	$x^2 + bx + c = 0 (a = 1)$ — приведённое квадратное уравнение $x_1 \cdot x_2 = c$ $x_1 + x_2 = -b$

**Решение неприведённого квадратного
уравнения по теореме Виета**

$$ax^2 + bx + c = 0 \rightarrow m^2 + bm + ac = 0$$

$$D = b^2 - 4ac, x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, m_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2}, x_{1,2} = \frac{m_{1,2}}{a},$$

находим $m_{1,2}$ по теореме Виета.

Пример

Решите уравнение: $3x^2 - 14x + 16 = 0$.

1) **Решение.**

$$D = b^2 - 4ac = (-14)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 16 = 196 - 192 = 4 > 0 \rightarrow$$

$\rightarrow 2$ корня.

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} = \frac{14 + \sqrt{4}}{2 \cdot 3} = \frac{14 + 2}{6} = \frac{16}{6} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}.$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{14 - \sqrt{4}}{2 \cdot 3} = \frac{14 - 2}{6} = \frac{12}{6} = 2.$$

О т в е т: $x_1 = 2\frac{2}{3}, x_2 = 2$.

2) $b = 14$ — чётное, $k = \frac{b}{2}$.

Решение.

$$D = k^2 - ac = 7^2 - 3 \cdot 16 = 49 - 48 = 1.$$

$$x_1 = \frac{-k + \sqrt{D_1}}{a} = \frac{7 + 1}{3} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}.$$

$$x_2 = \frac{-k - \sqrt{D_1}}{a} = \frac{7 - 1}{3} = \frac{6}{3} = 2.$$

О т в е т: $x_1 = 2\frac{2}{3}, x_2 = 2$.

3) **Решение.** Применяя теорему Виета, перепишем данное уравнение в виде $m^2 + bm + ac = 0$, $a = 1 \rightarrow \rightarrow m^2 - 14m + 3 \cdot 16 = 0$, $m^2 - 14m + 48 = 0$.

$x_1 = \frac{m_1}{3}$, $x_2 = \frac{m_2}{3}$, m_1 и m_2 находим подбором:

$m_1 \cdot m_2 = c$, $m_1 + m_2 = -b \rightarrow 8 \cdot 6 = 48$, $8 + 6 = 14$.

$x_1 = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$, $x_2 = \frac{6}{3} = 2$. Теперь проверяем корни:

$$\frac{8}{3} \cdot 2 = \frac{16}{3} = \frac{c}{a}, \quad \frac{8}{3} + \frac{6}{3} = \frac{14}{3} = -\frac{b}{a}.$$

3.1.4. Решение рациональных уравнений

Рациональное уравнение — уравнение, левая и правая части которого являются рациональными выражениями.

Алгоритм решения рационального уравнения

Разделить левую и правую части уравнения на общий делитель, если таковой имеется.

Разложить на множители многочлены в знаменателях, если они раскладываются.

Домножить на наименьший общий знаменатель левую и правую части уравнения.

Решить полученное целое уравнение.

Проверить корни уравнения, не превращают ли они знаменатель первоначального уравнения в нуль. Если да, то исключить такие корни.

Записать ответ.

Примеры

$$1) \frac{x-3}{x-5} = 2^{x-5} \mid (x-5) \neq 0, x \neq 5.$$

$$x-3 = 2x-10, x = 7.$$

О т в е т: 7.

$$2) \frac{4^{x-4}}{x-9} + \frac{9^{x-9}}{x-4} = 2^{x^2-13x+36} \mid (x-9)(x-4) \neq 0, \\ x \neq 9, x \neq 4.$$

$$4x-16 + 9x-81 = 2x^2-26x+72,$$

$$2x^2-39x+72+97=0,$$

$$2x^2-39x+169=0.$$

$$x_1 = \frac{13}{2}, x_1 = 6,5; x_2 = \frac{26}{2}, x_2 = 13.$$

О т в е т: 6,5; 13.

$$3) \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{2^{x-1}}{x-1} - 3^{x^2-2x+1} = 0 \mid (x-1)^2 \neq 0, x \neq 1.$$

$$1 + 2x - 2 - 3x^2 + 6x - 3 = 0,$$

$$3x^2 - 8x + 4 = 0.$$

$$x_1 = \frac{2}{3}; x_2 = \frac{6}{3}, x_2 = 2.$$

О т в е т: $\frac{2}{3}$; 2.

$$4) \frac{60}{x+10} + 3 = \frac{60}{x} \mid : 3$$

$$\frac{20^x}{x+10} + 1^{x^2+10x} = \frac{20^{x+10}}{x} \mid x(x+10) \neq 0, x \neq 0, \\ x \neq -10.$$

$$20x + x^2 + 10x = 20x + 200,$$

$$x^2 + 10x - 200 = 0,$$

$$x_1 = -20, x_2 = 10.$$

О т в е т: -20; 10.

3.1.5. Примеры решения уравнений высших степеней.

Решение уравнений
методом замены переменной.

Решение уравнений
методом разложения на множители

Решение уравнений высших степеней методом замены переменной

Примеры

Биквадратное уравнение вида $ax^4 + bx^2 + c = 0$

1) Решите уравнение: $x^4 + 2x^2 - 8 = 0$.

Решение.

Сделаем замену переменной.

Пусть $x^2 = t$, тогда $t^2 + 2t - 8 = 0$.

Отсюда $t_1 = -4$, $t_2 = 2$.

Возвращаемся к замене, получаем:

$x^2 = -4$ (не подходит) или $x^2 = 2 \rightarrow x = \pm\sqrt{2}$.

О т в е т: $x = \pm\sqrt{2}$.

2) Решите уравнение: $(x + 1)^4 + 5(x + 1)^2 - 6 = 0$.

Решение.

Сделаем замену переменной.

Пусть $(x + 1)^2 = t$, тогда $t^2 + 5t - 6 = 0$.

Отсюда $t_1 = 1$, $t_2 = -6$.

Возвращаемся к замене, получаем:

$(x + 1)^2 = 1$ или $(x + 1)^2 = -6$ (не подходит).

$x + 1 = -1 \rightarrow x = -2$ или $x + 1 = 1 \rightarrow x = 0$.

О т в е т: $-2; 0$.

**Решение уравнений высших степеней
методом разложения на множители**

Примеры

1) Решите уравнение: $x^3 + 4x^2 - 9x - 36 = 0$.

Решение.

$$\begin{aligned}x^2(x+4) - 9(x+4) &= 0, (x+4)(x^2-9) = 0, \\(x+4)(x-3)(x+3) &= 0, x+4=0 \rightarrow x=-4 \text{ или} \\x-3=0 \rightarrow x=3 \text{ или } x+3=0 &\rightarrow x=-3.\end{aligned}$$

О т в е т: $-4; -3; 3$.

2) Решите уравнение:

$$(2x-6)^2(x-6) = (2x-6)(x-6)^2.$$

Решение.

$$\begin{aligned}(2x-6)^2(x-6) - (2x-6)(x-6)^2 &= 0, \\(2x-6)(x-6)(2x-6-x+6) &= 0, \\(2x-6)(x-6)x &= 0, \\2x-6=0 \rightarrow x=3 \text{ или } x-6=0 &\rightarrow x=6 \text{ или } x=0.\end{aligned}$$

О т в е т: $0; 3; 6$.

**3.1.6. Уравнение с двумя переменными;
решение уравнения с двумя переменными**

Уравнение с двумя переменными — равенство, содержащее две переменные.

Например, $xy = 7; y + x = -0,4; y^2 - x^2 = 4 + 6x$.

Линейное уравнение с двумя переменными — уравнение вида $ax + by = c$, где x и y — переменные, а a , b и c — некоторые числа.

Например, $5x + 4y = 1,8; \frac{1}{6}x - 8y = 2\frac{5}{9}; x + y = 0$.

Решение уравнения с двумя переменными — пара значений переменных, которая обращает данное уравнение в верное равенство.

Пример

Для уравнения $2x + y = 6$ некоторыми решениями являются пары чисел: $x = 3, y = 0$; $x = 10, y = -14$; $x = 0, y = 6$; а пары чисел $x = 3, y = 2$; $x = 5, y = 7$ не будут решениями этого уравнения.

График уравнения с двумя переменными — множество всех точек координатной плоскости, абсциссы и ординаты которых являются решениями этого уравнения.

3.1.7. Система уравнений; решение системы

Система уравнений — некоторое количество уравнений, объединённых фигурной скобкой. Фигурная скобка означает, что все уравнения должны выполняться одновременно относительно нескольких переменных.

Пример

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 3, \\ 3x + y + 2z = 8, \\ 2x + 3y + z = 6. \end{cases}$$

Решение системы уравнений — значения переменных, обращающие каждое уравнение системы в верное равенство.

Решить систему уравнений — значит найти все её решения или установить, что их нет.

3.1.8. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим способом

Система линейных уравнений с двумя переменными — система вида

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2; \end{cases}$$

где $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2$ — некоторые числа, x и y — переменные.

Например,

$$\begin{cases} 2x - 3y = 5, \\ 15x - 6y = 4; \end{cases} \quad \begin{cases} x + y = 6, \\ x - y = 8. \end{cases}$$

Решение системы уравнений с двумя переменными — пара значений переменных, которая обращает каждое уравнение системы в верное равенство.

Способы решения систем линейных уравнений

↓	↓	↓
I. Графический способ	II. Способ подстановки	III. Способ сложения

I. Графический способ решения системы уравнений

Графический способ состоит в том, что в одной координатной плоскости строят два графика, каждый из которых соответствует одному из уравнений. Координаты точки пересечения этих графиков удовлетворяют и первому, и второму уравнению, т. е. являются решением системы.

**Решения системы линейных уравнений
с двумя переменными (в каждом уравнении
хотя бы один из коэффициентов не равен нулю)
графическим способом**

- Если графики уравнений (прямые) пересекаются, то система имеет единственное решение, равное координатам точки пересечения;
- если графики уравнений (прямые) параллельны, то система не имеет решений;
- если графики уравнений (прямые) совпадают, то система имеет бесконечно много решений.

**II. Способ подстановки для решения систем
линейных уравнений с двумя переменными**

1. Выражают одну переменную через другую в одном из уравнений системы.
2. Полученное выражение подставляют в другое уравнение системы вместо выраженной переменной.
3. Решают уравнение, получившееся в результате подстановки.
4. Полученное значение переменной подставляют в первое уравнение и находят значение оставшейся переменной.

Примеры

1) Решим систему уравнений:

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ x - y = 3. \end{cases}$$

Р е ш е н и е. Выразим переменную x через y из второго уравнения $x = y + 3$. Подставим в первое уравнение вместо переменной x выражение $y + 3$.

Решим полученное уравнение с переменной y :

$$(y + 3) + y = 7;$$

$$y + 3 + y = 7;$$

$$2y = 7 - 3; 2y = 4;$$

$$y = \frac{4}{2}; y = 2.$$

Подставим в уравнение $x = y + 3$ вместо y число 2.

$$x = 2 + 3; x = 5.$$

О т в е т: (5; 2).

2) Решим систему уравнений:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 9, \\ 3x - 6y = 10. \end{cases}$$

Р е ш е н и е.

$$\begin{cases} 2x + 3y = 9, \\ 3x - 6y = 10; \end{cases}$$

$$2x + 3y = 9; 3y = 9 - 2x;$$

$$y = \frac{9 - 2x}{3}; 3x - 6 \cdot \frac{9 - 2x}{3} = 10;$$

$$3x - 2 \cdot (9 - 2x) = 10;$$

$$3x - 18 + 4x = 10;$$

$$7x = 28;$$

$$x = \frac{28}{7}; x = 4; y = \frac{9 - 2 \cdot 4}{3}; y = \frac{1}{3}.$$

О т в е т: $(4; \frac{1}{3})$.

**III. Способ сложения
для решения систем линейных уравнений
с двумя переменными**

1. Уравнения системы почленно умножают на некоторые множители, которые подбирают таким образом, чтобы коэффициенты при одной из переменных в обоих уравнениях стали противоположными числами.
2. Левые и правые части уравнений почленно складывают.
3. Находят значение одной из переменных, решая получившееся уравнение с одной переменной.
4. Находят значение второй переменной, подставляя в оставшееся уравнение значение первой переменной.

Примеры

1)
$$\begin{cases} x + y = 5, \\ x - y = 6. \end{cases}$$

Р е ш е н и е.

Коэффициенты при переменной y в первом и втором уравнениях — противоположные числа -1 и 1 . Поэтому складываем почленно уравнения и получаем уравнение с одной переменной:

$$2x = 11; x = \frac{11}{2}; x = 5,5.$$

Найдём вторую переменную:

$$x + y = 5;$$

$$5,5 + y = 5; y = 5 - 5,5; y = -0,5.$$

О т в е т: $(5,5; -0,5)$.

$$2) \begin{cases} 12x - 5y = 1, \\ 6x + y = 4. \end{cases}$$

Решение.

Домножим второе уравнение на -2 , чтобы коэффициенты при переменной x были противоположными числами 12 и -12 .

$$\begin{cases} 12x - 5y = 1, \\ -2 \cdot 6x - 2 \cdot y = -2 \cdot 4; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 12x - 5y = 1, \\ -12x - 2y = -8. \end{cases}$$

Складываем почленно оба уравнения. Получаем:
 $-7y = -7$; $y = 1$; $6x + 1 = 4$; $6x = 4 - 1$; $6x = 3$;

$$x = \frac{3}{6}; x = \frac{1}{2}.$$

О т в е т: $\left(\frac{1}{2}; 1\right)$.

3.2. Неравенства

3.2.1. Числовые неравенства и их свойства

Числовые неравенства — соотношения вида $a > b$ и $a < b$.

Число a **больше** числа b , если разность $(a - b)$ — положительное число.

Число a **меньше** числа b , если разность $(a - b)$ — отрицательное число.

Свойства числовых неравенств		
1.	$a > b$	$b < a$
2.	$a > b$ и $b > c$	$a > c$
3.	$a > b$, c — любое число	$a + c > b + c$
4.	$a > b$ и $c > 0$	$ac > bc$
5.	$a > b$ и $c < 0$	$ac < bc$
6.	$a > b$ и $c > d$	$a + c > b + d$
7.	$a > b$ и $c > d$ $a > 0, b > 0, c > 0, d > 0$	$ac > bd$
8.	$a > b > 0$, n — натуральное число	$a^n > b^n$
9.	$a > b, a > 0, b > 0$	$\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$

Использование свойств числовых неравенств

Примеры

1) Оцените периметр и площадь прямоугольника со сторонами a и b , где $1,7 < a < 1,8$ и $2,3 < b < 2,4$.

Решение. Периметр $P = 2(a + b)$.

$$\begin{array}{r}
 1,7 < a < 1,8 \\
 + \quad 2,3 < b < 2,4 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$1,7 + 2,3 < a + b < 1,8 + 2,4$$

$$4 < a + b < 4,2$$

$$2 \cdot 4 < 2(a + b) < 2 \cdot 4,2$$

$$8 < P < 8,4$$

Площадь $S = ab$.

$$\begin{array}{r} 1,7 < a < 1,8 \\ \times \\ 2,3 < b < 2,4 \\ \hline \end{array}$$

$$1,7 \cdot 2,3 < ab < 1,8 \cdot 2,4 \\ 3,91 < S < 4,32$$

2) Оцените $-\frac{1}{a}$, где $2 < a < 4$.

Р е ш е н и е. $\frac{1}{4} < \frac{1}{a} < \frac{1}{2} \rightarrow -\frac{1}{4} > -\frac{1}{a} > -\frac{1}{2} \rightarrow$

$$\rightarrow -\frac{1}{2} < -\frac{1}{a} < -\frac{1}{4}.$$

3.2.2. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства

Решение неравенства с одной переменной — значение переменной, которое обращает его в верное числовое неравенство.

Решить неравенство — значит найти все его решения или доказать, что решений нет.

Равносильные неравенства — неравенства, имеющие одни и те же решения и не имеющие других решений.

Свойства неравенств

- Если из одной части неравенства перенести в другую слагаемое с противоположным знаком, то получится равносильное ему неравенство.
- Если обе части неравенства умножить или разделить на одно и то же положительное число, то получится равносильное ему неравенство.
- Если обе части неравенства умножить или разделить на одно и то же отрицательное число и изменить знак неравенства на противоположный, то получится равносильное ему неравенство.

3.2.3. Линейное неравенство с одной переменной

Линейные неравенства с одной переменной — неравенства вида $ax > b$ (или $ax < b$, $ax \geq b$, $ax \leq b$), а также равносильные им неравенства, где a и b — некоторые числа.

Решение неравенства $ax > b$

- Если $a > 0$, то $x > \frac{b}{a}$;
- если $a < 0$, то $x < \frac{b}{a}$;
- если $a = 0$ и $b > 0$, то нет решений;
- если $a = 0$ и $b < 0$, то x — любое число.

3.2.4. Системы линейных неравенств

Решение системы неравенств с одной переменной — значение переменной, при котором верно каждое из неравенств системы.

Решить систему — значит найти все её решения или доказать, что решений нет.

Примеры

1) Решите систему неравенств:

$$\begin{cases} 7x - 5 \geq 9, \\ 2x < 8. \end{cases}$$

Решение.

$$\begin{cases} 7x - 5 \geq 9, \\ 2x < 8; \end{cases} \quad \begin{cases} 7x \geq 14, \\ 2x < 8; \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq 2, \\ x < 4. \end{cases}$$

Отметим на координатной прямой числовые промежутки. Ответом служит их пересечение.

О т в е т: $[2; 4)$.

2) Решите систему неравенств:

$$\begin{cases} 2 - 10x \geq 7, \\ 3x + 4 \leq 4. \end{cases}$$

Решение.

$$\begin{cases} 2 - 10x \geq 7, \\ 3x + 4 \leq 4; \end{cases} \quad \begin{cases} -10x \geq 5, \\ 3x \leq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x \leq -0,5, \\ x \leq 0. \end{cases}$$

Отметим на координатной прямой числовые промежутки. Ответом служит их пересечение.

О т в е т: $(-\infty; -0,5]$.

3) Решите систему неравенств:

$$\begin{cases} 3x + 7 > 19, \\ 2 - 5x > 3. \end{cases}$$

Решение.

$$\begin{cases} 3x + 7 > 19, \\ 2 - 5x > 3; \end{cases} \begin{cases} 3x > 12, \\ -5x > 1; \end{cases} \begin{cases} x > 4, \\ x < -\frac{1}{5}. \end{cases}$$

Отметим на координатной прямой числовые промежутки. Пересечений нет, значит, система не имеет решений.

О т в е т: нет решений.

4) Решить неравенство: $-6 < 3x - 5 < 8$.

Решение.

1 способ.

Данное двойное неравенство $-6 < 3x - 5 < 8$ равносильно системе неравенств:

$$\begin{cases} 3x - 5 > -6, \\ 3x - 5 < 8; \end{cases} \begin{cases} 3x > 5 - 6, \\ 3x < 8 + 5; \end{cases} \begin{cases} 3x > -1, \\ 3x < 13; \end{cases} \begin{cases} x > -\frac{1}{3}, \\ x < 4\frac{1}{3}. \end{cases}$$

Отметим на координатной прямой числовые промежутки. Ответом служит их пересечение.

О т в е т: $x \in \left(-\frac{1}{3}; 4\frac{1}{3}\right)$.

2 способ.

Данное двойное неравенство можно решить, не преобразуя его в систему неравенств.

$$-6 < 3x - 5 < 8; -6 + 5 < 3x < 8 + 5; -1 < 3x < 13;$$

$$-\frac{1}{3} < x < \frac{13}{3}; -\frac{1}{3} < x < 4\frac{1}{3}.$$

О т в е т: $\left(-\frac{1}{3}; 4\frac{1}{3}\right)$.

3.2.5. Квадратные неравенства

Неравенство второй степени с одной переменной — неравенство вида $ax^2 + bx + c > 0$ (или $ax^2 + bx + c \geq 0$), $ax^2 + bx + c < 0$ (или $ax^2 + bx + c \leq 0$), где $a \neq 0$.

Схема решения квадратных неравенств

1. Находят дискриминант квадратного трёхчлена $D = b^2 - 4ac$ и выясняют, имеет ли этот трёхчлен корни.

2. Если корней нет, то схематически изображают параболу (при $a > 0$ она лежит в верхней полуплоскости, а её ветви направлены вверх; при $a < 0$ — в нижней полуплоскости, а её ветви направлены вниз). Если же корни есть, то их отмечают на оси абсцисс и через отмеченные точки схематически проводят параболу, у которой ветви направлены вверх при $a > 0$ или вниз при $a < 0$.

3. Находят промежутки оси абсцисс, на которых точки параболы расположены выше этой оси (при решении неравенства $ax^2 + bx + c > 0$) или ниже этой оси (при решении неравенства $ax^2 + bx + c < 0$).

Решение квадратного неравенства при $a > 0$			
$ax^2 + bx + c > 0$	$D < 0$	$x \in (-\infty; +\infty)$	Рис. а)
	$D = 0$	$x \in (-\infty; x_0) \cup (x_0; +\infty)$	Рис. б)
	$D > 0$	$x \in (-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$	Рис. в)
$ax^2 + bx + c \geq 0$	$D < 0$	$x \in (-\infty; +\infty)$	Рис. а)
	$D = 0$	$x \in (-\infty; +\infty)$	Рис. б)
	$D > 0$	$x \in (-\infty; x_1] \cup [x_2; +\infty)$	Рис. в)
$ax^2 + bx + c < 0$	$D < 0$	Нет решений	Рис. а)
	$D = 0$	Нет решений	Рис. б)
	$D > 0$	$x \in (x_1; x_2)$	Рис. в)
$ax^2 + bx + c \leq 0$	$D < 0$	Нет решений	Рис. а)
	$D = 0$	$x = x_0$	Рис. б)
	$D > 0$	$x \in [x_1; x_2]$	Рис. в)
а) б) в)			

Решение квадратного неравенства при $a < 0$			
$ax^2 + bx + c > 0$	$D < 0$	Нет решений	Рис. а)
	$D = 0$	Нет решений	Рис. б)
	$D > 0$	$x \in (x_1; x_2)$	Рис. в)
$ax^2 + bx + c \geq 0$	$D < 0$	Нет решений	Рис. а)
	$D = 0$	$x = x_0$	Рис. б)
	$D > 0$	$x \in [x_1; x_2]$	Рис. в)
$ax^2 + bx + c < 0$	$D < 0$	$x \in (-\infty; +\infty)$	Рис. а)
	$D = 0$	$x \in (-\infty; x_0) \cup (x_0; +\infty)$	Рис. б)
	$D > 0$	$x \in (-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$	Рис. в)
$ax^2 + bx + c \leq 0$	$D < 0$	$x \in (-\infty; +\infty)$	Рис. а)
	$D = 0$	$x \in (-\infty; +\infty)$	Рис. б)
	$D > 0$	$x \in (-\infty; x_1] \cup [x_2; +\infty)$	Рис. в)
а) б) в)			

Примеры

1) Решить неравенство $x^2 - x - 6 > 0$.

Решение. $x^2 - x - 6 = 0$; $D = 1 + 24 = 25$; $D > 0$;

$$x_1 = \frac{1+5}{2}; x_1 = 3; x_2 = \frac{1-5}{2}; x_2 = -2.$$

На рисунке изображена парабола $y = x^2 - x - 6$, пересекающая ось абсцисс при $x_1 = 3$; $x_2 = -2$. Эта парабола лежит выше оси абсцисс в промежутках $x \in (-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$.

О т в е т: $x \in (-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$.

2) Решить неравенство $x^2 + 5x + 7 > 0$.

Решение. $x^2 + 5x + 7 = 0$; $D = 25 - 28 = -3$.

Так как $D < 0$, то парабола $y = x^2 + 5x + 7$ лежит выше оси абсцисс при любых значениях x .

О т в е т: $x \in (-\infty; +\infty)$.

3.3. Текстовые задачи

3.3.1. Решение текстовых задач арифметическим способом

Примеры

1) Между городами A и B расстояние 600 км. Из города A в город B выехал мотоциклист со скоростью 50 км/ч, на два часа позже из города B в город A выехал автомобилист со скоростью 75 км/ч. На каком расстоянии от города B встретятся мотоциклист и автомобилист?

Решение.

Скорость v мот. — 50 км/ч;

скорость v авт. — 75 км/ч.

1. $50 \cdot 2 = 100$ (км) — мотоциклист проехал за 2 часа;

2. $600 - 100 = 500$ (км) — расстояние между мотоциклистом и автомобилистом в момент начала движения;

3. $50 + 75 = 125$ (км/ч) — скорость сближения автомобилиста и мотоциклиста;

4. $500 : 125 = 4$ (ч) — время до встречи;

5. $75 \times 4 = 300$ (км) — расстояние от пункта B до места встречи.

О т в е т: 300 км.

2) Две трубы заполняют бассейн за 1 ч 12 мин. Одна вторая труба заполняет бассейн за 3 ч. За сколько часов заполнит бассейн одна первая труба?

Р е ш е н и е.

Первая труба — ? ч,
вторая труба — за 3 ч,
две трубы — за 1 ч 12 мин. } 1 бассейн

$$1 \text{ ч } 12 \text{ мин} = 1 \text{ ч} + \frac{12}{60} \text{ ч} = 1\frac{1}{5} \text{ ч} = \frac{6}{5} \text{ ч}.$$

1) $1 : 3 = \frac{1}{3}$ (басс/ч) — вторая труба заполняет за час;

2) $1 : \frac{6}{5} = \frac{5}{6}$ (басс/ч) — первая и вторая труба вместе за час;

3) $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{5-2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ (басс/ч) первая труба за час;

4) $1 : \frac{1}{2} = 2$ (ч) — время работы первой трубы.

О т в е т: 2 ч.

3) Мимо пешехода, идущего вдоль железнодорожных путей со скоростью 4 км/ч, в том же направлении проезжает поезд со скоростью 64 км/ч. Длина поезда — 500 м. За сколько секунд поезд проедет мимо пешехода?

Решение:

v пешехода — 4 км/ч;

v поезда — 64 км/ч.

1) $64 - 4 = 60$ (км/ч) — скорость поезда относительно пешехода;

2) 60 км/ч = 1 км/мин = 1000 м/мин;

3) $500 : 1000 = \frac{500}{1000} = \frac{1}{2}$ (мин) = 30 (с) — время

движения поезда мимо пешехода.

О т в е т: 30 с.

3.3.2. Решение текстовых задач алгебраическим способом

Решение текстовых задач алгебраическим способом — это решение задач с помощью уравнений и систем уравнений.

Алгоритм решения

1. Составить таблицу:

а) в одной из колонок таблицы обозначить одну величину переменной, например, x ;

б) в другую колонку таблицы вписать известную величину из условия;

в) с помощью уже заполненных двух колонок таблицы получить выражение с переменной и записать его в свободную колонку.

2. С помощью выражений из таблицы составить уравнение.

3. Решить уравнение.

4. Записать в ответ числа, соответствующие вопросу задачи.

Примеры

1) Теплоход прошёл 30 км против течения реки, затем 40 км по течению. Общее время движения составило 5 часов. Скорость течения реки равна 5 км/ч.

Найдите скорость теплохода в неподвижной воде.

Решение. Пусть x км/ч — скорость теплохода в неподвижной воде.

	Скорость	Время	Расстояние
I (против течения)	$(x - 5)$ км/ч	$\frac{30}{x - 5}$ ч	30 км
II (по течению)	$(x + 5)$ км/ч	$\frac{40}{x + 5}$ ч	40 км

$$\frac{30}{x - 5} + \frac{40}{x + 5} = 5 \quad | : 5$$

$$\frac{6}{x - 5} + \frac{8}{x + 5} = 1^{x^2 - 25} \quad | \cdot (x - 5)(x + 5) \neq 0, x \neq -5, x \neq 5.$$

$$6x + 30 + 8x - 40 = x^2 - 25;$$

$$x^2 - 14x - 15 = 0;$$

$$x_1 = -1, x_2 = 15.$$

О т в е т: 15 км/ч.

2) Одна первая труба заполняет бассейн за 2 ч, а одна вторая труба — за 3 ч.

Найдите, за сколько часов заполняют бассейн обе трубы одновременно.

Решение.

	Производительность	Время	Работа
I (одна первая труба)	$\frac{1}{2}$ б/ч	2 ч	1 б
II (одна вторая труба)	$\frac{1}{3}$ б/ч	3 ч	1 б
I + II (обе трубы)	$\frac{1}{x}$ б/ч	x ч	1 б

$$\frac{1}{2} \sqrt[3]{3x} + \frac{1}{3} \sqrt[2]{2x} = \frac{1}{x} \sqrt[6]{6x}$$

$$3x + 2x = 6; 5x = 6; x = \frac{6}{5}; x = 1,2.$$

О т в е т: 1,2 часа.

Текстовые задачи на среднее значение

1. Средняя скорость.
2. Средняя стоимость.
3. Концентрация раствора.
4. Процентное содержание сплава.
5. Средняя оценка и т. п.

Сходство этих задач состоит в том, что суммируются величины во второй и третьей колонках.

Важно, что значения во второй и третьей колонках не принципиальны для среднего значения первой колонки, их можно заменять на пропорциональные числа.

Примеры

Возьмём задачи с разными условиями, но с одинаковой таблицей, уравнением и ответом.

1. Велосипедист ехал 2 мин со скоростью 0,3 км/мин и 3 мин со скоростью 0,5 км/мин.

Найдите среднюю скорость велосипедиста.

2. Купили 2 шт. товара по цене 0,3 руб. и 3 шт. другого товара по цене 0,5 руб.

Найдите среднюю цену этих товаров.

3*. В одном сосуде — 2 кг раствора кислоты 30 % концентрации, а в другом — 3 кг кислоты 50 % концентрации. Растворы смешали и получили новый раствор.

Найдите его концентрацию.

4*. Имеются два сплава с разным содержанием меди: в первом содержится 2 кг (30 %) сплава, а во втором — 3 кг (50 %) сплава меди. Из этих двух сплавов получили третий сплав.

Найдите процентное содержание меди в третьем сплаве.

5. Ученик получил две оценки по 0,3 балла и 3 оценки по 0,5 баллов.

Найдите среднюю оценку ученика.

---

* Проценты для таблицы переводим в десятичные дроби, а в ответе, наоборот, переводим десятичные дроби в проценты.

Например, 30 % = 0,30 = 0,3, а 0,42 = 42 %.

Решение.

	А	В	С
I	0,3	2	0,6
II	0,5	3	1,5
III_{ср}	x	5	$5x$
	Скорость Цена Концентрация Процентное содержание Оценки	Время Количество Масса раствора Масса сплава Количество оценок	Путь Стоимость Масса вещества Масса вещества Сумма оценок

Составим уравнение: $5x = 1,5 + 0,6$; $5x = 2,1$;

$$x = \frac{2,1}{5} = \frac{4,2}{10} = 0,42.$$

О т в е т: 0,42.

• Если в колонке **В** одинаковые числа, то **III_{ср}** находят как среднее арифметическое **I** и **II**, например, $I = m$, $II = n$, тогда $III_{ср} = \frac{m + n}{2}$.

• Если в колонке **С** одинаковые числа, то **III_{ср}** находят как среднее гармоническое, например, $I = m$, $II = n$, тогда $III_{ср} = \frac{2mn}{m + n}$. Такой результат получают из уравнения $\frac{2}{x} = \frac{1}{m} + \frac{1}{n}$.

4. ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

4.1 Понятие последовательности

4.1.1. Понятие последовательности

Числовая последовательность — зависимость, ставящая в соответствие каждому натуральному числу некоторое действительное число.

Обозначение: $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ и т. д.

Члены последовательности — числа, образующие последовательность.

Формула n -го члена — один из способов задания последовательности.

Рекуррентная формула — формула, с помощью которой любой член последовательности, начиная с некоторого, выражается через предыдущие члены.

Виды последовательностей

↓		↓	
Бесконечная		Конечная	
↓	↓	↓	↓
Содержит бесконечно много членов	<i>Пример</i> 1; 3; 5; 7; 9 и т. д. Нечётные числа	Конечное число членов	<i>Пример</i> последовательность трёхзначных чисел: 100; 101; 102; ...; 998; 999

4.2. Арифметическая и геометрическая прогрессии

4.2.1. Арифметическая прогрессия

Определение	Каждый член, начиная со второго, равен предыдущему, сложенному с одним и тем же числом d (разность прогрессии): $a_{n+1} = a_n + d$ $d = a_{n+1} - a_n = a_n - a_{n-1}$
Формула n -го члена через a_1	$a_n = a_1 + d(n - 1)$
Формула n -го члена через a_m	$a_n = a_m + d(n - m),$ $n > m$
Формула суммы n первых членов (через первый член и n -й)	$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$
Формула суммы n первых членов (через первый член и разность)	$S_n = \frac{2a_1 + d(n - 1)}{2} \cdot n$
Характеристическое свойство	$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$

4.2.2. Геометрическая прогрессия

Определение	Каждый член, начиная со второго, равен предыдущему, умноженному на одно и то же число q (знаменатель прогрессии): $b_{n+1} = b_n \cdot q$ $q = \frac{b_{n+1}}{b_n}$
Формула n-го члена через b_1	$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$
Формула n-го члена через b_m	$b_n = b_m \cdot q^{n-m},$ $n > m$
Формула суммы n первых членов (через первый член и n-й)	$S_n = \frac{b_n q - b_1}{q - 1}$
Формула суммы n первых членов (через первый член и знаменатель)	$S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}$
Характеристическое свойство	$b_n^2 = b_{n-1} \cdot b_{n+1}$
Сумма бесконечной геометрической прогрессии	$S = \frac{b_1}{1 - q}, q < 1$

4.2.3. Сложные проценты

Сложный процент — это процент, начисленный на процент.

Формула сложных процентов:

$$A = A_0(1 + 0,01r)^n$$

где A_0 — начальная сумма, A — конечная сумма, r % — процентная ставка, n — число периодов.

Для удобства вычислений сложных процентов выражение $1 + 0,01r$ часто заменяют на переменную k , т. е. $k = 1 + 0,01r$.

Пример

Известно, что сумма вклада равна 5000 руб.; процентная ставка — 10 %; вклад оформлен на 3 года.

Какая сумма будет на счету в конце срока?

Решение.

Из условия следует, что $A_0 = 5000$, $r = 10\% = 0,1$.

Отсюда, $k = 1,1$; $n = 3$.

$$A = A_0 k^n;$$

$$A = 5000 \cdot 1,1^3 = 5000 \cdot 1,331 = 6655.$$

О т в е т: 6655.

5. ФУНКЦИИ

5.1. Числовые функции

5.1.1. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции

Функция (функциональная зависимость) — зависимость одной переменной (зависимой) от другой (независимой), при которой каждому значению независимой переменной соответствует единственное значение зависимой переменной.	
Аргумент	→ Независимая переменная.
Функция от аргумента	→ Зависимая переменная.
Значения аргумента	→ Значения независимой переменной.
Значения функции	→ Значения зависимой переменной.
Область определения функции	→ Все значения, которые принимает аргумент (независимая переменная).
Область значений функции	→ Все значения, которые принимает функция (зависимая переменная).

Способы задания функции

↓	↓	↓	↓
графиком	формулой	таблицей	описанием

- Если функция задана формулой и не указана её область определения, то считается, что область определения функции состоит из всех значений аргумента, при которых данная формула имеет смысл.

- Если же функция описывает реальный процесс, то её область определения зависит от конкретных условий.

Например, зависимость площади квадрата от длины его стороны, выраженная формулой $S = a^2$, справедлива только для положительных значений длины стороны, хотя сама эта формула верна для любых значений аргумента.

5.1.2. График функции, возрастание и убывание, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства

График функции	→	Множество всех точек координатной плоскости, абсциссы которых равны значениям аргумента, а ординаты — соответствующим значениям функции.
Возрастающая в некотором промежутке функция	→	Функция, у которой большему значению аргумента из этого промежутка соответствует большее значение функции.

Убывающая в некотором промежутке функция	→	Функция, у которой большему значению аргумента из этого промежутка соответствует меньшее значение функции.
Нули функции	→	Значение аргумента, при котором значение функции равно нулю.
Промежутки знакопостоянства функции	→	Такие множества значений аргумента, на которых значения функции только положительны или только отрицательны.

5.1.3. Пример графических зависимостей, отражающих реальные процессы

Графический способ — один из самых удобных и наглядных способов представления и анализа информации.

Пример

На рисунке изображён график зависимости расстояния S (в метрах) между пловцом и точкой старта от времени t (в секундах) движения пловца в 50-метровом бассейне на 200 метровой дистанции.

5.1.4. Линейная функция, её график, геометрический смысл коэффициентов

Линейная функция $y = kx + b$			
Область значения $k \neq 0 \rightarrow y \in (-\infty; +\infty)$; $k = 0 \rightarrow y = b$	График — прямая 	Область определения $x \in (-\infty; +\infty)$	
$k < 0, b < 0$ Убывает $k < 0$	$k < 0, b > 0$ Убывает $k < 0$	$k > 0, b < 0$ Возрастает $k > 0$	$k > 0, b > 0$ Возрастает $k > 0$
Частные случаи линейной функции			
$k = 0$ Постоянная функция $y = b$ 	$k \neq 0, b = 0$ Прямая пропорциональность $y = kx$ 		
↓ График — прямая, симметричная относительно начала координат			

5.1.5. Функция, описывающая обратно пропорциональную зависимость, её график. Гипербола

Функция — обратная пропорциональность $y = \frac{k}{x}, k \neq 0.$		
Область значений $y \neq 0$	График — гипербола. Кривая, ветви которой симметричны относительно начала координат $y(-x) = -y(x)$	Область определения $x \neq 0$
$k < 0$	$k > 0$	

**5.1.6. Квадратичная функция, её график.
Парабола. Координаты вершины параболы,
ось симметрии**

Квадратичная функция $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$			
Область значений $a > 0 \rightarrow$ $\rightarrow [y_B; +\infty);$ $a < 0 \rightarrow$ $\rightarrow (-\infty; y_B]$ y_B — значение функции в вершине параболы	График — парабола — кривая, симметричная относительно вертикальной прямой, проходящей через её вершину. $x_0 = -\frac{b}{2a}$	Область определения $x \in (-\infty; +\infty)$	
$a > 0, c > 0$	$a > 0, c < 0$	$a < 0, c > 0$	$a < 0, c < 0$
ветви параболы направлены вверх	ветви параболы направлены вверх	ветви параболы направлены вниз	ветви параболы направлены вниз

5.1.7. График функции $y = \sqrt{x}$

Функция $y = \sqrt{x}$		
Область значений $y \geq 0$	График — ветвь параболы 	Область определения $x \geq 0$

5.1.8. График функции $y = \sqrt[3]{x}$

Функция $y = \sqrt[3]{x}$		
Область значений $y \in (-\infty; +\infty)$	График 	Область определения $x \in (-\infty; +\infty)$

5.1.9. График $y = |x|$

Функция $y = x $		
Область значений $y \geq 0$		Область определения $x \in (-\infty; +\infty)$

5.1.10. Использование графиков функций для решения уравнений и систем

Чтобы решить графически уравнение вида $f(x) = g(x)$, нужно построить графики функций $y = f(x)$, $y = g(x)$ и найти абсциссы точек пересечения этих графиков.

Алгоритм решения уравнения с помощью графиков

1. Записывают уравнение в удобном для построения графиков виде $f(x) = g(x)$.
2. Строят графики функций $y = f(x)$ и $y = g(x)$ в одной системе координат.
3. Если существуют точки пересечения графиков, то абсциссы этих точек и будут корнями данного уравнения.
4. Если точек пересечения нет, то уравнение не имеет корней.

Пример

Решите графически уравнение $x^3 - 3x + 2 = 0$.

Решение.

Запишем уравнение в виде $x^3 = 3x - 2$ и построим в одной системе координат графики функций $y = x^3$ (кубическую параболу) и $y = 3x - 2$ (прямую). Видно, что абсциссами точек пересечения являются $x_1 = -2$ и $x_2 = 1$.

6. КООРДИНАТЫ НА ПРЯМОЙ И В ПЛОСКОСТИ

6.1. Координатная прямая

6.1.1. Изображение чисел точками координатной прямой

6.1.2. Геометрический смысл модуля

6.1.3. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч

Вид промежутка	Геометрическое изображение	Обозначение	Запись с помощью неравенств
Интервал		$(a; b)$	$a < x < b$
Отрезок		$[a; b]$	$a \leq x \leq b$
Полуинтервал		$(a; b]$	$a < x \leq b$
Полуинтервал		$[a; b)$	$a \leq x < b$
Луч		$[a; +\infty)$	$x \geq a$
Луч		$(-\infty; b]$	$x \leq b$
Открытый луч		$(a; +\infty)$	$x > a$
Открытый луч		$(-\infty; b)$	$x < b$

6.2. Декартовы координаты на плоскости

6.2.1. Декартовы координаты на плоскости; координаты точки

6.2.2. Координаты середины отрезка

6.2.3. Формула расстояния между двумя точками плоскости

$$d = AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

6.2.4. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых

Уравнение прямой в декартовых координатах

$ax + by + c = 0$, где x и y — переменные;
 a , b , c — некоторые числа; a и b одновременно
не равны нулю

Угловой коэффициент
прямой $k = -\frac{a}{b}$.

Уравнение прямой
с угловым коэффициентом $y = kx + m$;
 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$.

Параллельные прямые
имеют одинаковые ко-
эффициенты k или про-
порциональные коэф-
фициенты a и b .

6.2.5. Уравнение окружности

Уравнение окружности $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$	
	$x^2 + y^2 = R^2$ — окружность с центром в начале координат
$O(a; b)$ — центр окружности; $M(x; y)$ — точка на окружности; R — радиус окружности	
	<i>Пример</i> На рисунке представлена окружность с центром $O(2; 3)$ и радиусом $R = 4$.

6.2.6. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем

Уравнение с двумя переменными — уравнение, которое можно привести к виду $f(x; y) = 0$.

Например, $3x - 5y = 16$; $xy = 2$; $x^2 + y^2 = 25$.

График уравнения с двумя переменными — множество всех точек координатной плоскости, абсциссы и ординаты которых являются решениями этого уравнения.

Примеры

$$x + y = 2$$

$$x^2 + y^2 = 4$$

$$xy = 6$$

Система двух уравнений с двумя переменными — система, которую можно записать в виде:

$$\begin{cases} f(x; y) = 0, \\ g(x; y) = 0. \end{cases}$$

Решение системы двух уравнений с двумя переменными — пара значений x_0 и y_0 , подстановка которых соответственно вместо x и y обращает оба уравнения системы в верное равенство.

Алгоритм графического решения систем уравнений

1. Построить графики уравнений в одной системе координат.
2. Найти координаты точек пересечения графиков или убедиться в том, что они не пересекаются.
3. Записать ответ.

7. СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ

Элементы статистики

Среднее арифметическое нескольких чисел — частное от деления суммы этих чисел на число слагаемых.

Например, найдём среднее арифметическое чисел: 21, 46, 50.

$$(21 + 46 + 50) : 3 = 39.$$

Медиана нескольких чисел — число, стоящее посередине данных чисел, выписанных в порядке возрастания.

Если количество чисел чётное, то медианой будет среднее арифметическое двух чисел, стоящих посередине.

Например:

1) Найдём медиану чисел: 5, 3, 2, 5, 4. **Решение**: Запишем эти числа по возрастанию: 2, 3, 4, 5, 5. Медиана равна 4. **Ответ**: 4.

2) Найдём медиану чисел: 3, 4, 4, 5, 5, 5. **Решение**: $(4 + 5) : 2 = 4,5$. **Ответ**: 4,5.

Размах нескольких чисел — разность между наибольшим и наименьшим из этих чисел.

Мода нескольких чисел — число, которое встречается чаще других.

Теория вероятности — математическая наука, изучающая закономерности случайных событий и случайных величин при массовом их появлении.

Опыт (испытание) — действие, которое можно повторять большое число раз в одинаковых условиях и результат которого нельзя предугадать заранее.

Основные формулы комбинаторики

Факториал	$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$
Число перестановок из n элементов	$P_n = A_n^n = n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$
Число перестановок с повторениями из n элементов, из которых k — одинаковые	$\overline{P}_n(k) = \frac{n!}{k!}$
Число перестановок с повторениями из n элементов, из которых $k_1, k_2, \dots, k_m$ — одинаковые	$\overline{P}_n(k_1, k_2, \dots, k_m) = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!}$
Число размещений из n элементов по k элементов	$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \times (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1)$
Число размещений с повторениями из n элементов по k элементов	$\overline{A}_n^k = n^k$
Число сочетаний из n элементов по k элементов	$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot k}$

Число сочетаний с повторениями из n элементов по k элементов	$\overline{C}_n^k = C_{(k+n-1)}^k$
Формула, связывающая размещения, сочетания и перестановки	$A_n^k = C_n^k \cdot P_k$

События

↓	↓	↓
Случайные	Достоверные	Невозможные

↓	↓	↓
Может произойти, а может и не произойти в данном опыте	Обязательно произойдёт в данном опыте	Не может произойти в данном опыте

↓	↓	↓
$0 < P(A) < 1$	$P(A) = 1$	$P(A) = 0$

↓

Относительная частота случайного события в серии испытаний — отношение числа испытаний, в которых наступило это событие, к числу всех испытаний.

Классическая вероятность — вероятность события в испытании с равновероятными исходами, которая равна отношению благоприятного количества исходов для данного события к числу всех равновероятных исходов.

Теорема сложения	
Несовместные события	Совместные события
$P(A + B) = P(A) + P(B)$	$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$
A, B — полная группа $P(A) + P(B) = 1$ $P(A) + P(\bar{A}) = 1$	Вероятность наступления хотя бы одного события $P(A + B) = 1 - P(\bar{A}\bar{B})$

Теорема умножения	
Независимые события	Зависимые события
$P(AB) = P(A)P(B)$	$P(AB) = P(A)P_A(B)$

$P_A(B)$ — условная вероятность, т. е. вероятность события B , вычисленная при условии, что событие A уже произошло.

**Повторные
независимые испытания**

Формула Бернулли

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k},$$

где C_n^k — число сочетаний,
 p — вероятность успеха,
 q — вероятность неудачи,
 n — число независимых испытаний,
 k — количество выпавших событий,
 $q = 1 - p$,
 n, k — достаточно малы.

ГЕОМЕТРИЯ

---

8. ГЕОМЕТРИЯ

8.1. Геометрические фигуры и их свойства.

Измерение геометрических величин

8.1.1. Начальные понятия геометрии

Основные геометрические фигуры на плоскости	
Точка	Прямая

Взаимное расположение точки и прямой
$A \in a$ прямая a проходит через точку A
$A \notin a$ прямая a не проходит через точку A

Аксиомы — исходные положения какой-либо теории, принимаемые в рамках данной теории истинными без доказательства.

Теоремы — положения теории, требующие доказательства.

**Аксиомы
взаимного расположения
точек и прямых**

- Каждой прямой принадлежат по крайней мере две точки.
- Имеются по крайней мере три точки, не лежащие на одной прямой.
- Через любые две точки проходит прямая, и при том только одна.

Луч — одна из двух частей прямой, на которые прямую делят лежащие на ней точки.

На рисунке — луч AB и луч AC ; точка A — начало лучей AB и AC .

Отрезок — часть прямой, лежащая между двумя точками этой прямой. Эти точки называются концами отрезка.

На рисунке — отрезок AB ; точки A и B — концы отрезка AB .

**8.1.2. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы.
Вертикальные и смежные углы.
Биссектриса угла и её свойства**

Угол — геометрическая фигура, которая состоит из точки и двух лучей, исходящих из этой точки.

Лучи называют сторонами угла, а их общее начало — вершиной угла.

Угол обозначают либо через вершину и две точки на сторонах угла, либо только через вершину, либо через лучи. *Например, $\angle B$, $\angle ABC$ или $\angle hn$.*

Развёрнутый угол — угол, стороны которого лежат на одной прямой.

Градус — угол, равный $\frac{1}{180}$ части развёрнутого угла.

Градусная мера угла — положительное число, которое показывает, сколько раз градус и его части укладываются в данном угле.

Развёрнутый угол	равен 180°	
Неразвёрнутый угол	меньше 180°	
Прямой угол	равен 90°	
Острый угол	меньше 90°	
Тупой угол	больше 90° , но меньше 180°	

Биссектриса угла — луч, исходящий из вершины угла и делящий его на две равные части.

Свойства биссектрисы угла

- Любая точка биссектрисы угла равноудалена от его сторон (или продолжения сторон).
- Любая точка биссектрисы угла, за исключением вершины угла, является центром окружности, касающейся сторон (или продолжений сторон) этого угла.
- Биссектриса угла является осью симметрии самого угла, а также угла, образованного продолжением его сторон.

Смежные углы — два угла, у которых одна сторона общая, а две другие являются продолжениями одна другой.

Свойство смежных углов

- Сумма смежных углов равна 180° .
Например, пары смежных углов: $\angle 1 + \angle 3 = \angle 3 + \angle 2 = \angle 2 + \angle 4 = \angle 4 + \angle 1 = 180^\circ$.

Вертикальные углы — два угла, у которых стороны одного являются продолжениями сторон другого.

Свойство вертикальных углов

• Вертикальные углы равны.
Например, пары вертикальных углов: $\angle 1 = \angle 2$,
 $\angle 3 = \angle 4$.

8.1.3. Прямая. Параллельность и перпендикулярность прямых

Параллельные прямые — прямые на плоскости, не имеющие общей точки.

Параллельность прямых обозначают знаком « $\parallel$ ».

Например, $a \parallel b$.

Взаимное расположение двух прямых на плоскости

• Две прямые имеют общую точку (пересекаются).

$$a \cap b = O$$

• Две прямые не имеют общих точек (параллельны).

$$d \parallel c$$

Секущая прямая по отношению к двум другим прямым — прямая, пересекающая их в двух точках. *Например*, прямая k — секущая прямая к прямым a и b .

Свойства параллельных прямых

1. Через точку, не лежащую на данной прямой, проходит только одна прямая, параллельная данной (аксиома параллельных прямых).
2. Все точки одной из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой.
3. Если прямая пересекает одну из двух параллельных прямых, то она пересекает и другую прямую.
4. Если две различные прямые параллельны третьей прямой, то они параллельны.
5. Если две различные прямые перпендикулярны третьей прямой, то они параллельны.
6. Если прямая перпендикулярна одной из двух параллельных прямых, то она перпендикулярна и другой.
7. Отрезки параллельных прямых, заключённых между параллельными прямыми, равны.

При пересечении двух прямых и секущей образуются 8 углов

$a \cap c$

$b \cap c$

Накрест лежащие углы:

$\angle 3$ и $\angle 5$, $\angle 4$ и $\angle 6$.

Односторонние углы:

$\angle 4$ и $\angle 5$, $\angle 3$ и $\angle 6$.

Соответствующие углы:

$\angle 1$ и $\angle 5$, $\angle 4$ и $\angle 8$, $\angle 2$ и $\angle 6$, $\angle 3$ и $\angle 7$.

**Свойства углов,
образованных при пересечении
параллельных прямых секущей**

1. Если две параллельные прямые пересечены третьей прямой, то соответственные углы равны.
2. Если две параллельные прямые пересечены третьей прямой, то накрест лежащие углы равны.
3. Если две параллельные прямые пересечены третьей прямой, то сумма односторонних углов равна 180° .

Признаки параллельности прямых

1. Если при пересечении двух прямых секущей накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны.
2. Если при пересечении двух прямых секущей соответственные углы равны, то прямые параллельны.
3. Если при пересечении двух прямых секущей сумма односторонних углов равна 180° , то прямые параллельны.

Перпендикулярные прямые — две пересекающиеся прямые, которые образуют четыре прямых угла.

Например, прямые a и b — перпендикулярные: $a \perp b$.

8.1.4. Отрезок. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку.

Перпендикуляр и наклонная к прямой

Отрезок — часть прямой между двумя данными точками, включая эти точки, которые называются концами отрезка.

Перпендикуляр из точки A к прямой a — отрезок AH , если прямые AH и a взаимно перпендикулярны, точка A не лежит на прямой a , точка H лежит на прямой a . Точку H называют **основанием перпендикуляра**.

Серединный перпендикуляр к отрезку — прямая, проходящая через середину отрезка и перпендикулярная к нему.

Например,

если $a \perp AD$, $a \cap AD = C$, $AC = CD$, то a — серединный перпендикуляр к отрезку AD .

Свойства серединного перпендикуляра

- Каждая точка, равноудалённая от концов отрезка, лежит на серединном перпендикуляре к нему.
- Серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке.

Наклонная — отрезок, который соединяет точку вне прямой с любой точкой на прямой, кроме основания перпендикуляра.

Свойства наклонных

- Длина наклонной, проведённой из данной точки к прямой, больше длины перпендикуляра, опущенного из той же точки на эту прямую.
- Равные наклонные имеют равные проекции.
- Из двух наклонных, выходящих из одной точки, больше та, у которой проекция больше.

8.1.5. Понятие о геометрическом месте точек

Геометрическое место точек — фигура, которая состоит из всех точек плоскости, обладающих определёнными свойствами.

Свойства геометрического места точек

- Если точка принадлежит фигуре, она обладает этим свойством.
- Каждая точка, обладающая этим свойством, принадлежит фигуре.

Примеры фигур, обладающих геометрическим местом точек

Окружность	→	Геометрическое место точек, равноудалённых от данной точки.
Серединный перпендикуляр к отрезку	→	Геометрическое место точек, равноудалённых от двух данных точек.
Биссектриса угла	→	Геометрическое место точек, равноудалённых от сторон угла.

8.1.6. Преобразования плоскости. Движение. Симметрия

Отображение плоскости на себя — отображение, при котором каждой точке плоскости ставится в соответствие какая-либо точка этой же плоскости, при этом любая точка плоскости ставится в соответствие какой-то точке.

Движение плоскости — отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояния.

Свойства движения

- При движении прямая отображается на прямую;
- при движении луч отображается на луч;
- при движении отрезок отображается на отрезок;
- при движении угол отображается на равный ему угол;
- при движении треугольник отображается на равный ему треугольник.

Движение

Виды движения

• **Поворот**, при котором все точки фигуры поворачиваются на один и тот же угол вокруг одной и той же точки — центра поворота.

• **Центральная симметрия**, при которой каждая точка фигуры переходит в точку, симметричную ей относительно точки — центра симметрии.

• **Осевая симметрия**, при которой каждая точка фигуры переходит в точку, симметричную ей относительно прямой — оси симметрии.

• **Параллельный перенос**, при котором каждая точка M отображается в такую точку M_1 так, что вектор $\overrightarrow{MM_1}$ равен данному вектору $\vec{a}$.

8.2. Треугольник

8.2.1. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника; точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот или их продолжений

Треугольник — геометрическая фигура, которая состоит из 3-х точек, не лежащих на одной прямой, и 3-х отрезков, соединяющих эти точки попарно.

Точки A, B, C — вершины треугольника;
отрезки AB, BC, AC — стороны треугольника;
углы A, B, C — углы треугольника.

Медиана треугольника — отрезок, который соединяет вершину треугольника с серединой противоположной стороны.

Биссектриса треугольника — отрезок биссектрисы угла треугольника, который соединяет вершину треугольника с точкой противоположной стороны.

Высота треугольника — перпендикуляр, проведённый из вершины треугольника к прямой, содержащей противоположную сторону.

Свойства медианы, биссектрисы, высоты

- В любом треугольнике медианы пересекаются в одной точке;
- в любом треугольнике биссектрисы пересекаются в одной точке;
- в любом треугольнике высоты или их продолжения также пересекаются в одной точке.

Средняя линия треугольника — отрезок, который соединяет середины двух сторон треугольника.

Свойство средней линии треугольника

- Средняя линия треугольника параллельна одной из его сторон и равна половине этой стороны.

8.2.2. Равнобедренный и равносторонний треугольники. Свойства и признаки равнобедренного треугольника

Равнобедренный треугольник — треугольник, у которого две стороны равны.

Равные стороны — **боковые стороны**, третья сторона — **основание** треугольника.

Свойства равнобедренного треугольника

1. В равнобедренном треугольнике углы при основании равны.	
2. В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведённая к основанию, является медианой и высотой.	
3. В равнобедренном треугольнике высота, проведённая к основанию, является медианой и биссектрисой.	
4. В равнобедренном треугольнике медиана, проведённая к основанию, является высотой и биссектрисой.	
5. В равнобедренном треугольнике медианы (а также высоты или биссектрисы), проведённые к боковым сторонам, равны.	

Признак равнобедренного треугольника

Если два угла треугольника равны, то треугольник равнобедренный.

Равносторонний треугольник — треугольник, у которого все стороны равны.

Свойства равностороннего треугольника

1. У равностороннего треугольника все углы равны по 60° .
2. В равностороннем треугольнике любая биссектриса является одновременно медианой и высотой.
3. В равностороннем треугольнике все медианы (а также высоты или биссектрисы) равны между собой.
4. Точка пересечения медиан (высот, биссектрис) равностороннего треугольника является центром вписанной и описанной окружностей.
5. Все равносторонние треугольники подобны между собой.

8.2.3. Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора

Прямоугольный треугольник — треугольник, у которого один из углов прямой, два других — острые.

Равнобедренный прямоугольный треугольник — треугольник, у которого два острых угла равны по 45° .

Катеты — две стороны прямоугольного треугольника, лежащие на сторонах прямого угла.

Гипотенуза — сторона прямоугольного треугольника, лежащая напротив прямого угла.

AC и BC — катеты, AB — гипотенуза

Теорема Пифагора

В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Например, если a и b — катеты, c — гипотенуза, то $a^2 + b^2 = c^2$.

Теорема, обратная теореме Пифагора: если квадрат одной стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон, то этот треугольник является прямоугольным.

Если к прямой из одной точки проведены перпендикуляр и наклонные, то любая наклонная больше перпендикуляра, равные наклонные имеют равные проекции, а из двух наклонных больше та, у которой проекция больше.

Проекция наклонной — отрезок прямой, соединяющий основание перпендикуляра и основание наклонной.

AK — наклонная,
 AH — перпендикуляр,
 HK — проекция

Пифагоровы треугольники — прямоугольные треугольники, длины сторон которых выражаются целыми числами.

Некоторые пифагоровы «тройки»: 3, 4, 5; 5, 12, 13; 7, 24, 25; 8, 15, 17; 9, 40, 41.

Египетский треугольник — прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4, 5.

8.2.4. Признаки равенства треугольников

Признаки равенства треугольников	
1. Если две стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники равны.	
2. Если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.	
3. Если три стороны одного треугольника соответственно равны трём сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.	

8.2.5. Неравенство треугольника

Неравенство треугольника

Любая сторона треугольника меньше суммы двух других сторон и больше разности двух других сторон.

$$AB < AC + BC$$

$$BC < AB + AC$$

$$AC < AB + BC$$

$$BC > AC - AB$$

$$AC > BC - AB$$

$$AB > AC - BC$$

8.2.6. Сумма углов треугольника.

Внешние углы треугольника

Сумма углов треугольника равна 180° .

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$

Внешний угол треугольника — угол, смежный с каким-нибудь углом этого треугольника.

Свойство внешнего угла треугольника

Внешний угол треугольника равен сумме двух углов треугольника, не смежных с ним.

$$\angle 3 = \angle 1 + \angle 2$$

8.2.7. Теорема Фалеса

Теорема Фалеса

Если на одной из двух прямых отложить последовательно несколько равных отрезков и через их концы провести параллельные прямые, пересекающие вторую прямую, то они отсекут на второй прямой равные между собой отрезки.

8.2.8. Подобие треугольников, коэффициент подобия.

Признаки подобия треугольников

Подобные фигуры — фигуры F_1 и F_2 , если каждой точке фигуры F_1 соответствует точка фигуры F_2 таким образом, что расстояния между двумя точками фигуры F_1 и соответствующими точками фигуры F_2 отличаются в одно и то же число раз, если делить большее на меньшее.

$$OC_1 = 2OC, OB_1 = 2OB, OA_1 = 2OA, \\ \Delta A_1B_1C_1 \text{ и } \Delta ABC \text{ — подобны.}$$

Свойства подобных фигур

- Отношения любых длин соответствующих отрезков прямых и отрезков кривых в подобных фигурах сохраняются.
- Соответствующие углы в подобных фигурах равны.
- Отношение любых соответствующих длин отрезков прямых и отрезков кривых одной фигуры к другой — постоянное число k , коэффициент подобия.
- Отношение соответствующих площадей в подобных фигурах равно квадрату коэффициента подобия.
- Отношение соответствующих объёмов в подобных фигурах равно кубу коэффициента подобия.

Все правильные n -угольники подобны.

Например, подобны все квадраты, все равносторонние треугольники. Также подобны все окружности, все сферы, все кубы.

Подобные треугольники — треугольники, у которых соответствующие углы равны, а стороны одного треугольника пропорциональны сходственным сторонам другого треугольника.

Например,

$\triangle ABC$ и $\triangle A_1B_1C_1$ подобны.

$\angle A = \angle A_1$; $\angle B = \angle B_1$; $\angle C = \angle C_1$;

$$\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{AC}{A_1C_1}.$$

Признаки подобия треугольников

- по двум пропорциональным сторонам и углу между ними.

$$\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1}; \angle B = \angle B_1$$

- по двум углам.

$$\angle A = \angle A_1; \angle B = \angle B_1$$

- по трём пропорциональным сторонам.

$$\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{AC}{A_1C_1}$$

8.2.9. Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°

	$\triangle ABC$; a и b — катеты; c — гипотенуза. • $\sin A = \frac{a}{c} = \cos B$ • $\cos A = \frac{b}{c} = \sin B$ • $\operatorname{tg} A = \frac{a}{b} = \operatorname{ctg} B$ • $\operatorname{ctg} A = \frac{b}{a} = \operatorname{tg} B$

Синус, косинус, тангенс и котангенс углов 30° , 45° , 60° в прямоугольном треугольнике

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{1}}{2} = \cos 60^\circ$$

$$\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos 45^\circ$$

$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos 30^\circ$$

$$\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} = \operatorname{ctg} 60^\circ$$

$$\operatorname{tg} 45^\circ = 1 = \operatorname{ctg} 45^\circ$$

$$\operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3} = \operatorname{ctg} 30^\circ$$

Полукружность $R = 1$.

$$\cos \angle MOA = x; \quad \sin \angle MOA = y; \quad \operatorname{tg} \angle MOA = \frac{y}{x}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\sin (90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$$

$$\cos (90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\sin (180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos (180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

8.2.10. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Теорема косинусов и теорема синусов

Решение прямоугольных треугольников — это задача нахождения неизвестных сторон и углов по двум известным элементам, среди которых должна быть одна сторона.

1. Даны катеты a и b . Найти: c , $\angle A$, $\angle B$.

$$c^2 = a^2 + b^2, \operatorname{tg} A = \frac{a}{b}, \angle B = 90^\circ - \angle A.$$

2. Даны катет a и гипотенуза c . Найти: b , $\angle A$, $\angle B$.

$$b^2 = c^2 - a^2, \sin A = \frac{a}{c}, \angle B = 90^\circ - \angle A.$$

3. Даны катет a и острый угол $\angle B$. Найти: b , c , $\angle A$. $\angle A = 90^\circ - \angle B$, $c = \frac{a}{\cos A}$, $b = a \operatorname{tg} B$.

4. Даны гипотенуза c и острый угол $\angle A$. Найти: a , b , $\angle B$. $\angle B = 90^\circ - \angle A$, $a = c \sin A$, $b = c \cos B$.

Основное тригонометрическое тождество

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Теорема синусов

Стороны треугольника пропорциональны синусам противолежащих углов.

Например,

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где a , b и c — длины сторон треугольника;
 $\angle A$, $\angle B$ и $\angle C$ — величины соответствующих углов
треугольника;
 R — радиус описанной окружности.

Теорема косинусов

Квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла между ними.

- $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$
- $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$
- $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$

8.3. Многоугольники

8.3.1. Параллелограмм, его свойства и признаки

Параллелограмм — четырёхугольник, у которого противоположные стороны параллельны (т. е. лежат на параллельных прямых).

Например, $ABCD$ — параллелограмм, так как $AB \parallel CD$, $BC \parallel AD$.

Свойства параллелограмма

• В параллелограмме противоположные стороны равны, и противоположные углы равны.

• Диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам.

• Сумма двух углов параллелограмма, прилежащих к одной его стороне, равна 180° .

• Сумма квадратов диагоналей параллелограмма равна удвоенной сумме квадратов его сторон:

$$d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2).$$

• Биссектриса угла параллелограмма отсекает от него равнобедренный треугольник.	
• Биссектрисы углов параллелограмма, прилежающих к одной его стороне, взаимно перпендикулярны.	

Признаки параллелограмма

• Если две стороны четырёхугольника равны и параллельны, то этот четырёхугольник — параллелограмм. $AB \parallel CD$	
• Если противоположные стороны четырёхугольника попарно равны, то этот четырёхугольник — параллелограмм.	
• Если в четырёхугольнике диагонали пересекаются и в точке пересечения делятся пополам, то этот четырёхугольник — параллелограмм.	
• Если в четырёхугольнике противоположные углы равны, то этот четырёхугольник — параллелограмм.	

8.3.2. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки

Прямоугольник — параллелограмм, у которого все углы прямые.

Например, $ABCD$ — прямоугольник, $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$.

Свойства прямоугольника

- Диагонали прямоугольника равны.
- Перпендикуляры, проходящие через середины сторон прямоугольника, являются его осями симметрии.

Признаки прямоугольника

- Если диагонали в параллелограмме равны, то этот параллелограмм — прямоугольник.
- Если в параллелограмме один угол прямой, то это — прямоугольник.

Квадрат — прямоугольник, у которого все стороны равны.

Например, $ABCD$ — квадрат, $AB = BC = CD = AD$, $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$.

Свойства квадрата

- Все углы квадрата прямые.
- Диагонали квадрата равны.
- Диагонали квадрата взаимно перпендикулярны.
- Диагонали квадрата точкой пересечения делятся пополам.
- Диагонали квадрата делят углы квадрата пополам.
- Квадрат имеет четыре оси симметрии: две диагонали и два перпендикуляра к его сторонам, проходящих через их середины.

Признаки квадрата

- Если в параллелограмме диагонали взаимно перпендикулярны и равны, то этот параллелограмм — квадрат.
- Если стороны четырёхугольника равны и диагонали также равны, то этот четырёхугольник — квадрат.

Ромб — параллелограмм, у которого все стороны равны.

Например, $ABCD$ — ромб, $AB = BC = CD = AD$.

Свойства ромба

- Диагонали ромба взаимно перпендикулярны.
- Диагонали ромба являются биссектрисами углов ромба.
- Прямые, на которых лежат диагонали ромба, являются его осями симметрии.

Признаки ромба

- Если в параллелограмме диагонали взаимно перпендикулярны, то это — ромб.
- Если диагональ параллелограмма лежит на биссектрисе его угла, то это — ромб.
- Если стороны четырёхугольника равны, то это — ромб.

8.3.3. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция

Трапеция — четырёхугольник, две стороны которого параллельны, а две другие не параллельны.

Например, $ABCD$ — трапеция, $BC \parallel AD$, $AB \nparallel CD$.

Основания трапеции — её параллельные стороны ($BC \parallel AD$).

Боковые стороны трапеции — её непараллельные стороны ($AB \nparallel CD$).

Средняя линия трапеции — отрезок, соединяющий середины её боковых сторон.

Свойства трапеции

- Средняя линия трапеции параллельна основаниям и равна их полусумме.
- Сумма квадратов диагоналей трапеции равна сумме квадратов боковых сторон и удвоенного произведения её оснований.
- Середины оснований, точка пересечения диагоналей и точка пересечения продолжений боковых сторон трапеции лежат на одной прямой.
- Отрезок, соединяющий середины диагоналей трапеции, параллелен её основаниям и равен их полуразности.

Равнобедренная трапеция — трапеция, боковые стороны которой равны.

Свойства равнобедренной трапеции

- В равнобедренной трапеции углы при основании равны.
- В равнобедренной трапеции диагонали равны.
- В равнобедренной трапеции высота, опущенная из вершины на большее основание, делит его на два отрезка, один из которых равен полусумме оснований, другой — полуразности оснований.
- В равнобедренной трапеции прямая, проходящая через середины оснований, перпендикулярна основаниям и является осью симметрии трапеции.

8.3.4. Сумма углов выпуклого многоугольника

Выпуклый многоугольник — многоугольник, который лежит по одну сторону от каждой прямой, проходящей через две его соседние вершины.

Выпуклый
многоугольник

Невыпуклый
многоугольник

Сумма углов выпуклого n -угольника равна:
 $(n - 2) \cdot 180^\circ$.

Задача

Сколько сторон имеет выпуклый n -угольник, каждый угол которого равен 120° ?

Р е ш е н и е. Выпуклый n -угольник имеет n углов и n сторон. Сумма углов n -угольника равна $(n - 2) \cdot 180^\circ$, или $n \cdot 120^\circ$ по условию. Следовательно, $120n = 180n - 360$; $60n = 360$; $n = 6$.

О т в е т: 6 сторон.

8.3.5. Правильные многоугольники

Правильный многоугольник — выпуклый многоугольник, у которого равны все стороны и равны все углы.

Радиусы вписанной и описанной окружностей правильных n -угольников (r — радиус вписанной окружности, R — радиус описанной окружности, a — сторона, S — площадь)

	r	R	S
Треугольник равносторонний	$\frac{a}{2\sqrt{3}}$	$\frac{a}{\sqrt{3}}$	$\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$
Квадрат	$\frac{a}{2}$	$\frac{a}{\sqrt{2}}$	a^2
Правильный шестиугольник	$\frac{a\sqrt{3}}{2}$	a	$\frac{a^2 3\sqrt{3}}{2}$
n -угольник	$\frac{a}{2\operatorname{tg} \frac{180^\circ}{n}}$	$\frac{a}{2\sin \frac{180^\circ}{n}}$	$\frac{a^2 n}{4\operatorname{tg} \frac{180^\circ}{n}}$

8.4. Окружность и круг

Окружность — геометрическая фигура, которая состоит из всех точек, расположенных на заданном расстоянии от данной точки, центра окружности.

Круг — часть плоскости, ограниченная окружностью.

Например, на рисунке представлена окружность с центром в точке O , радиусом $R = OB$, диаметром $D = MC$, хордой KT . $D = 2R$.

8.4.1. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла

Дуга окружности — каждая из двух частей окружности, на которые окружность делится двумя точками.

Центральный угол — угол, вершина которого совпадает с центром окружности.

Полуокружность — дуга, концы которой являются концами диаметра окружности.

Вписанный угол — угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают окружность.

Теорема о вписанном угле

Угол, вписанный в окружность, равен половине дуги, на которую он опирается или половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу.

Следствие к теореме о вписанном угле

- Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны;
- вписанный угол, опирающийся на полуокружность, — прямой.

$\angle AOC$ — центральный угол; $\angle ABC$ — вписанный угол; $\cup AC$ — дуга; $\angle ABC = \frac{1}{2} \angle AOC = \frac{1}{2} \cup AC$

Теорема о произведении отрезков пересекающихся хорд

Если две хорды окружности пересекаются, то произведение отрезков одной хорды равно произведению отрезков другой хорды.

Например, если AB и CD — хорды окружности, пересекающиеся в точке K , то $AK \cdot BK = CK \cdot DK$.

8.4.2. Взаимное расположение прямой и окружности

• Прямая имеет две общие точки с окружностью, если расстояние от центра окружности до прямой меньше радиуса окружности ($d < r$).	
• Прямая имеет только одну общую точку с окружностью, если расстояние от центра окружности до прямой равно радиусу окружности ($d = r$).	
• Прямая не имеет общих точек с окружностью, если расстояние от центра окружности до прямой больше радиуса окружности ($d > r$).	

8.4.3. Касательная и секущая к окружности; равенство отрезков касательных, проведённых из одной точки

Касательная — прямая, имеющая с окружностью только одну общую точку.

Секущая прямая — прямая, которая имеет две общие точки с окружностью.

Точка касания — общая точка касательной и окружности.

Отрезки касательных — расстояния от точки, из которой проведены две касательные к окружности, до точек касания.

Например, AB и AC — касательные к окружности, тогда отрезки AB и AC — отрезки касательных.

- Отрезки касательных, проведённых из одной точки, равны:

$$AB = AC.$$

- Квадрат отрезка касательной равен произведению отрезков секущей, проведённой из той же точки:

$$AB^2 = AC \cdot AD.$$

• Произведения отрезков секущих, проведённых из одной точки, равны:

$$AB \cdot AC = AD \cdot AE.$$

8.4.4. Окружность, вписанная в треугольник

Окружность, вписанная в треугольник, касается всех сторон треугольника.

Центр окружности, вписанной в треугольник, — точка пересечения биссектрис углов треугольника. В любой треугольник можно вписать окружность, и только одну.

8.4.5. Окружность, описанная около треугольника

Окружность, описанная около треугольника, проходит через все его вершины.

Центр окружности, описанной около треугольника, — точка пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника. Около любого треугольника можно описать окружность, и только одну.

Центр описанной окружности

Остроугольный треугольник	Внутри треугольника	
Прямоугольный треугольник	На середине гипотенузы	
Тупоугольный треугольник	Вне треугольника	

8.4.6. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника

Около правильного многоугольника можно описать окружность. В правильный многоугольник можно вписать окружность. Описанная и вписанная окружности имеют один и тот же центр — центр правильного многоугольника.

Окружность, вписанная в правильный многоугольник, касается сторон многоугольника в их серединах.

Окружность, описанная вокруг правильного многоугольника, проходит через вершины правильного многоугольника.

Примеры

$$\frac{r_n}{R_n} = \cos \frac{180^\circ}{n};$$

$$\frac{a_n}{2r_n} = \operatorname{tg} \frac{180^\circ}{n}$$

$$\frac{a_n}{2R_n} = \sin \frac{180^\circ}{n}$$

	$\frac{180^\circ}{n}$	$r_n = R_n \cos \frac{180^\circ}{n}$	$a_n = 2R_n \sin \frac{180^\circ}{n}$	$a_n = 2r_n \operatorname{tg} \frac{180^\circ}{n}$
$n = 3$	60°	$r_3 = \frac{R_3}{2}$	$a_3 = R_3 \sqrt{3}$	$a_3 = 2r_3 \sqrt{3}$
$n = 4$	45°	$r_4 = \frac{R_4}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}R_4}{2}$	$a_4 = R_4 \sqrt{2}$	$a_4 = 2r_4$
$n = 6$	30°	$r_6 = \frac{\sqrt{3}R_6}{2}$	$a_6 = R_6$	$a_6 = \frac{2r_6}{\sqrt{3}}$

8.4.7. Вписанные и описанные четырёхугольники

Свойство вписанного четырёхугольника
В любом вписанном четырёхугольнике сумма противоположных углов равна 180° .
Признак вписанного четырёхугольника
Если сумма противоположных углов четырёхугольника равна 180° , то около него можно описать окружность. <i>Примеры</i> вписанного четырёхугольника — прямоугольник, равнобедренная трапеция.
Свойство описанного четырёхугольника
В любом описанном четырёхугольнике суммы противоположных сторон равны.
Признак описанного четырёхугольника
Если суммы противоположных сторон выпуклого четырёхугольника равны, то в него можно вписать окружность. <i>Пример</i> описанного четырёхугольника — ромб.

8.5. Измерение геометрических величин

8.5.1. Длина отрезка, длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой

Отрезок — часть прямой, состоящая из двух точек, принадлежащих этой прямой, и всех точек прямой, лежащих между двумя данными точками, которые называются концами отрезка.

Длина отрезка — число, которое показывает, сколько раз единица измерения и её части укладываются в измеряемый отрезок.

Измерение длины отрезка — сравнение отрезка с некоторым отрезком, принятым за единицу измерения.

Ломаная линия — геометрическая фигура, состоящая из отрезков, последовательно соединённых своими концами так, что соседние (имеющие общую точку) отрезки не лежат на одной прямой.

Длина ломаной — сумма длин её частей.

Периметр многоугольника — сумма длин всех сторон многоугольника.

Расстояние от точки до прямой — длина перпендикуляра, проведённого из этой точки до данной прямой.

8.5.2. Длина окружности

Все окружности подобны друг другу, поэтому отношение длины окружности к её диаметру равно постоянному числу π .

$$\pi \approx 3,14, \text{ где } \pi = \frac{C}{D}$$

(C — длина окружности, D — диаметр окружности).

$$C = \pi D$$

$$C = 2\pi R$$

8.5.3. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности

Градусная мера угла — положительное число, которое показывает, сколько раз градус и его части укладываются в данном угле.

- Дуги окружности тоже измеряются в градусах.
- Стороны центрального угла пересекают окружность в двух точках и делят её на две дуги.
- Полуокружность равна развёрнутому углу, т. е. она равна 180° .
- Если дуга окружности меньше или равна полуокружности, то её градусная мера равна градусной мере соответствующего ей центрального угла.
- Если дуга окружности больше полуокружности, то её градусная мера равна 360° минус центральный угол.

8.5.4. Площадь и её свойства. Площадь прямоугольника

Площадь многоугольника — величина той части плоскости, которую занимает многоугольник.

Измерение площадей проводится с помощью выбранной единицы измерения.

За единицу измерения площади принимается квадрат, сторона которого равна единице измерения отрезков.

Если за единицу измерения отрезков принят сантиметр, то за единицу измерения площадей принимается квадрат со стороной 1 см.

Свойства площадей

- Равные многоугольники имеют равные площади.
- Если многоугольник разделить на несколько многоугольников, то площадь равна сумме площадей этих многоугольников.
- Площадь квадрата равна квадрату его стороны, т. е. $S = a^2$.

Площадь прямоугольника равна произведению его смежных сторон, т. е.

$$S = ab,$$

где a и b — смежные стороны прямоугольника.

Например, $ABCD$ — прямоугольник, $AB = 3$ см, $BC = 5$ см, $S = AB \cdot BC = 3 \cdot 5 = 15$ (см²).

8.5.5. Площадь параллелограмма

Площадь параллелограмма	
• Произведение основания на высоту	$S = a \cdot h_a$
• Произведение его смежных сторон на синус угла между ними	$S = a \cdot b \cdot \sin \alpha$
• Половина произведения его диагоналей на синус угла между ними	$S = \frac{1}{2} d_1 \cdot d_2 \cdot \sin \alpha$
Площадь ромба	
• Произведение основания на высоту	$S = a \cdot h_a$
• Произведение квадрата его стороны на синус угла между сторонами	$S = a^2 \cdot \sin \alpha$
• Половина произведения его диагоналей	$S = \frac{1}{2} d_1 \cdot d_2$

8.5.6. Площадь трапеции

Площадь трапеции	
• Произведение полсуммы её оснований на высоту	$S = \frac{a + b}{2} \cdot h$
• Произведение средней линии на её высоту	$S = m \cdot h$
• Половина произведения диагоналей на синус угла между ними	$S = \frac{1}{2} d_1 \cdot d_2 \cdot \sin \alpha$

8.5.7. Площадь треугольника

$S_{\Delta} = \frac{abc}{4R}$	$S_{\Delta} = \frac{1}{2}ab \sin \alpha$	$S_{\Delta} = \frac{1}{2}Pr$ $P = a + b + c$
Площадь треугольника		
$S_{\Delta} = \frac{1}{2}ah$	Формула Герона $S_{\Delta} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ $p = \frac{a+b+c}{2}$	$S_{\Delta} = \frac{1}{2}ab$ В прямоугольном треугольнике a и b — катеты.

8.5.8. Площадь круга, площадь сектора

Круг — часть плоскости, ограниченная окружностью.

Площадь круга равна произведению числа π на квадрат радиуса круга:

$$S = \pi R^2.$$

Например,

$$R = 3, \pi \approx 3,14.$$

$$S = \pi R^2 = \pi \cdot 3^2 = 9\pi = 9 \cdot 3,14 \approx 28,26.$$

Круговой сектор — часть круга, ограниченная дугой и двумя радиусами, соединяющими концы дуги с центром круга.

Площадь кругового сектора:

$$S = \frac{\pi R^2}{360^\circ} \cdot \alpha,$$

где α — градусная мера дуги; R — радиус окружности.

Например, при $\alpha = 60^\circ$, $R = 5$

$$S = \frac{\pi \cdot 5^2}{360^\circ} \cdot 60^\circ = \frac{25\pi}{6}.$$

8.5.9. Формулы объёма прямоугольного параллелепипеда, куба, шара

Объём тела — число, указывающее, во сколько раз данное тело больше другого тела, принятого за единицу измерения, или какую часть составляет данное тело от единичного.

Прямоугольный параллелепипед — геометрическая фигура, у которой все грани — прямоугольники.

Грань прямоугольного параллелепипеда — каждый из шести прямоугольников, из которых состоит поверхность параллелепипеда.

Измерения прямоугольного параллелепипеда

↓	↓	↓
Длина (a)	Ширина (b)	Высота (h)

Объём прямоугольного параллелепипеда — число, равное произведению длины, ширины и высоты прямоугольного параллелепипеда:

$$V = abh$$

Куб — прямоугольный параллелепипед, у которого все рёбра равны, соответственно равны и все измерения.

Объём куба равен кубу длины его ребра:

$$V = a^3$$

Например, если длина ребра куба — 3 см, то объём равен $3^3 = 27 \text{ см}^3$.

Сфера — поверхность, которая состоит из всех точек пространства, расположенных на одинаковом расстоянии от данной точки.	
Шар — тело, ограниченное сферой. Объём шара радиусом R — число, которое выражается формулой: $V = \frac{4}{3}\pi R^3.$	

8.6. Векторы на плоскости

8.6.1. Вектор, длина (модуль) вектора

Вектор — направленный отрезок, т. е. отрезок, у которого одна из крайних точек называется началом, а другая — концом.

Обозначение вектора — две заглавные латинские буквы или одна строчная латинская буква со стрелкой над ними.

Например, $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{MN}$, $\vec{a}$.

Нулевой вектор — вектор, у которого начало совпадает с концом.

На чертеже нулевой вектор изображается точкой.

Нулевой вектор обозначается символом $\vec{0}$ или повторением этой точки дважды $\overline{MM}$.

Длина ненулевого вектора (абсолютная величина или модуль вектора) — длина отрезка, которым изображается данный вектор.

Например, длина вектора $\overrightarrow{AB}$ обозначается $|\overrightarrow{AB}|$.

Длину нулевого вектора считают равной нулю:

$$|\vec{0}| = 0.$$

8.6.2. Равенство векторов

Равные векторы — сонаправленные векторы, одинаковой длины.	
Вектор, отложенный от точки, — вектор началом которого является данная точка.	
• От любой точки можно отложить вектор, равный данному, и только один. • Равные векторы можно откладывать от разных точек, считать их одним и тем же вектором и обозначать одной буквой.	

8.6.3. Операции над векторами (сумма векторов, умножение вектора на число)

Правила сложения векторов	
• Правило треугольника для сложения двух векторов состоит в том, что второй вектор откладывают от конца первого и считают суммой вектор, начало которого совпадает с началом первого вектора, а конец — с концом второго вектора.	<i>Например,</i> $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$
• Правило многоугольника для сложения нескольких векторов состоит в том, что складываемые векторы откладывают таким образом, чтобы каждый следующий вектор начинался от конца предыдущего. Тогда суммой всех данных векторов будет вектор, который начинается от начала первого вектора и соединяет его с концом последнего.	<i>Например,</i> $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{e}$
• Правило параллелограмма для сложения двух неколлинеарных векторов состоит в том, что оба вектора откладывают от одной точки, полученную фигуру достраивают до параллелограмма, используя данные векторы как стороны параллелограмма. Искомой суммой будет вектор, совпадающий с диагональю параллелограмма и имеющий началом ту же точку, что и слагаемые.	<i>Например,</i> $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$

Законы сложения векторов

Переместительный закон	$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
Сочетательный закон	$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$
	$\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$

Противоположные векторы — векторы, имеющие одинаковые длины и противоположно направленные.

Записывают так:

$\vec{a}$ и $-\vec{a}$, причём $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$.

Разность двух векторов — вектор, который в сумме с вычитаемым вектором даёт уменьшаемый вектор.

Например, $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$.

Теорема о разности векторов

Равенство $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$ справедливо для любых векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

Правила вычитания векторов

- Для того чтобы вычесть из одного вектора другой, надо к первому вектору прибавить вектор, противоположный второму.
- Для того чтобы вычесть из одного вектора другой, надо из произвольной точки плоскости отложить оба вектора, затем построить вектор, который начинается на конце второго вектора (вычитаемого), а заканчивается на конце первого вектора (уменьшаемого).

Произведение ненулевого вектора на число — вектор, который сонаправлен с данным, если число положительное, и противоположно направлен к данному вектору, если число отрицательное. Длина искомого вектора равна произведению модуля числа на длину данного вектора.

Произведение нулевого вектора на любое число — нулевой вектор.

Произведение числа нуль на любой вектор — нулевой вектор.

Законы умножения вектора на число

Сочетательный закон	$(kl)\vec{a} = k(l\vec{a})$
Распределительный закон	$(k+l)\vec{a} = k\vec{a} + l\vec{a}$ $k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$

8.6.4. Угол между векторами

Угол между векторами — угол, который образуется, если отложить оба вектора от одной точки. Сторонами искомого угла будут лучи, содержащие данные векторы.

Угол между векторами обозначают:

$$\overset{\wedge}{\vec{a} \vec{b}} \text{ или } \angle(\vec{a} \vec{b}).$$

Перпендикулярные векторы — векторы, угол между которыми равен 90° .

Обозначают как: $\vec{a} \perp \vec{b}$.

- Если векторы сонаправлены, в том числе оба или только один из них нулевой, то угол между этими векторами считается равным 0° .
- Если векторы противоположно направлены, то угол между ними — 180° .

8.6.5. Коллинеарные векторы, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам

Коллинеарные векторы — ненулевые векторы, которые расположены или на одной прямой, или на параллельных прямых.

Нулевой вектор коллинеарен любому вектору.

Сонаправленные векторы — коллинеарные векторы одинакового направления, обозначаемые знаком $\uparrow\uparrow$.

Нулевой вектор сонаправлен с любым вектором.

Противоположно направленные векторы — коллинеарные векторы, имеющие противоположные направления. Обозначаются знаком $\uparrow\downarrow$.

Свойства коллинеарных ненулевых векторов

- Если $\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{c}, \vec{b} \uparrow\uparrow \vec{c}$, то $\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{b}$;
- Если $\vec{a} \uparrow\downarrow \vec{c}, \vec{b} \uparrow\downarrow \vec{c}$, то $\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{b}$;
- Если $\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{c}, \vec{b} \uparrow\downarrow \vec{c}$, то $\vec{a} \uparrow\downarrow \vec{b}$.

Лемма о коллинеарных векторах

- Если $\vec{m}$ и $\vec{n}$ — два коллинеарных вектора и $\vec{n} \neq \vec{0}$, то существует такое число k , что $\vec{m} = k\vec{n}$.
- Вектор считается разложенным по векторам $\vec{m}$ и $\vec{n}$, если его можно представить в виде $\vec{c} = x\vec{m} + y\vec{n}$, где x и y — коэффициенты разложения.

Теорема о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам

По двум неколлинеарным векторам можно разложить любой вектор, при этом коэффициенты разложения определяются единственным образом.

8.6.6. Координаты вектора

Координатный вектор — вектор, длина которого равна единичному отрезку данной координатной прямой, а его направление совпадает с направлением этой прямой.

Обозначение координат вектора: $\vec{a} \{x; y\}$.

Правила действий с векторами по их координатам

• **Сложение векторов по координатам.** Если сложить несколько векторов, то каждая координата суммы будет равна сумме соответствующих координат этих векторов.

$$\vec{a}\{x_1; y_1\}, \vec{b}\{x_2; y_2\} \rightarrow (\vec{a} + \vec{b})\{x_1 + x_2; y_1 + y_2\}$$

Например, $\vec{a}\{5; -6\}, \vec{b}\{3; -4\}, \vec{c} = \vec{a} + \vec{b},$
 $\vec{c}\{5 + 3; -6 - 4\}, \vec{c}\{8; -10\}.$

• **Вычитание векторов по координатам.** Если вычесть из одного вектора другой, то каждая координата разности будет равна разности соответствующих координат этих векторов.

$$\vec{a}\{x_1; y_1\}, \vec{b}\{x_2; y_2\} \rightarrow (\vec{a} - \vec{b})\{x_1 - x_2; y_1 - y_2\}$$

Например, $\vec{a}\{5; -6\}, \vec{b}\{3; -4\}, \vec{c} = \vec{a} - \vec{b},$
 $\vec{c}\{5 - 3; -6 + 4\}, \vec{c}\{2; -2\}.$

• **Умножение векторов на число по координатам.** Если умножить число на вектор, то каждая координата произведения будет равна произведению этого числа на соответствующую координату.

$$k, \vec{a}\{x_1; y_1\} \rightarrow k\vec{a}\{kx_1; ky_1\}$$

Например, $k = 2, \vec{a}\{5; 6\}, k\vec{a}\{2 \cdot 5; 2 \cdot 6\}, k\vec{a}\{10; 12\}.$

• **Координаты вектора через координаты его начала и конца.** Каждая координата вектора может быть получена при вычитании из соответствующей координаты его конца координаты начала вектора.

$$M(x_1; y_1), N(x_2; y_2) \rightarrow \overrightarrow{MN}\{x_2 - x_1; y_2 - y_1\}$$

Например, $A(2; 3), B(-7; 5) \rightarrow \overrightarrow{AB}\{-7 - 2; 5 - 3\},$
 $\overrightarrow{AB}\{-9; 2\}.$

8.6.7. Скалярное произведение векторов

Скалярное произведение двух векторов — произведение длин этих векторов на косинус угла между ними:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \angle(\vec{a}, \vec{b}).$$

Свойства скалярного произведения двух векторов

- Если $\vec{a} \perp \vec{b}$, то $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, так как $\cos 90^\circ = 0$;
- если $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, то $\vec{a} \perp \vec{b}$;
- если $\angle(\vec{a}, \vec{b}) > 90^\circ$, то $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$;
- если $\angle(\vec{a}, \vec{b}) < 90^\circ$, то $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$;
- если $\angle(\vec{a}, \vec{b}) = 0$, то $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$.

Скалярное произведение в координатах

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

Скалярный квадрат вектора
равен квадрату его длины

$$\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$$

Свойства скалярного произведения вектора

Переместительный закон

$$\vec{m} \cdot \vec{n} = \vec{n} \cdot \vec{m}$$

Сочетательный закон

$$(k\vec{m}) \cdot \vec{n} = k(\vec{m} \cdot \vec{n})$$

Распределительный закон

$$\vec{p} \cdot (\vec{m} + \vec{n}) = \vec{p} \cdot \vec{m} + \vec{p} \cdot \vec{n}$$

НОВАЯ ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Справочник содержит материал по всем основным темам курса математики для 5–9 классов: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Числовые последовательности», «Функции», «Координаты на прямой и в плоскости», «Статистика и теория вероятности», «Геометрия» — и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) основного общего образования.

Наглядность и доступность подачи материала — в виде схем и таблиц — позволяет легко и быстро обобщить, систематизировать и повторить материал школьного курса.

Книга будет полезна при подготовке к урокам, контрольным работам, промежуточной и итоговой аттестации, в том числе и для подготовки к основному государственному экзамену.

Авторы книги — Лев Иосифович Слонимский и Ирина Семёновна Слонимская — опытные учителя-практики, создатели многих популярных учебных пособий по математике.

ISBN 978-5-17-127507-5

WWW.ASTRU

9 785171 275075