

А.В. Чеботарева

УМК



ТЕСТЫ по физике

К учебнику А.В. Перышкина
«Физика. 7 класс»

- Содержат задания разных уровней сложности для эффективного текущего и итогового контроля
- Соответствуют образовательному стандарту
- Способствуют своевременному выявлению пробелов в знаниях
- Соответствуют содержанию и структуре учебника

7

класс



А.В. Чеботарева

Тесты по физике

К учебнику А.В. Перышкина
«Физика. 7 класс»
(М.: Дрофа)

7 класс

*Рекомендовано
Российской Академией Образования*

Издание третье, стереотипное

Издательство
«ЭКЗАМЕН»
МОСКВА • 2010

УДК 372.8:53

ББК 22.3я72

Ч 34

Имя автора и название цитируемого издания указаны на титульном листе данной книги (ст. 1274 п. 1 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации).

Изображение учебника «Физика. 7 класс.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В. Перышкин. — М.: Дрофа» приведено на обложке данного издания исключительно в качестве иллюстративного материала (ст. 1274 п. 1 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации).

Чеботарева, А.В.

Ч 34 Тесты по физике: 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений» / А.В. Чеботарева. — 3-е изд., стереотип. — М.: Издательство «Экзамен», 2010. — 159, [1] с. (Серия «Учебно-методический комплект»)

ISBN 978-5-377-03160-4

Пособие содержит тематические тестовые задания по физике для 7 класса, составленные к каждому параграфу учебника А.В. Перышкина «Физика. 7 класс». В издание также включены итоговые тематические работы: 6 контрольных тестов, каждый из которых представлен в четырех вариантах. Ко всем тестам даются ответы.

Пособие помогает осуществлять систематическую текущую проверку усвоения материала семиклассниками, своевременно выявлять пробелы в знаниях.

Издание адресовано как учителям физики, так и учащимся для самоконтроля.

УДК 372.8:53

ББК 22.3я72

Подписано в печать с диапозитивов 22.09.2009. Формат 70х100/16.

Гарнитура «Таймс». Бумага газетная. Уч.-изд. л. 4,22.

Усл. печ. л. 13. Тираж 150 000 (3-й завод — 15 000) экз. Заказ №9078

ISBN 978-5-377-03160-4

© Чеботарева А.В., 2010

© Издательство «ЭКЗАМЕН», 2010

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ВВЕДЕНИЕ	7
I. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА	11
Молекулы. Движение молекул	12
Взаимодействие молекул. Три состояния вещества	13
1. <i>Итоговый тест</i> (по темам «Введение» и «Первоначальные сведения о строении вещества»)	16
Вариант I	16
Вариант II	19
Вариант III	22
Вариант IV	25
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (ЧАСТЬ 1)	29
Механическое движение	30
Скорость. Единицы скорости	31
Инерция. Взаимодействие тел	34
Масса тела	35
Плотность вещества	36
Расчет массы и объема тела по плотности его вещества	38
2. <i>Итоговый тест</i> (темы «Механическое движение», «Масса тела», «Плотность вещества»)	40
Вариант I	40
Вариант II	43
Вариант III	46
Вариант IV	49
III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (ЧАСТЬ 2)	53
Сила. Явление тяготения. Сила тяжести	54
Сила упругости. Закон Гука	55
Вес тела	57
Единицы силы. Динамометр	58
Сложение двух сил, направленных по одной прямой	60
Сила трения	61
3. <i>Итоговый тест</i> (тема «Силы»)	63
Вариант I	63
Вариант II	66
Вариант III	69
Вариант IV	73
IV. ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (ЧАСТЬ 1)	77
Давление. Единицы давления	78
Давление газа	79

Содержание

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля	80
Давление в жидкости и газе	81
Расчет давления жидкости	82
Сообщающиеся сосуды	84
4. Итоговый тест (темы «Давление», «Давление в жидкостях и газах», «Сообщающиеся сосуды»)	85
Вариант I	85
Вариант II	88
Вариант III	90
Вариант IV	93
III. ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (ЧАСТЬ 2)	95
Атмосферное давление	96
Измерение атмосферного давления	97
Манометры. Поршневые насосы. Гидравлические машины	99
Давление жидкостей и газов на погруженные в них тела	102
Архимедова сила	103
Плавание тел	105
Плавание судов. Воздухоплавание	107
5. Итоговый тест (темы «Атмосферное давление», «Архимедова сила», «Плавание тел»)	109
Вариант I	109
Вариант II	112
Вариант III	116
Вариант IV	119
IV. РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ	123
Механическая работа. Единицы работы	124
Мощность. Единицы мощности	125
Простые механизмы. Рычаг	127
Момент силы. Применение рычагов	130
«Золотое правило» механики	132
Коэффициент полезного действия механизма	134
Энергия	135
6. Итоговый тест (темы «Работа», «Мощность», «Энергия»)	137
Вариант I	137
Вариант II	141
Вариант III	144
Вариант IV	147
ОТВЕТЫ	151

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пособие содержит тесты двух типов: 1) предназначенные для текущей проверки правильности усвоения учениками учебного материала по физике и 2) контроля прочности их знаний по всем изучаемым в VII классе темам. Поэтому в каждом его разделе сначала представлены тесты к параграфам учебника «Физика. 7 класс» А.В. Перышкина, а затем — итоговые тесты, содержание каждого из которых охватывает всю пройденную тему.

Тесты первого типа разнообразны по форме и сложности заданий. Число заданий в них различно: оно зависит от содержания и глубины рассмотрения соответствующего вопроса физики. Эти тесты можно предлагать семиклассникам в классе и на дом дифференцированно, индивидуально, учитывая их подготовку и способности.

Тесты второго типа (итоговые) содержат по 20 заданий (за исключением четвертого, в котором 15 заданий), ориентированных на проверку базовых физических знаний. Выполнение этих заданий может служить контрольными работами. Поэтому итоговые тесты составлены в четырех равноценных вариантах.

В каждом тесте предлагаются для выбора 4 или 3 ответа. Среди них обычно только один правильный ответ, но бывают и два, на что может ориентировать «множественность» объектов вопроса: «какие случаи...», «какие свойства...», «какие шары...» и т.д.

Поскольку главным при проверке знаний по физике должно быть выяснение правильности понимания физического смысла изучаемых понятий и закономерностей, а не вычисления, во всех задачах используется округленное значение g (10 Н/кг), а также иногда условные параметры технических устройств и физических приборов (удобные для расчетов).

Вполне вероятно, что в некоторых случаях (при слабой успеваемости школьников) выполнить все 20 заданий за один урок учащиеся не смогут. Зная подготовку и возможности своих учеников, учитель может заранее предусмотреть, какие задания будут сложны для ребят и исключить их из числа обязательных, а тех учеников, кто выполнит все задания, — поощрить (хотя бы похвалой).

В настоящее время «экспертиза» знаний с помощью тестов широко распространена. Выполняя тестовые задания с самого начала изучения физики, учащиеся будут хорошо ориентироваться в этом виде контроля знаний. Более того, они научатся использовать тесты как удобное средство самоконтроля за усвоением физики. А учителю тесты (кроме своего прямого «контрольного» назначения) помогут разнообразить самостоятельную работу школьников.

Так как представленные в пособии тесты в основном ориентированы на базовые физические знания, предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта, и на типичное содержание учебного материала по физике в VII классе, они могут быть полезны при изучении курса физики не только по учебнику А.В. Перышкина, но и по другим учебникам.

ВВЕДЕНИЕ



а	
б	
в	

1. Что изучает физика?

- а) Явления, происходящие в неживой природе.
- б) Световые, тепловые, механические, звуковые, электрические и магнитные явления.
- в) Разные изменения в окружающем мире.



а	
б	
в	
г	

2. Физическое тело – это ...

- а) ... любое твердое тело.
- б) ... предмет, который мы видим.
- в) ... тело, свойства которого изучаются в физике.
- г) ... любое тело в окружающем мире.



а	
б	
в	

3. Вещество – это ...

- а) ... все то, из чего состоят тела.
- б) ... материалы, из которых сделаны предметы.
- в) ... то, из чего состоят тела на Земле.



а	
б	
в	
г	

4. Что из перечисленного относится к физическим телам?

- а) Звук.
- б) Тепловоз.
- в) Пламя.
- г) Кислород.



а	
б	
в	
г	

5. Что из названного относится к веществам?

- а) Вода.
- б) Самолет.
- в) Луна.
- г) Цветок.



а	
б	
в	
г	

6. В каких случаях вещество, из которого может быть изготовлено тело, указано неправильно?

- а) Лодка – пластмасса.
- б) Крыша металл.
- в) Гвоздь – пластилин.
- г) Сумка ткань.



а	
б	
в	
г	

7. Когда ученику был задан вопрос «Какие он знает вещества?», тот среди других назвал следующие: вода (№ 1), железо (№ 2), море (№ 3), бумага (№ 4). В каком случае ученик допустил ошибку?

- а) № 1.
- б) № 2.
- в) № 3.
- г) № 4.

8. Что значит измерить физическую величину?

- а) Сравнить ее с другой величиной.
- б) Сравнить ее с однородной величиной, принятой за единицу.
- в) Узнать, во сколько раз она меньше или больше величины, принятой за единицу.

☒	а	☐
☐	б	☐
☐	в	☐

9. Какая единица длины (расстояния) принята как основная в международной системе единиц (СИ)?

- а) Сантиметр.
- б) Метр.
- в) Километр.
- г) Миллиметр.

☒	а	☐
☐	б	☐
☐	в	☐
☐	г	☐

10. Выразите расстояние, равные 0,5 км и 25000 мм, в метрах.

- а) 500 м и 25 м.
- б) 500 м и 2,5 м.
- в) 50 м и 250 м.
- г) 50 м и 2,5 м.

☒	а	☐
☐	б	☐
☐	в	☐
☐	г	☐

11. Каковы будут значения длин, равных 4 м и 100 мм, если их выразить в сантиметрах?

- а) 40 см и 10 см.
- б) 400 см и 10 см.
- в) 400 см и 1 см.
- г) 40 см и 1 см.

☒	а	☐
☐	б	☐
☐	в	☐
☐	г	☐


12. Цена деления шкалы прибора – это ...

- а) промежуток между цифрами, обозначенными на шкале.
- б) разность между первым и последним числами на шкале прибора.
- в) значение измеряемой величины, соответствующее расстоянию между двумя ближайшими штрихами шкалы.
- г) разность ближайших чисел на шкале, деленная на 10.

☒	а	☐
☐	б	☐
☐	в	☐
☐	г	☐

13. Какова цена деления мензурки изображенной на рисунке?

- а) 10 мл.
- б) 12,5 мл.
- в) 25 мл.
- г) 50 мл.



☒	а	☐
☐	б	☐
☐	в	☐
☐	г	☐



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

14. Какова погрешность измерения секундомером, показанным на рисунке?

а) 10 с.

в) 1 с.

б) 2 с.

г) 0,5 с.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

15. Почему каждому нужно знать физику?

а) Потому что физика объясняет причины разных явлений природы.

б) Так как именно эта наука позволяет создавать новую, все более совершенную технику.

в) Потому что физика дает знания о самых общих законах природы, играющих большую роль в жизни каждого человека.

г) Потому что верны все пункты (а, б, в)

I. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА

Молекулы. Движение молекул



а	
б	
в	
г	

1. Молекула – это ...

- а) ... частица вещества.
- б) ... кусочек вещества.
- в) ... маленькая частица.
- г) ... наименьшая частица того или иного вещества.



а	
б	
в	
г	

2. Вещества состоят из молекул. Почему же сделанные из них тела кажутся сплошными?

- а) Потому что молекулы расположены вплотную друг к другу.
- б) Потому что они занимают весь внутренний объем тела.
- в) Потому что промежутки между молекулами так малы, что не различимы глазом.
- г) Потому что молекулы малы.



а	
б	
в	
г	

3. Чем объясняется уменьшение размеров тела при сжатии и их увеличение при растяжении?

- а) Тем, что при сжатии промежутки между молекулами сокращаются, при растяжении увеличиваются.
- б) Тем, что молекулы сжимаются или растягиваются.
- в) Тем, что при сжатии молекулы становятся еще мельче, а при растяжении крупнее.
- г) Тем, что при сжатии или растяжении молекулы сдвигаются в ту или иную сторону.



а	
б	
в	
г	

4. Одинаковы ли молекулы одного и того же вещества?

- а) Различаются размером.
- б) Одинаковы.
- в) Иногда одинаковы, а иногда различаются.
- г) Отличаются.



а	
б	
в	
г	

5. Одинаковы ли молекулы разных веществ?

- а) Одинаковы.
- б) Различаются размером, составом, свойствами.
- в) Иногда одинаковы, а иногда различаются.
- г) Среди ответов нет верного.

6. Диффузия – это ...
- ...движение молекул.
 - ...расширение промежутков между молекулами.
 - ...проникновение хаотически движущихся молекул одного вещества в промежутки между молекулами другого вещества.
 - ...перемешивание веществ.
7. Диффузия происходит ...
- ...только в жидкостях.
 - ...только в газах.
 - ...в твердых телах.
 - ...во всех трех состояниях тел.
8. Какие из названных явлений представляют собой диффузию?
- Окрашивание воды в пробирке при попадании в нее капель йода.
 - Течение воды в реке.
 - Размешивание сахара в чае.
 - Распространение запаха гарн вокруг ножарища.
9. Как влияет на диффузию повышение температуры контактирующих тел?
- Диффузия происходит быстрее.
 - Сначала она ускоряется, потом не изменяется.
 - Не влияет.
 - Диффузия происходит медленнее.
10. В какое место – на солнце, в тень или холодильник – лучше всего поставить банку с огурцами, чтобы они дольше оставались малосольными?
- В тень.
 - На солнце.
 - В холодильник.
 - В любое место.

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

Взаимодействие молекул. Три состояния вещества

1. Как взаимодействуют молекулы тела?
- Притягиваются друг к другу.
 - Двигутся независимо друг от друга.
 - Отталкиваются одна от другой.
 - Молекулы и притягиваются, и отталкиваются: при расстояниях между ними, сравнимых с их размерами, преобладает притяжение, при меньших расстояниях – отталкивание.

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

I. Первоначальные сведения о строении вещества



а	
б	
в	
г	

2. Каким взаимодействием молекул – притяжением или отталкиванием – объясняются следующие факты: наличие у твердых тел постоянного объема и неизменной формы, смачиваемость жидкостью поверхности твердого тела, необходимость большого усилия для растяжения или разлома твердого тела?

- а) Отталкиванием.
- б) Притяжением.
- в) Взаимодействие молекул не объясняет этих фактов.
- г) Среди ответов нет верного.



а	
б	
в	
г	

3. Что из названного свидетельствует о существовании отталкивания молекул?

- а) Текучесть жидкости.
- б) Распрямление сжатого ластика.
- в) Практическое сохранение жидкостью объема при ее сдавливании.
- г) Несмачиваемость жидкостью поверхности твердого тела.



а	
б	
в	
г	

4. В скольких и каких состояниях могут вообще находиться вещества?

- а) В двух: твердом и жидком.
- б) В двух: твердом и газообразном.
- в) В трех: в виде твердого тела, жидкости и пара.
- г) В трех: твердом, жидком и газообразном.



а	
б	
в	

5. Может ли какое-либо вещество быть в разных состояниях?

- а) Не может.
- б) Нет: любое вещество или твердое, или жидкое, или газообразное.
- в) Может: оно изменит свое состояние, если изменятся условия.



а	
б	
в	

6. Какими общими свойствами обладают твердые тела?

- а) Собственным объемом и изменчивостью формы.
- б) Собственными объемом и формой.
- в) Собственной формой и легко изменяемым объемом.



а	
б	
в	
г	

7. Каковы общие свойства жидкостей?

- а) Наличие у них собственного объема и текучести, следовательно, изменчивости формы.
- б) Обладание собственным объемом и формой.
- в) Отсутствие собственного объема и формы.
- г) Трудность изменения объема и формы.

8. Какие общие свойства присущи газам?

- а) Сохранение газом своего объема и формы.
- б) Неизменность объема газа при приобретении им любой формы.
- в) Заполнение газом всего предоставленного ему пространства.
- г) Трудность сжатия, изменения формы и объема.

☒	
а	
б	
в	
г	

9. Как расположены, взаимодействуют и движутся молекулы в газах?

- а) Молекулы расположены на расстояниях, сравнимых с размерами самих молекул, и перемешаются свободно друг относительно друга.
- б) Молекулы находятся на больших расстояниях (по сравнению с размерами молекул) друг от друга, практически не взаимодействуют и движутся беспорядочно.
- в) Они расположены в строгом порядке, сильно взаимодействуют и колеблются около определенных положений.
- г) Молекулы находятся на больших расстояниях друг от друга в определенном порядке, слабо взаимодействуют друг с другом и движутся в разные стороны.

☒	
а	
б	
в	
г	

10. В каком состоянии вещества его молекулы сближены на расстояния, меньшие размеров самих молекул, сильно взаимодействуют и остаются на одних и тех же местах, лишь совершая около них колебания?

- а) Жидком.
- б) Твердом.
- в) Газообразном.
- г) В любом из этих состояний.

☒	
а	
б	
в	
г	

11. Чем отличается с молекулярной точки зрения сталь в твердом и жидком состояниях?

- а) Ничем.
- б) Составом молекул.
- в) Размером молекул.
- г) Расположением, взаимодействием и движением молекул.

☒	
а	
б	
в	
г	

1. Итоговый тест (по темам «Введение» и «Первоначальные сведения о строении вещества»)

Вариант I



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

1. Какие явления изучает физика?

- а) Происходящие на Земле.
- б) Наблюдаемые на земле и в небе.
- в) Механические, тепловые, оптические, звуковые, электрические и магнитные.
- г) Происходящие на земле и в океанах.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

2. К физическим телам относятся ...

- а) ...молоко.
- б) ...глина.
- в) ...скамейка.
- г) ...лыжи.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

3. К веществам относятся ...

- а) ...сахар.
- б) ...булка.
- в) ...йод.
- г) ...бинт.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

4. Выразите длину тела, равную 5000 мм, в метрах и километрах.

- а) 50 м; 0,05 км.
- б) 5 м; 0,05 км.
- в) 5 м; 0,005 км.
- г) 50м; 0,5 км.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

5. Определите цену деления шкалы прибора.

- а) 1 ед.
- б) 0,5 ед.
- в) 0,25 ед.
- г) 5 ед.



а	☐
б	☐
в	☐

6. Цена деления шкалы линейки 1 мм. Какую погрешность допускают те, кто измеряет ею длину тела?

- а) 1 мм.
- б) 2 мм.
- в) 0,5 мм.

1. Итоговый тест



а	
б	
в	
г	

14. Какие общие свойства присущи газам?

- а) Легко охлаждаются.
- б) Занимают весь предоставленный им объем и не имеют собственной формы.
- в) Имеют собственную форму.
- г) Обладают текучестью.



а	
б	
в	
г	

15. Какими общими свойствами обладают жидкости?

- а) Занимают объем того сосуда, в который налиты.
- б) Приобретают объем и форму сосуда.
- в) Имеют собственный объем.
- г) Мало сжимаемы.



а	
б	
в	
г	

16. Какие общие свойства принадлежат твердым телам?

- а) Имеют собственную форму и объем.
- б) Легко изменяют форму и объем.
- в) Легко сжимаемы.
- г) Практически не сжимаемы.



а	
б	
в	
г	

17. В каком состоянии – жидком, твердом, газообразном – может находиться бензин?

- а) Во всех трех состояниях.
- б) Только в жидком состоянии.
- в) В жидком и газообразном состоянии.
- г) В жидком и твердом состоянии.



а	
б	
в	
г	

18. Чем объясняется малая сжимаемость твердых тел?

- а) Быстрым движением их молекул.
- б) Очень малым размером молекул.
- в) Плотной упаковкой молекул и малостью промежутков между ними.
- г) Хаотичностью движения молекул.



а	
б	
в	

19. Почему газы не имеют собственной формы?

- а) Потому что их молекулы быстро движутся.
- б) Из-за диффузии.
- в) Потому что молекулы газа, практически не взаимодействуя, двигаясь свободно и хаотично, достигают всех стенок сосуда (помещения), и газ принимает его форму.

20. Чем можно объяснить сохранение жидкостью своего объема?

- а) Довольно сильным притяжением молекул друг к другу.
- б) Не очень быстрым движением ее молекул.
- в) Отсутствием диффузии.
- г) Тем, что молекулы жидкости не отталкиваются друг от друга.

☒	
а	
б	
в	
г	

Вариант II

1. Что служит источником физических знаний?

- а) Измерения.
- б) Наблюдения и опыты.
- в) Только наблюдения.
- г) Только опыты.

☒	
а	
б	
в	
г	

2. К физическим телам относятся ...

- а) ...сок.
- б) ...здание.
- в) ...песок.
- г) ...вилка.

☒	
а	
б	
в	
г	

3. К веществам относятся ...

- а) ...провод.
- б) ...медь.
- в) ...лед.
- г) ...ведро.

☒	
а	
б	
в	
г	

4. Выразите длину тела, равную 20 м, в миллиметрах и километрах.

- а) 20 000 мм; 0,02 км.
- б) 2000 мм; 0,02 км.
- в) 20 000 мм; 0,2 км.
- г) 2000 мм; 0,2 км.

☒	
а	
б	
в	
г	

5. Какова цена деления этой шкалы прибора?

- а) 0,5 ед.
- б) 1 ед.
- в) 0,25 ед.
- г) 0,2 ед.




☒	
а	
б	
в	
г	

6. Чему равен объем находящейся в мензурке жидкости?

Какова цена деления шкалы мензурки?

- а) 30 мл; 10 мл.
- б) 30 мл; 5 мл.
- в) 40 мл; 5 мл.
- г) 40 мл; 10 мл.



☒	
а	
б	
в	
г	

А	
Б	
В	
Г	

☒

а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	

М	
С	
В	
Г	

☒

a	
b	
c	

☐ ☒

а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	

- 20

14. Какие общие свойства характерны для твердых тел?

- а) Легкая сжимаемость. в) Собственный только объем.
б) Собственный объем и форма. г) Практическая несжимаемость.



а	
б	
в	
г	

15. Какими общими свойствами обладают жидкости?

- а) Текучестью, позволяющей им переливаться и принимать форму сосуда.
б) Отсутствием собственного объема.
в) Наличием собственного объема и малой сжимаемостью.
г) Легкой сжимаемостью.



а	
б	
в	
г	

16. Какие общие свойства присущи газам?

- а) Текучесть.
б) Большая сжимаемость.
в) Заполнение всего предоставленного им объема и отсутствие собственной формы.
г) Наличие собственного объема.



а	
б	
в	
г	

17. В твердом, жидком или газообразном состоянии может быть водород?

- а) Твердом.
б) Жидком.
в) В виде газа.
г) В зависимости от условий в любом из них.



а	
б	
в	
г	

18. Почему жидкости принимают форму сосуда?

- а) Из-за отталкивания их молекул друг от друга.
б) Потому что молекулы жидкости, взаимодействуя не сильно, могут перемещаться относительно друг друга.
в) Потому что молекулы жидкости двигаются быстро.
г) Потому что молекулы жидкости не взаимодействуют.



а	
б	
в	
г	

19. Чем объясняется сохранение твердым телом своего объема?

- а) Малостью промежутков между молекулами твердого тела.
б) Отсутствием притяжения его молекул друг к другу.
в) Слабостью взаимного отталкивания молекул.
г) Сильным взаимодействием молекул твердого тела.



а	
б	
в	
г	

1. Итоговый тест



а	
б	
в	
г	

20. Почему газы не имеют собственного объема?

- а) Потому что молекулы газа удалены друг от друга на такие расстояния, что не взаимодействуют и, двигаясь хаотически, занимают свободное пространство.
- б) Из-за диффузии молекул.
- в) Потому что молекулы газа быстро движутся и успевают занять весь предоставленный объем.
- г) Из-за сильного отталкивания молекул газа друг от друга.

Вариант III



а	
б	
в	
г	

1. Длина, площадь, объем – это ...

- а) ...качества тела.
- б) ...его физические свойства.
- в) ...физические величины, характеризующие размеры тел.
- г) Среди ответов нет верного.



а	
б	
в	
г	

2. К физическим телам относятся ...

- а) ...парта.
- б) ...сахар.
- в) ...бензин.
- г) ...комар.



а	
б	
в	
г	

3. К веществам относятся ...

- а) ...соль.
- б) ...сталь.
- в) ...рыба.
- г) ...раковина.



а	
б	
в	
г	

4. Выразите длину тела, равную 70 дм, в сантиметрах и метрах.


- а) 7000 см; 7 м.
- б) 7 см; 0,7 м.
- в) 700 см; 7 м.
- г) 700 см; 0,7 м.




а	
б	
в	
г	

5. Определите цену деления изображенной здесь шкалы прибора.

- а) 30 ед.
- б) 3 ед.
- в) 6 ед.
- г) 5 ед.



6. Каков объем налитой в мензурку воды? Какая погрешность допущена?



- а) 90 мл, 1 мл.
б) 9 мл, 1мл.
в) 9 мл, 2 мл.
г) 9 мл, 0,5 мл.

☒	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

7. Цена деления шкалы весов 10 г. С какой погрешностью взвешивают ими продукты?

- а) 10 г.** **в) 5 г.**
б) 0,5 г. **г) 1 г.**

	
А	
Б	
В	
Г	

8. Молекула – это ...

- а) ...невидимая глазом частица.
б) ...очень маленькая частица тела.
в) ...мельчайшая частица вещества, из которого состоит тело.

	
A	
G	
B	

9. Молекулы в веществе взаимодействуют:

- а) ...притягиваются друг к другу.
- б) ...отталкиваются друг от друга.
- в) ...иногда притягиваются, иногда отталкиваются.
- г) ...в зависимости от расстояния между ними преобладает то притяжение, то отталкивание.

	
A	
B	
C	
D	

10. Чем отличаются молекулы в куске свинца от молекул в расплавленном свинце?

- а) Ничем.
б) Числом атомов.
- в) Свойствами.
г) Размерами.

	☒
A	
B	
C	

11. Какое из приведенных явлений – диффузия?

- а) Проникновение беспорядочно движущихся молекул одного вещества в промежутки между молекулами другого вещества.
- б) Перемешивание жидких веществ.
- в) Сокращение промежутков между молекулами при сжатии тел.
- г) Перемещение одних молекул среди других по промежуткам между ними.

	
А	
Б	
В	
Г	

1. Итоговый тест



а	
б	
в	
г	

12. Чтобы диффузия происходила быстрее, надо ...

- а) ...поместить контактирующие тела в холодное место.
- б) ...поместить их в темное место.
- в) ...нагреть их.
- г) ...отодвинуть от нагревателя.



а	
б	
в	
г	

13. В каком теле – твердом; жидком, газообразном – диффузия происходит медленнее всего?

- а) В твердом.
- б) В жидком.
- в) В газообразном.
- г) Во всех телах одинаково.



а	
б	
в	
г	

14. Какие общие свойства имеют газы?

- а) Собственную форму.
- б) Собственный объем.
- в) Отсутствие собственного объема и формы.
- г) Легкую сжимаемость.



а	
б	
в	
г	

15. Какие общие свойства характерны для твердых тел?

- а) Наличие собственных объема и формы.
- б) Сохранение объема и изменчивость формы.
- в) Отсутствие собственных объема и формы.
- г) Сохранение формы и изменчивость объема.



а	
б	
в	
г	

16. Какими общими свойствами обладают жидкости?

- а) Собственной формой.
- б) Собственным постоянным объемом.
- в) Малой сжимаемостью.
- г) Способностью занимать объем сосуда.



а	
б	
в	
г	

17. В каком состоянии – твердом, жидком, газообразном – может быть свинец?

- а) В твердом.
- б) В жидком.
- в) В газообразном.
- г) В любом из трех состояний.

18. Почему газы занимают все предоставленное им пространство?

- а) Потому что их молекулы быстро движутся.
- б) Из-за отталкивания молекул друг от друга.
- в) Вследствие диффузии.
- г) Потому что молекулы газа практически не взаимодействуют и движутся во всех направлениях.

☒	
а	
б	
в	
г	

19. Как движутся и взаимодействуют молекулы твердого тела?

- а) Слабо взаимодействуют и движутся хаотично, но медленно.
- б) Сильно взаимодействуют и не движутся.
- в) Сильно взаимодействуют и не могут удалиться друг от друга – каждая молекула лишь колеблется около определенной точки.

☒	
а	
б	
в	

20. Чем объясняется малая сжимаемость жидкостей?

- а) Достаточно близким друг к другу расположением молекул.
- б) Относительно большими размерами их молекул.
- в) Быстрой движением молекул.

☒	
а	
б	
в	

Вариант IV

1. К веществам относятся:

- а) Карандаш.
- б) Графит.
- в) Масло.
- г) Бутылка.

☒	
а	
б	
в	
г	

2. К физическим телам относятся:

- а) Бабочка.
- б) Вертолет.
- в) Сыр.
- г) Бронза.

☒	
а	
б	
в	
г	

3. Температура – это ...

- а) ...признак нагретости тела.
- б) ...величина, характеризующая нагретость тела.
- в) ...физическое явление.
- г) ...среди ответов нет верного.

☒	
а	
б	
в	
г	

1. Итоговый тест



4. Выразите расстояние, равное 0,9 км, в метрах и сантиметрах.

а) 90 м: 9000 см.

в) 900 м; 9000 см.

б) 90 м: 90000 см.

г) 900 м; 90000 см.




- 5. Найдите цену деления шкалы этого прибора.**

в) 50 ел.

в) 25 ед.

б) 200 ед.

г) 100 ед.




6. Определите объем жидкости в мензурке и цену деления ее шкалы.

в) 7,5 мл, 2,5 мл.

б) 5,5 мл, 2,5 мл.

в) 7,5 мл, 5 мл.

г) 5,5 мл, 5 мл.



7. Шкала линейки имеет цену деления, равную 1 мм. Какова погрешность измерения длины тел этой линейкой?

а) 1 мм.

B) 2 MM.

6) 0.5 mm.

г) 1.5 мм.



8. Мельчайшие частицы вещества, из которых состоят тела, называются ...

в) ...молекулами.

б) ...неделимыми частицами.

в) ...вездесущими частицями.



9. Взаимодействие молекул вещества – это ...

а) ...их отталкивание друг от друга.

б) ...их протяжение друг к другу.

в) ...их диффузия.

г) ...притяжение или отталкивание в зависимости от расстояния между ними.



10. Чем отличаются молекулы сливочного масла в пачке от его молекул в растопленном виде?

в) Размером.

в) Ничем.

б) Числом атомов.

г) Свойствами.

11. Какое из названных явлений – диффузия?

- а) Увеличение промежутков между молекулами при растяжении тела.
- б) Притяжение и отталкивание молекул.
- в) Проникновение молекул одного вещества между молекулами другого вещества.
- г) Перемешивание веществ.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

12. Замедлить диффузию можно, если ...

- а) ...нагреть контактирующие тела.
- б) ...охладить тела.
- в) ...сильно прижать их друг к другу.
- г) ...переставить тела с одного стола на другой.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

13. В каких телах – газообразных, жидких, твердых – диффузия происходит наиболее медленно?

- а) Газообразных.
- б) Жидких.
- в) Твердых.
- г) Во всех одинаково.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

14. Какие общие свойства характерны для жидкостей?

- а) Заполнение всего объема сосуда.
- б) Отсутствие определенной формы.
- в) Наличие собственного объема и малая сжимаемость.
- г) Легкая сжимаемость.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

15. Какими общими свойствами обладает любой газ?

- а) Заполняет всю предоставленную ему емкость.
- б) Не имеет собственного объема и формы.
- в) Плохо сжимаем.
- г) Сохраняет свой объем и форму.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

16. Какие из указанных свойств принадлежат твердому телу?

- а) Практическая несжимаемость.
- б) Способность легко приобретать любую форму.
- в) Отсутствие собственного постоянного объема.
- г) Обладание собственными объемом и формой.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

1. Итоговый тест



а	
б	
в	
г	

17. В каком состоянии – твердом, жидком, газообразном – может находиться олово?

- а) В твердом.
- б) В любом.
- в) В жидком.
- г) В газообразном.



а	
б	
в	
г	

18. Как объяснить легкую сжимаемость газов?

- а) Притяжением молекул газа друг к другу.
- б) Хаотичностью движения их молекул.
- в) Относительно большими промежутками между молекулами газов.
- г) Большой скоростью их молекул.



а	
б	
в	
г	

19. Чем вызвано сохранение твердым телом своей формы?

- а) Постоянным действием притяжения молекул.
- б) Постоянным действием отталкивания молекул.
- в) Непрерывным движением молекул.
- г) Сильным взаимодействием молекул.



а	
б	
в	
г	

20. Чем объясняется текучесть жидкости?

- а) Быстрым движением молекул.
- б) Сильным отталкиванием молекул друг от друга.
- в) Относительно слабым притяжением молекул друг к другу.
- г) Среди ответов нет верного.

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (ЧАСТЬ 1)

Механическое движение



а	
б	
в	
г	

1. Механическим движением называют ...

- а) ...изменение положения тела.
- б) ...изменение положения тела относительно других тел.
- в) ...нарушение покоя тела.
- г) ...изменение положения тела относительно Земли.



а	
б	
в	
г	

2. Человек, сидящий в едущем трамвае, движется относительно ...

- а) ...зданий.
- б) ...других пассажиров.
- в) ...людей на тротуаре.
- г) ...водителя трамвая.



а	
б	
в	
г	

3. Космонавт на Международной космической станции, выполняющий наблюдения, находится в покое относительно ...

- а) ...прибора, с которыми он работает.
- б) ...звезд.
- в) ...Земли.
- г) ...Солнца.



а	
б	
в	
г	

4. Траектория – это ...

- а) ...путь тела.
- б) ...след, который оставляет движущееся тело.
- в) ...место, куда движется тело.
- г) ...линия, по которой движется тело.



а	
б	
в	

5. Траектория представляет собой прямую линию, когда ...

- а) ...поезд метрополитена проходит мимо платформы станции.
- б) ...самолет выполняет «мертвую петлю».
- в) ...автомобиль поднимается по горной дороге.



а	
б	
в	

6. Траектория – кривая линия в случае ...

- а) ...подъема лифта на верхний этаж.
- б) ...спуска лифта с верхнего этажа.
- в) ...автопробега по замкнутому маршруту.

7. Что такое путь?

- а) Расстояние, на которое переместилось тело.
- б) Часть траектории, по которой двигалось тело.
- в) Длина траектории, пройденная телом за данное время движения.

☒	
а	☐
б	☐
в	☐

8. Какая единица принята в СИ для измерения пути в качестве основной?

- а) Миллиметр.
- б) Сантиметр.
- в) Метр.
- г) Километр.

☒	
а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

9. Какое движение тела называют равномерным?

- а) При котором изменение движения тела происходит плавно.
- б) Когда тело проходит за любые равные промежутки времени равные расстояния.
- в) Когда пути, проходимые телом за равные промежутки времени, увеличиваются или уменьшаются на равные отрезки.

☒	
а	☐
б	☐
в	☐

10. Движение какого тела можно считать равномерным?

- а) Взлетающего с поверхности озера лебедя.
- б) Набегающей на берег волны.
- в) Мотоцикла, подъезжающего к светофору с красным сигналом.
- г) Автомобиля на участке дороги, где указана скорость движения.

☒	
а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

Скорость. Единицы скорости

1. Скорость – это физическая величина, которая показывает ...

- а) ...пройденный телом путь.
- б) ...как быстро движется тело.
- в) ...какой путь проходит тело за единицу времени.

☒	
а	☐
б	☐
в	☐

2. Какая принята единица скорости в СИ?

- а) Миллиметр в секунду (мм/с).
- б) Сантиметр в секунду (см/с).
- в) Метр в секунду (м/с).
- г) Километр в час (км/ч).

☒	
а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

10. Автобус проехал свой маршрут от станции до конечной остановки за 0,8 ч со средней скоростью 32 км/ч. Чему равен его путь?

- а) 32 км.** **в) 40 км.**
б) 25,6 км. **г) 20 км.**


	☒
В	
6	
В	
Г	

11. Через сколько времени трамвай вернется на конечную остановку, если его путь до противоположной конечной остановки равен 21 км, а средняя скорость движения 40 км/ч?

- а) 0,6 ч.
б) 36 мин.
- в) 63 мин.
г) 1,2 ч.

☒	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐


12. По графику зависимости пути равномерного движения тела от времени, представленному на рисунке, определите, чему равен пройденный телом путь за 5 с. Какова его скорость?



- а) $s = 80 \text{ м}$; $v = 16 \text{ м/с}$.
б) $s = 80 \text{ м}$; $v = 400 \text{ м/с}$.
в) $s = 60 \text{ м}$; $v = 12 \text{ м/с}$.
г) $s = 80 \text{ м}$; $v = 8 \text{ м/с}$.

	
а	
б	
в	
г	


13. На рисунке показан график зависимости пути равномерного движения тела от времени. Какой путь прошло тело за 2,5 мин? Чему равна его скорость?



- а) $s = 500 \text{ м}$; $v = 20 \text{ м/с}$. в) $s = 150 \text{ м}$; $v = 60 \text{ м/с}$.
б) $s = 150 \text{ м}$; $v = 6 \text{ м/с}$. г) $s = 150 \text{ м}$; $v = 1 \text{ м/с}$.

☒	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

14. На рис. изображены графики 1, 2 и 3 зависимости скорости от времени трех тел. Какой график соответствует замедленному движению тела? В какой момент времени скорости всех трех тел стали равными?



- а) 1; через 7 с.**

	
а	
б	
в	
г	

Инерция. Взаимодействие тел



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

1. Что происходит с телом, на которое не действуют другие тела?

- а) Если оно двигалось, то останавливается.
- б) Если находится в покое, то приходит в движение.
- в) Оно либо покоится, либо движется прямолинейно и равномерно.
- г) Правильного ответа нет.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

2. Инерцией называют явление ...

- а) ...изменения положения тела относительно других тел.
- б) ...изменения скорости тела под действием других тел.
- в) ...зависимости пройденного телом пути от скорости движения.
- г) ...сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

3. В каком из названных здесь случаев тело движется с постоянной скоростью?

- а) Если у него очень большая скорость.
- б) Если оно движется по инерции.
- в) Когда действие на тело других тел мало.
- г) Когда оно большое.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

4. Какие из указанных тел движутся по инерции?

- а) Конькобежец, вставший на оба конька.
- б) Лодка при гребле веслами.
- в) Санки, скатившиеся с горы.
- г) Санки, в которых везут ребенка.




а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

5. Есть ли среди названных тел движущиеся по инерции: 1) лодка с поднятыми гребцом веслами; 2) самолет, движущийся по взлетной полосе; 3) пассажир, едущий в равномерно и прямолинейно движущемся поезде.

- а) 1.
- б) 2.
- в) 3.
- г) Нет.

6. Тормозной путь автомобиля равен 30 м. Что это значит?
- а) Что этот автомобиль проедет 30 м и остановится.
 - б) Что при торможении он проедет 30 м.
 - в) Что автомобиль может проехать по инерции 30 м.
 - г) Что при выключении двигателя трение колес о землю может остановить его движение по инерции только в конце 30-метрового пути.
7. Каковы причины уменьшения скорости пули при пробитии доски?
- а) Сопротивление воздуха движению пули на пути к доске.
 - б) Сопротивление волокон древесины, которые пуля разрывает, пробивая доску.
 - в) Действие воздуха между волокнами древесины.
 - г) Совместное действие причин а и б.
8. На рисунке показаны: 1) тележка с упругой пластинкой, которую согнутой удерживает нить; 2) две тележки, между которыми находится такая же пластинка; 3) парусная лодка, на корме которой стоит вентилятор, направляющий поток воздуха на парус. Какие из этих тел придут в движение, если пережечь нити и включить вентилятор?



- а) 1.
- б) 2.
- в) 3.
- г) 1 и 2.

Масса тела

1. Какое свойство тела называют инертностью?
- а) Изменение его скорости при взаимодействии с другими телами.
 - б) Неодинаковость изменения скорости тела при его взаимодействии с разными телами.
 - в) Сохранение скорости, если нет взаимодействия с другими телами.
 - г) Среди ответов нет верного.

☒
а
б
в
г

☒
а
б
в
г

☒
а
б
в
г

☒
а
б
в
г

II. Взаимодействие тел (часть 1)



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

2. Какая физическая величина введена для характеристики инертности тела?

- а) Время движения. в) Масса.
б) Скорость движения. г) Пройденный после взаимодействия путь.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

3. Основная единица массы в СИ – это...

- а) ...миллиграмм (мг). в) ...килограмм (кг).
б) ...грамм (г). г) ...тонна (т).



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

4. Масса коробки конфет равна 600 г. Какова ее масса в килограммах?

- а) 6 кг. в) 0,06 кг.
б) 0,6 кг. г) $6 \cdot 10^{-2}$ кг.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

5. Выразите в миллиграммах массу крупного помидора, равную 0,5 кг?

- а) 500 мг. в) 50000 мг.
б) 5000 мг. г) 500000 мг.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

6. Каким прибором измеряют массу тела?

- а) Мензуркой. в) Весами.
б) Рулеткой. г) Секундомером.

Плотность вещества



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

1. Плотность – это физическая величина, показывающая ...

- а) ...сколько в теле молекул.
б) ...чему равна масса тела из данного вещества.
в) ...что массы разных тел неодинаковы.
г) ...какова масса 1 м³ вещества.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

2. Как определить плотность вещества?

- а) Измерить массу тела, сделанного из этого вещества.
б) Определить массу тела и его размеры.
в) Найти массу тела из данного вещества, его объем и разделить массу на объем.
г) Сравнить массы двух тел из данного вещества.

3. Плотность нефти 800 кг/м^3 . Что это значит?

- а) Что 1 м^3 нефти имеет массу, равную 800 кг .
 б) Что масса нефти должна быть выражена в кг , а объем в м^3 .
 в) Что масса нефти равна 800 кг при любом объеме.

☒	
а	
б	
в	

4. Плотность стекла 2500 кг/м^3 . Выразите ее в г/см^3 .

- а) 2500 г/см^3 .
 б) $2,5 \text{ г/см}^3$.
 в) 250 г/см^3 .
 г) 25 г/см^3 .

☒	
а	
б	
в	
г	

5. Плотность алюминия $2,7 \text{ г/см}^3$. Выразите ее в кг/м^3 .

- а) $2,7 \text{ кг/м}^3$.
 б) 27 кг/м^3 .
 в) 270 кг/м^3 .
 г) 2700 кг/м^3 .

☒	
а	
б	
в	
г	


6. На рисунке показаны три шара, имеющие равные массы. Какой из них обладает наибольшей плотностью?



- а) № 1.
 б) № 2.
 в) № 3.
 г) Плотности шаров одинаковы.

☒	
а	
б	
в	
г	

7. Какой из кубиков равного объема, представленных на рисунке, имеет наименьшую плотность?



- а) № 1.
 б) № 2.
 в) № 3.
 г) Плотности одинаковы.

☒	
а	
б	
в	
г	

8. Коробка объемом $30 \text{ см} \times 45 \text{ см} \times 20 \text{ см}$ заполнена сахаром-рафинадом. Его масса $43,2 \text{ кг}$. Какова плотность сахара?

- а) $3,2 \text{ г/см}^3$.
 б) 16 г/см^3 .
 в) $0,16 \text{ г/см}^3$.
 г) $1,6 \text{ г/см}^3$.

☒	
а	
б	
в	
г	

9. В бидон налили 50 л меда. Его масса $67,5 \text{ кг}$. Найдите плотность меда.

- а) $13,5 \text{ г/см}^3$.
 б) $13,5 \text{ кг/м}^3$.
 в) $1,35 \text{ г/см}^3$.
 г) $1,35 \text{ кг/м}^3$.

☒	
а	
б	
в	
г	



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

10. Медная, чугунная и стальная детали объемом 200 см^3 каждая имеют массы, соответственно $1,78 \text{ кг}$, $1,4 \text{ кг}$ и $1,56 \text{ кг}$. Какая из них обладает плотностью меньшей, чем цинк?

- а) Стальная.
- б) Медная.
- в) Чугунная.
- г) У всех плотность больше, чем у цинка.

Расчет массы и объема тела по плотности его вещества



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

1. По какой формуле рассчитывается масса тела?

- а) $\rho = \frac{m}{V}$
- б) $m = \rho V$
- в) $s = vt$
- г) $V = \frac{m}{\rho}$



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

2. Какова масса подсолнечного масла в 3-литровой банке?

- а) $27,9 \text{ г}$.
- б) 279 г .
- в) $27,9 \text{ кг}$.
- г) $2,79 \text{ кг}$.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

3. Найдите массу чугунной плиты размером $1 \times 0,5 \times 0,4 \text{ м}^3$.

- а) 14000 кг .
- б) 140 кг .
- в) 1400 кг .
- г) 14 т .




а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

4. Воздушный шар вместимостью 100 м^3 наполнен водородом. Какова его масса при нормальном атмосферном давлении и температуре 20°C ?

- а) 9 кг .
- б) 9 т .
- в) 90 кг .
- г) $0,9 \text{ т}$.

5. Найдите массу фарфорового ролика, изображенного на рисунке.

- а) 17,25 г.
- б) 1,725 кг.
- в) 172,5 г.
- г) 17,25 кг.



☒	
а	
б	
в	
г	

6. По какой формуле рассчитывается объем тела?

- а) $t = \frac{s}{v}$
- б) $\rho = \frac{m}{V}$
- в) $v = \frac{s}{t}$
- г) $V = \frac{m}{\rho}$

☒	
а	
б	
в	
г	

7. Определите объем куска меди массой 445 г.

- а) 50 см³.
- б) 5 см³.
- в) 500 см³.
- г) 5 м³.

☒	
а	
б	
в	
г	

8. Плотность легкого материала – поролона – 0,5 г/см³. Какой объем занимает его пласт массой 7,5 кг?

- а) 0,5 м³.
- б) 1500 см³.
- в) 15000 см³.
- г) 1,5 м³.

☒	
а	
б	
в	
г	

9. В какой сосуд – пол-литровый (№ 1) или вместимостью 400 мл (№ 2) – войдет 450 г машинного масла?

- а) В оба сосуда.
- б) В № 1.
- в) В № 2.
- г) Масло перельется через края обоих сосудов.

☒	
а	
б	
в	
г	

2. Итоговый тест

(темы «Механическое движение»,
«Масса тела», «Плотность вещества»)

Вариант I



а	☐
б	☐
в	☐

1. Относительно каких тел водитель грузовика, едущего по шоссе, находится в покое?

а) Относительно проводов, тянувшихся вдоль шоссе.
б) Относительно дальних (у горизонта) лесов.
в) Относительно кузова с грузом.



а	☐
б	☐
в	☐

2. Какие из названных тел движутся по криволинейной траектории?

а) Автомобиль, едущий по выпуклому мосту.
б) Электровоз, перегоняющий вагоны на запасной путь.
в) Человек, идущий по вагону к своему купе.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

3. В каком случае тело движется равномерно?

а) Когда оно плавно набирает скорость.
б) Когда его скорость постоянна.
в) Когда его скорость плавно уменьшается.
г) Когда оно движется медленно.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

4. Выразите путь, равный 0,4 км, в метрах.

а) 4 м.
б) 40 м.
в) 400 м.
г) 4000 м.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

5. Найдите скорость в (м/с) лодки, равномерно дрейфующей 90 м за 1,5 мин.

а) 0,6 м/с.
б) 6 м/с.
в) 10 м/с.
г) 1 м/с.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

6. Какова средняя скорость мотоциклиста, проехавшего первые 30 км своего пути за 30 мин., а вторые 30 км за 20 мин.?

а) 72 км/ч.
б) 75 км/ч.
в) 78 км/ч.
г) 80 км/ч.



13. Одна из взаимодействующих тележек откатилась от места взаимодействия на 20 см, а другая – на 60 см. Какая из них более инертна?

- а) Первая.
- б) Вторая.
- в) Они одинаково инертны.
- г) По имеющимся данным это определить нельзя.



14. Какой прибор измеряет массу тела?

- а) Спидометр.
- б) Термометр.
- в) Линейка.
- г) Весы.



15. Что показывает плотность вещества?

- а) Массу тела.
- б) Как плотно друг к другу расположены его молекулы.
- в) Легкое или тяжелое это вещество.
- г) Массу 1 м³ вещества.



16. На рисунке изображены три шара, массы которых одинаковы. Плотность вещества какого из них наименьшая?



- а) № 1.
- б) № 2.
- в) № 3.
- г) Для ответа нужны дополнительные данные.



17. Какова плотность горной породы, осколок которой объемом 0,03 м³, обладает массой 81 кг?

- а) 2700 кг/м³.
- б) 270 кг/м³.
- в) 243 кг/м³.
- г) 2430 кг/м³.



18. Рассчитайте плотность вещества, из которого сделан куб, ребро которого равно 40 см, а масса 160 кг.

- а) 4 кг/м³.
- б) 0,025 кг/м³.
- в) 250 кг/м³.
- г) 2500 кг/м³.

19. Найдите массу латунного бруска объемом $0,001 \text{ м}^3$.

- а) 8,5 кг.** **в) 85 кг.**
б) 0.85 кг. **г) 850 кг.**

20. Определите объем куска льда массой 4,5 т.

- а) $4,5 \text{ м}^3$. в) 5 м^3 .
б) 45 м^3 . г) 50 м^3 .



Вариант II

1. Теплоход подплыл к пристани и пассажиры стали выходить на берег. Относительно каких тел теплоход движется в это время?

- а) Относительно берега.
- б) Относительно пассажиров.
- в) Относительно лодок, с которых рыбаки удят рыбу.
- г) Среди ответов нет правильного.



2. В каком из этих случаев тело движется по прямолинейной траектории?

- а) Катер, плывущий от одного изгиба реки к другому.
б) Ночной автомобиль, преодолевающий пересеченную местность.
в) Конькобежец, участвующий в соревнованиях на ледовом поле стадиона.
г) Среди ответов нет правильного.



3. Когда тело движется неравномерно?

- а) Когда его скорость очень велика.
- б) Когда он движется с неизменной скоростью.
- в) Когда его скорость изменяется во время движения.
- г) Здесь нет верного ответа.



4. Выразите путь, равный 500 см, в метрах.

- а) 50 м.** **в) 0,5 м.**
б) 5 м. **г) 0,05 м.**



2. Итоговый тест



5. Определите скорость (в м/мин) корабля-атомохода во льдах, если за час он продвигается вперед на 0,3 км.

а) 0,5 м/мин.

в) 50 м/мюн.

б) 5 м/мин.

г) 500 м/мин.



6. Найдите среднюю скорость (в м/с) лыжника, с которой он проехал 30 км, если первые 10 км он преодолел за 12 мин., а оставшиеся 20 км – за 28 мин.

а) 12,5 м/с.

в) $13,5 \text{ м/с}$.

6) 13 м/с.

г) 14 м/с.



7. Рассчитайте путь, пройденный моторной лодкой за 40 мин., если она двигалась со скоростью 30 км/ч.

a) 75 км.

в) 12 км.

6) 120 км.

г) 20 км.



8. Через сколько времени акула приплывет к берегу, если она находится от него на расстоянии 8 км и ее скорость равна 40 км/ч?

а) 24 мин.

в) 12 мин.

6) 2 ч.

г) 0,5 ч.



9. Известно, что грузовик ехал 2 ч со средней скоростью 50 км/ч. Какой путь он проехал за это время?

я) 25 км.

6) 100 км.

В) 125 км.

г) 150 км.




10. На рисунке представлен график зависимости пути, пройденного телом, от времени. Найдите по нему, какой путь прошло тело за 6 с.

а) 30 м.


6) 25 M.

В) 40 м.

г) 35 м.



11. Какой из двух графиков, представленных на рисунке, относится к неравномерному движению тела?



- а) 1. в) Оба графика.
б) 2. г) Никакой.

☒	☐
2	
6	
B	
J	

12. Движение какого из перечисленных тел можно считать движением по инерции?

- Лыжника, спускающегося с горы.
- Дельфина, выпрыгивающего из воды.
- Пули, летящей в мишень.
- Никакого.

	☒
а	
б	
в	
г	

13. При взаимодействии тел одно из них, придя в движение, прошло до остановки 0,5 м, а другое – 1,5 м. Какое из них менее инертно?

- а) Первое.
- б) Второе.
- в) Инертность тел одинакова.
- г) Ответ требует дополнительных данных.

	☒
А	☐
Б	☐
В	☐
Г	☐

14. Масса ящика с коробками сахара-рафинада 24 кг. Выразите ее в граммах.

- а) 240 г.** **в) 24000 г.**
б) 2400 г. **г) 240000 г.**

☒	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

15. Плотность вещества – физическая величина, показывающая...

- а) ...близко или далеко друг от друга расположены молекулы.
б) ...быстроту движения молекул.
в) ...массу тела.
г) ...массу 1 м³ вещества.

	☒
а	
б	
в	
г	

16. Плотность вещества какого из этих шаров наибольшая, если их объемы одинаковы?



- а) № 1.
б) № 2.
в) № 3.
г) Данных недостаточно для ответа.

☒	☐
2	
6	
B	
T	




17. Рассчитайте плотность фарфора, если его кусок объемом $0,02 \text{ м}^3$ имеет массу 46 кг.

- а) 2300 кг/м³. в) 9200 кг/м³.
б) 230 кг/м³. г) 920 кг/м³.




18. Вычислите плотность вещества, из которого сделан инструмент. Его объем 7000 см^3 , масса $59,5 \text{ кг}$.

- а) 85 кг/м³.** **в) 850 кг/м³.**
б) 8500 кг/м³. **г) 8,5 кг/м³.**



19. Какова масса куска парафина объемом $0,0003 \text{ м}^3$?

- а) 270 г.** **в) 2,7 кг.**
б) 27 г. **г) 27 кг.**



20. Найдите объем соснового бревна массой 54 кг.

- а) 135 м^3 . в) $1,35 \text{ м}^3$.
б) $13,5 \text{ м}^3$. г) $0,135 \text{ м}^3$.

Вариант III



1. Девочка с мамой сидят на скамейке в парке около пруда. Относительно каких тел они движутся?

- а) Людей, гуляющих в парке. в) Воды в пруду.
б) Лежащей на земле собаки. г) Среди ответов нет верного.



2. По криволинейной траектории движется ...


- а) ...человек, поднимающийся по одному из пролетов лестницы.
б) ...лодка на озере, которую только что оттолкнули от берега.
в) ...плот, несомый течением горной реки.
г) [Правильного ответа здесь нет.]



3. Какое движение называют равномерным?

- а) При котором скорость тела увеличивается равномерно.
б) То, при котором скорость увеличивается медленно.
в) Во время которого скорость тела медленно уменьшается.
г) При котором скорость тела постоянна.

4. Выразите путь, равный 0,07 км, в сантиметрах.
 а) 7 см. в) 700 см.
 б) 70 см. г) 7000 см.
5. Какова скорость (в м/с) равномерно дующего ветра, если за полминуты воздушный поток перемещается на 0,36 км?
 а) 18 м/с. в) 6 м/с.
 б) 12 м/с. г) 3 м/с.
6. Определите среднюю скорость конькобежца, прошедшего дистанцию 18 км так, что на 10 км ему потребовалось 10 мин., а на оставшиеся 8 км – 15 мин.
 а) 10 м/с. в) 12 м/с.
 б) 11 м/с. г) 13 м/с.
7. Найдите путь, который пролетел вертолет за 50 мин со скоростью 300 км/ч.
 а) 60 км. в) 500 км.
 б) 600 км. г) 250 км.
8. Через сколько минут мотоциклист вернется из соседнего села, которое находится на расстоянии 15 км, если он будет ехать туда и оттуда со скоростью 100 км/ч?
 а) 9 мин. в) 15 мин.
 б) 12 мин. г) 18 мин.
9. Расстояние 2,5 км человек прошел со средней скоростью 5 км/ч. Сколько времени он шел?
 а) 10 мин. в) 30 мин.
 б) 20 мин. г) 40 мин.
10. На рисунке изображен график зависимости пути, пройденного телом, от времени. С какой скоростью двигалось это тело?



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	


2. Итоговый тест



а	
б	
в	
г	

11. По графикам зависимости скорости от времени установите, какой из них относится к неравномерному движению тела.

- а) 1.
б) 2.
в) Оба графика.
г) Никакой.



а	
б	
в	
г	

12. Какое из названных тел движется по инерции?

- а) Снежная лавина.
б) Поезд, едущий с постоянной скоростью.
в) Футбольный мяч в промежутках между ударами по нему.
г) Среди ответов нет верного.



а	
б	
в	

13. В результате взаимодействия две тележки пришли в движение. Одна из них откатилась на 60 см, другая откатилась на столько же в противоположную сторону. Какая из них более инертна?

- а) Первая.
б) Вторая.
в) Их инертности одинаковы.



а	
б	
в	
г	

14. Основная единица массы в СИ...

- а) ...килограмм (кг).
б) ...грамм (г).
в) ...миллиграмм (мг).
г) ...тонна (т).



а	
б	
в	
г	

15. Какая физическая величина позволяет сравнивать вещества по их массе?

- а) Размер тела.
б) Объем.
в) Плотность вещества.
г) Среди ответов нет верного.



а	
б	
в	
г	

16. Массы шаров, показанных на рисунке, одинаковы. У какого из них плотность вещества наибольшая?



- а) № 1.
б) № 2.
в) № 3.
г) Для ответа нужны дополнительные данные.

17. Какова плотность асфальта, если 4 м^3 этого вещества имеют массу 8 т ?

а) 1200 кг/м^3 .

в) 1800 кг/м^3 .

6) 1500 кг/м^3 .

г) 2000 кг/м^3 .

18. Найдите плотность вещества, если его кусок объемом 800 см^3 имеет массу $2,16 \text{ кг}$.

в) 2.7 кг/м^3 .

 $\rho = 270 \text{ кг/м}^3$.

6) 27 кг/м^3 .

г) 2700 кг/м^3 .

19. Определите массу кирпичной кладки объемом $0,25 \text{ м}^3$.

a) 250 кг

В) 450 кг.

б) 400 кг.

г) 500 кг.

20. Вычислите объем стога сена, если его масса равна 450 кг, а плотность сена 100 кг/м^3 .

a) 4.5 m^3 .

В) 45 м^3 .

6) 0.45 м^3 .

г) 450 м^3 .

Вариант IV

1. Относительно каких тел пассажир летящего самолета находится в покое?

а) Облакон.

в) Самолета.

б) Звезд.

г) Солнца.

2. По прямолинейной траектории движется...

а) ...лнса, убегающая от гонящейся за ней собаки.

б) ...самолет на вираже.

в) ...велосипедист, поворачивающий за угол.

г) Среди ответов нет верного.

3. Каков главный признак равномерного движения?

а) Постоянство скорости на всех участках пути.

б) Плавность всех изменений движения.

в) Медленность движения в любые промежутки времени.


г) Нет такого признака.

2. Итоговый тест



4. Выразите путь, равный 8 м, в километрах.

- а) 0,8 км.
б) 0,08 км.
в) 0,008 км.
г) 0,0008 км.



5. Вычислите скорость равномерно бегущего человека, преодолевающего путь $s = 1,8$ км за 10 мин.

- а) 180 м/с.** **в) 30 м/с.**
б) 18 м/с. **г) 3 м/с.**



6. Найдите среднюю скорость человека, который первые 50 м 100-метровой дистанции прошёл за 45 с, а вторые – за 55 с.

- а) 0,9 м/с.** **в) 1,1 м/с.**
- б) 1 м/с.** **г) 1,2 м/с.**



7. Определите путь, пройденный поездом метрополитена за 3 мин на перегоне, где он двигался с постоянной скоростью 90 км/ч.

- а) 4,5 км.**
- б) 30 км.**
- в) 3 км.**
- г) 27 км.**



8. Сколько времени затратит рыбак, чтобы на моторной лодке пересечь озеро шириной 2 км со скоростью 25 км/ч?

- а) 50 мин.** **в) 4,8 мин.**
б) 4 мин. **г) 5 мин.**




9. Перелетая с ветки на ветку, воробей перемещался со средней скоростью 2 км/ч. За какое время он преодолел расстояние 100 м?

- а) 50 с.
б) 200 с.
- в) 3 мин.
г) 6 мин.




10. По приведенному здесь графику зависимости пути от времени найдите расстояние, пройденное телом за 15 с.

- а) 100 м.
б) 150 м.
в) 175 м.
г) 200 м.



11. Какой из этих графиков зависимости скорости тела от времени свидетельствует о равномерном движении?



- а) 1.
б) 2.
в) Оба графика.
г) Никакой.

12. Движение какого из перечисленных тел происходит по инерции?

- а) Летящей в небе птицы.
б) Вагона поезда.
в) Хоккейной шайбы на льду в промежутках между ударами по ней.
г) Моторной лодки, плывущей с постоянной скоростью.

13. Какая из взаимодействующих тележек более инертна, если, придя в движение, первая из них прошла до остановки путь 75 см, а вторая – 25 см?

- а) Первая.
б) Вторая.
в) Их инертности одинаковы.
г) Без дополнительных данных ответить на вопрос нельзя.

14. Какая физическая величина характеризует инертность тела?

- а) Время, прошедшее после взаимодействия тела до его остановки.
б) Масса тела.
в) Его объем.
г) Среди ответов нет правильного.

15. Масса 1 м^3 меди 8900 кг. Какова ее плотность?

- а) 89 кг/м^3 .
б) 890 кг/м^3 .
в) 8900 кг/м^3 .
г) 89000 кг/м^3 .

16. Объемы показанных на рисунке шаров одинаковы. Вещество какого из них обладает наименьшей плотностью?



- а) №1.
б) №2.
в) №3.
г) Среди ответов нет верного.

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

2. Итоговый тест



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

17. Определите плотность снега, если известно, что 3,6 т его занимают объем 9 м³.

а) 0,4 кг/м³.

в) 40 кг/м³.

б) 4 кг/м³.

г) 400 кг/м³.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

18. Какова плотность вещества плиты объемом 1200 см³, если ее масса 2,76 кг?

а) 2300 кг/м³

в) 23 кг/м³

б) 230 кг/м³

г) 2,3 кг/м³.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

19. Рассчитайте массу медной детали, объем которой 0,00002 м³.

а) 17,8 кг.

в) 178 г.

б) 1,78 кг.

г) 17,8 г.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

20. Найдите объем бензина, вылитого в канистру, если его масса равна 3,55 кг.

а) 5 л.

в) 6 л.

б) 5,5 л.

г) 6,5 л.

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (ЧАСТЬ 2)

Сила. Явление тяготения. Сила тяжести



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

1. Каков смысл термина «сила»?

- а) Это действие на тело окружающей среды.
- б) Действие на тело другого тела, меняющее его скорость.
- в) Изменяющее форму тела действие на него другого тела.
- г) Это термин, заменяющий во всех случаях взаимодействия тел слова «действие другого тела».



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

2. Что называют деформацией тела?

- а) Прогиб тела при ударе по нему.
- б) Изменение формы тела при его растяжении.
- в) Уменьшение объема тела при сжатии.
- г) Любое изменение формы и размера тела.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

3. От чего зависит результат действия силы?

- а) От точки ее приложения.
- б) От ее направления.
- в) От ее числового значения (модуля).
- г) От всех этих характеристик силы.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

4. Что такое всемирное тяготение?


- а) Притяжение планет к Солнцу.
- б) Притяжение планет друг к другу.
- в) Притяжение всех тел друг к другу.
- г) Притяжение всех тел к Земле.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

5. В вершинах равностороннего прямоугольного треугольника находятся одинаковые шары. На какой из них действуют равные силы притяжения?

- а) № 1.
- б) № 2.
- в) № 3.
- г) На все шары действуют равные силы притяжения.




6. Какую силу называют силой тяжести?

- а) Силу, которая деформирует тела.
- б) Силу, которая изменяет скорость падающего на землю тела.
- в) Силу, с которой Земля притягивает к себе тела.
- г) Силу, с которой тела притягивают Землю.

☒

а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

7. На какое из показанных на рисунке тел действует наибольшая сила тяжести?



- а) № 4.
- б) № 3.
- в) № 2.
- г) № 1.

☒

а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

8. Где сила тяжести больше – на вершине горы, у подножия, в середине спуска?

- а) На вершине.
- б) У подножия.
- в) В середине спуска.
- г) Она уменьшается по мере спуска с горы.

☒

а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

9. На столе лежат несколько гвоздиков, кнопка, ластик, карандаш. На какие из этих тел действуют одинаковые силы тяжести?



- а) На ластик и карандаш.
- б) На гвоздики.
- в) На кнопку и карандаш.
- г) На все эти тела.

☒

а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

Сила упругости. Закон Гука

1. Когда возникает сила упругости?

- а) Когда тело движется.
- б) Когда оно останавливается.
- в) Когда тело деформируется.
- г) Когда оно распрямляется.

☒

а	☐
б	☐
в	☐
г	☐



2. Какое тело испытывает деформацию растяжения?



№1



№2



№3




№4

- а) № 1 (хлопья под прессом). в) № 3 (скамейка).
б) № 2 (подвес люстры). г) № 4 (стол).



3. Если тело (опора) деформируется под действием груза (см. рис.), то когда модуль силы упругости становится равным модулю силы тяжести, действующей на груз?




- а) Когда опора начинает прогибаться.
б) Когда, прогнувшись, опора перестает деформироваться.
в) Когда при снятии груза опора начинает выпрямляться.
г) Такого равенства не бывает.




4. В каком из изображенных на рисунке случаев сила упругости отсутствует (равна нулю)?



№1



№2



№3

- а) № 1 (мяч с вмятиной).
б) № 2 (доска, перекинута через ручей).
в) № 3 (пружина с грузом).
г) Нет такого случая.



5. Какая из приведенных формул соответствует закону Гука?

- а) $F = k\Delta\ell$.
б) $m = \rho V$.
в) $s = vt$.



6. От чего зависит сила упругости?

- а) От модуля силы, деформирующей тело.
б) От деформации.
в) От жесткости деформируемого тела.
г) От всех этих величин.

7. При каких деформациях справедлив (выполняется) закон Гука?

- а) При сжатии и растяжении.
- б) При изгибе и кручении.
- в) При всех видах деформаций.
- г) При всех деформациях, если они – упругие деформации.

☒	
а	
б	
в	
г	

Вес тела


1. Вес тела – это сила, с которой ...

- а) ...тело притягивается к Земле.
- б) ...на него действует другое тело.
- в) ...его удерживает опора.
- г) ...оно, притягиваясь к Земле, действует на опору.

☒	
а	
б	
в	
г	

2. Какие силы изображены на рисунке буквами


$\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$?



- а) $\vec{F}_1$ – сила тяжести, $\vec{F}_2$ – сила упругости.
- б) $\vec{F}_1$ – сила тяжести, $\vec{F}_2$ – вес.
- в) $\vec{F}_1$ – сила упругости, $\vec{F}_2$ – вес.
- г) $\vec{F}_1$ – сила упругости, $\vec{F}_2$ – сила тяжести.

☒	
а	
б	
в	
г	


3. В каких случаях силы, действующие на тела, изображенные на рисунке, обозначены правильно?



- а) № 3.
- б) № 1 и № 2.
- в) № 2 и № 3.
- г) № 1 и № 4.


☒	
а	
б	
в	
г	

7. У какого камня, масса каждого из которых 4 кг, вес обозначен на рисунке правильно?



- а) № 1. в) № 3.
б) № 2. г) № 4.

8. Одинаковые коробки имеют массу 3 кг каждая. У какой из них сила тяжести обозначена правильно?



- а) № 1. в) № 3.
б) № 2. г) № 4.

9. Какова масса коробки продуктов, если на нее действует сила тяжести, равная 500 Н.


- а) 250 кг. в) 50 кг.
б) 500 кг. г) 5000 кг.

10. Найдите массу ящика, вес которого 600 Н.

- а) 60 кг. в) 6 кг.
б) 600 кг. г) 6000 кг.

11. Какова цена деления шкалы изображенного здесь динамометра? Каков вес груза?

- а) 10 Н; 120 Н.
б) 10 Н; 110 Н.
в) 5 Н; 120 Н.
г) 20 Н; 120 Н.



12. Определите цену деления шкалы динамометра. Какова сила тяжести, действующая на груз?

- а) 1 Н; 9Н.
б) 10 Н; 9 Н.
в) 0,5 Н; 9 Н.
г) 0,5 Н; 10 Н.



☒

а	
б	
в	
г	

☒

а	
б	
в	
г	

☒

а	
б	
в	
г	

☒

а	
б	
в	
г	

☒

а	
б	
в	
г	

☒

а	
б	
в	
г	

Сложение двух сил, направленных по одной прямой



1. Две силы – 15 Н и 45 Н – направлены по одной прямой в одну сторону. Чему равна и как направлена равнодействующая этих сил?

а) 30 Н; в ту же сторону, что и составляющие силы.
 б) 60 Н; в сторону, противоположную составляющим силам.
 в) 90 Н; в ту сторону, куда направлены составляющие силы.
 г) 60 Н; в одну сторону с составляющими силами.




2. Силы 75 Н и 50 Н направлены по одной прямой в противоположные стороны. Как направлена и каков модуль результирующей силы?

а) 25 Н; в сторону меньшей силы.
 б) 25 Н; в сторону большей силы.
 в) 125 Н; в сторону большей силы.
 г) 125 Н; в сторону меньшей силы.





3. Каким будет показание динамометра, если на его диск положить еще один такой же груз? Модуль какой силы измерит этот прибор?

а) 20 Н; равнодействующей веса двух грузов.
 б) 25 Н; равнодействующей сил тяжести, действующих на грузы.
 в) 30 Н; равнодействующей веса грузов.
 г) 30 Н; равнодействующей сил тяжести, действующих на грузы.




4. Как должны расположиться стрелки на шкалах динамометров, измеряющих равнодействующие сил, приложенных к ним в случаях а и б?

а) а) 70 Н, б) 30 Н.
 б) а) 70 Н, б) 70 Н.
 в) а) 30 Н, б) 30 Н.
 г) а) 30 Н, б) 70 Н.



5. Правильны ли показания динамометров № 1 и № 2?

- а) Правильны.
б) Неправильны.
в) У № 1 правильны, у № 2 – неправильны.
г) У № 1 неправильны, у № 2 – правильны.



а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

6. Чему равна равнодействующая сил $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$? Как будет двигаться шар под действием этих сил (без учета трения)?



- а) $R = F_1 + F_2$, скорость шара будет увеличиваться.
б) $R = F_1 - F_2$, его скорость станет уменьшаться.
в) $R = F_1 - F_2 = 0$, шар будет двигаться по инерции.
г) $R = F_1 - F_2 = 0$, шар остановится.

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

Сила трения

1. Какую силу называют силой трения?

- а) Силу взаимодействия между телами.
б) Силу, которая препятствует движению тела.
в) Силу взаимодействия поверхностей тел, которая препятствует их относительному движению.
г) Силу взаимодействия между телами, которая останавливает движущееся тело.

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

2. Почему возникает сила трения?

- а) Потому что поверхности тел шероховатые.
б) Потому что молекулы соприкасающихся тел притягиваются друг к другу.
в) Потому что по закону всемирного тяготения тела притягиваются друг к другу.
г) Потому что шероховатости поверхностей тел зацепляются друг за друга, а молекулы, находящиеся на поверхностях, притягиваются.

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

II. Взаимодействие тел (часть 2)




3. Какие существуют силы трения?

- а) Трения скольжения.
- в) Трения покоя.
- б) Трения качения.
- г) Все названные виды.




4. В каких случаях, представленных здесь, возникает сила трения качения?



- а) № 1 и № 2.
- в) № 2 и № 3.
- б) № 3 и № 4.
- г) № 1 и № 4.



5. Какие тела из изображенных на рисунке испытывают трение скольжения?



- а) № 1 и № 2.
- в) № 2 и № 3.
- б) № 3 и № 4.
- г) № 1 и № 4.



6. При каком виде трения тел возникает наименьшая сила трения?

- а) При трении качения.
- б) В случае трения скольжения.
- в) При трении покоя.
- г) При всех видах трения силы одинаковы.



7. Как можно уменьшить трение?

- а) Смазать поверхности соприкасающихся тел.
- б) Прижать тела друг к другу.
- в) Сгладить поверхности.
- г) Отполировать поверхности.

8. При каком условии силу трения скольжения бруска можно измерить динамометром?



☒	
а	
б	
в	
г	

- а) В случае быстрого перемещения бруска.
- б) Если брусок двигать медленно.
- в) Если рывком сдвинуть брусок с места.
- г) При условии равномерного движения бруска.

9. Трение вредно, когда...

☒	
а	
б	
в	
г	

- а) ...конвейер перемещает детали.
- б) ...автомобиль едет по скользкой дороге.
- в) ...нож режет овощи.
- г) ...ластик стирает написанное.

10. Трение полезно в случае...

☒	
а	
б	
в	
г	

- а) ...шитья одежды.
- б) ...работы механизмов с движущимися частями.
- в) ...вбивания в стены гвоздей для подвешивания картин.
- г) ...хождения по линолеуму у плиты в кухне.

3. Итоговый тест (тема «Силы»)

Вариант I

1. Какое явление происходит с резиновым жгутом, когда, взяв его за концы, разводят руки в стороны?

☒	
а	
б	
в	
г	

- а) Деформация сжатия.
- б) Деформация кручения.
- в) Деформация растяжения.
- г) Деформация изгиба.

2. В каком случае говорят, что на тело действует сила?

☒	
а	
б	
в	
г	

- а) Когда на тело действует человек.
- б) Когда тело приводит в движение двигатель.
- в) В случае действия на него такого же тела.
- г) Когда происходит любое взаимодействие тела с другими телами.

3. Итоговый тест



а	
б	
в	

3. Всемирным тяготением называют тяготение потому, что...

- а) ... все тела в мире притягиваются друг к другу.
- б) ... все планеты Солнечной системы притягиваются друг к другу.
- в) ... Солнце притягивает к себе все планеты.



а	
б	
в	
г	

4. Как тяготение тел зависит от их массы?

- а) Не зависит.
- б) Чем больше масса тел, тем их притяжение друг к другу меньше.
- в) Чем больше массы тел, тем сильнее их притяжение.
- г) Здесь нет верного ответа.



а	
б	
в	
г	

5. Силой тяжести называют силу, с которой...

- а) ... тело притягивает Землю.
- б) ... тело притягивается Землей.
- в) ... тело притягивается Солнцем.
- г) ... тело взаимодействует с другими телами.



а	
б	
в	

6. Где сила тяжести, действующая на тела, будет больше – на полюсе или на экваторе?

- а) На экваторе.
- б) На полюсе.
- в) Она одинакова.



а	
б	
в	
г	

7. Какое явление вызывает возникновение силы упругости?

- а) Притяжение тел Землей.
- б) Всемирное тяготение.
- в) Инерция.
- г) Деформация.



а	
б	
в	
г	

8. Какая формула выражает закон Гука?

- а) $F = gm$.
- б) $m = \rho V$.
- в) $F = k\Delta l$.
- г) $P = F_{\text{тяж}}$.



а	
б	
в	
г	

9. Для какой из указанных здесь деформаций применим закон Гука?

- а) Ударом молотка расплюсчен кусочек свинца.
- б) Под тяжестью подвешенного груза пружина растянулась, а когда груз сняли, не сжалась до прежнего состояния.
- в) Пружину сжали, а потом отпустили, и она вернулась к исходному состоянию.
- г) При забивании гвоздя он согнулся.

10. Какую силу называют весом?


- а) С которой тело действует на опору или подвес.
- б) С которой тело притягивается к Земле.
- в) С которой опора действует на находящееся на ней тело.
- г) Среди ответов нет правильного.



а	
б	
в	
г	

11. На каком из рисунков буква F обозначает вес тела?

- а) № 1.
- б) № 2.
- в) № 3.
- г) Нет такого рисунка.



а	
б	
в	
г	

12. Какую физическую величину измеряют в ньютонах?

- а) Плотность вещества.
- б) Силу.
- в) Массу тела.
- г) Его объем.



а	
б	
в	
г	

13. Вычислите силу тяжести, действующую на ящик массой 20 кг.


- а) 2 Н.
- б) 20 Н.
- в) 200 Н.
- г) 100 Н.



а	
б	
в	
г	

14. Определите вес цилиндрика по приведенному рисунку.

- а) 120 Н.
- б) 102 Н.
- в) 98 Н.
- г) 125 Н.



а	
б	
в	
г	

15. Динамометр, изображенный на рисунке, показывает вес цилиндрика, равный...


- а) 0,5 Н.
- б) 9 Н.
- в) 8,5 Н.
- г) 9,5 Н.



а	
б	
в	
г	

	
A	☐
B	☐
C	☐
D	☐


16. Силы, действующие на камень, показаны на рисунке. Какова их равнодействующая сила?



- a) 8 H.** **б) 25 H.**
6) 9 H. **г) 2 H.**

	☒
а	
б	
в	
г	

- 17. Найдите равнодействующую сил.**



- a) 4 H.** **b) 12 H.**
б) 8 H. **г) 24 H.**

☒	☐
А	
Б	
В	
Г	

- 18. Какая сила останавливает санки, скатывающиеся с горки?**

- а) Сила тяжести. в) Сила трения.
б) Вес. г) Сила упругости.

	☒
A	
B	
C	
D	

- 19. При каком виде трения сила трения наименьшая?**

- д) Тренни покоя. в) Тренни скольжения.
б) Тренни качения. г) Сила трения всегда одинакова.

	☒
A	
B	
C	

- ## 20. Смазка поверхностей...

- а) ... увеличивает силу трения. в) ... не изменяет силу трения.
б) ... устраняет трение. г) ... уменьшает силу трения.

Вариант II

☒	☐
А	
Б	
В	
Г	

1. Человек надавливает на надувной матрац. Какое явление происходит при этом?

- а) Деформация растяжения. в) Деформация кручения.
б) Деформация сжатия. г) Деформация изгиба.

а	
б	
в	
г	

2. Слово «сила» обозначает, что...

- а) ... тело взаимодействует с другим движущимся телом.
- б) ... на тело действует такое же тело.
- в) ... происходит любое взаимодействие тела с другими телами.
- г) ... на тело действуют другие тела.

3. Тяготение называют всемирным потому, что...
- ... все тела притягиваются к Земле.
 - ... все тела притягиваются друг к другу.
 - ... все планеты притягиваются к Солнцу.
 - ... все планеты притягиваются друг к другу.
4. Как притяжение тел зависит от расстояния между ними?
- Не зависит.
 - Чем больше расстояние, тем притяжение слабее.
 - Чем меньше расстояние, тем притяжение слабее.
5. Сила тяжести – это сила, с которой...
- ...Земля притягивает все тела.
 - ... Солнце притягивает планеты.
 - ... Солнце притягивает Землю.
 - ... звезды притягивают Солнце.
6. Человек или корабль должен испытывать большую силу тяжести?
- Человек.
 - Корабль.
 - Силы тяжести будут одинаковы.
 - Среди ответов нет верного.
7. В какой момент сила упругости становится равной нулю?
- Когда исчезает деформация.
 - Когда деформация тела делается максимальной.
 - Когда тело начинает деформироваться.
 - Когда оно начинает восстанавливать свою форму и размер.
8. Сила упругости по закону Гука равна...
- $F_{уп} = F_{тяж}$.
 - $s = vt$.
 - $m = \rho V$.
 - $F = k\Delta l$.
9. В учебнике сказано, что закон Гука выполняется только при упругих деформациях. Какие это деформации?
- Очень малые.
 - Очень большие.
 - Такие, при которых тело после снятия нагрузки принимает исходные размеры и форму.
 - Такие, при которых тело не разрушается.



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	

3. Итоговый тест



10. Вес – это сила, с которой...

- а) ... тело притягивается к Земле.
- б) ... тело, притягиваясь к Земле, действует на опору или подвес.
- в) ... деформированная опора действует на тело.
- г) Правильного ответа нет.



11. На каком из рисунков буква F обозначает действующую на тело силу тяжести?

- а) № 1.
- б) № 2.
- в) № 3.
- г) Нет такого рисунка.



12. Ньютон – это единица измерения...

- а) ... массы.
- б) ... плотности.
- в) ... площади поверхности.
- г) ... силы.




13. Определите силу тяжести, действующую на тело, масса которого 500 г.

- а) 0,5 Н.
- б) 5 Н.
- в) 50 Н.
- г) 500 Н.




14. Узнайте по показаниям изображенного здесь динамометра, какая сила приложена к бруску для его перемещения.

- а) 3 Н.
- б) 2 Н.
- в) 1,5 Н.
- г) 2,5 Н.



15. Какой вес груза показывает представленный на рисунке динамометр?

- а) 70 Н.
- б) 10 Н.
- в) 20 Н.
- г) 15 Н.



16. На коробку, поставленную на полку, действует сила тяжести, равная 60 Н, и сила упругости со стороны полки. Чему равна их равнодействующая сила?

- а) 60 Н.
- б) 120 Н.
- в) 0 Н.
- г) Ответить нельзя, так как не указан модуль силы упругости.

3. Итоговый тест



а	
б	
в	
г	

3. Всемирное тяготение — это....

- а) ... притяжение всех тел к Земле.
- б) ... притяжение всех планет друг к другу.
- в) ... притяжение всех небесных тел друг к другу.
- г) ... взаимное притяжение всех тел Вселенной.



а	
б	
в	
г	

4. Расстояние между телами уменьшилось. Как изменилось их притяжение друг к другу?

- а) Осталось прежним.
- б) Увеличилось.
- в) Уменьшилось.
- г) Сначала увеличилось, потом уменьшилось.



а	
б	
в	
г	

5. Силой тяжести называют силу, с которой...

- а) ... все тела притягиваются Землей.
- б) ... Солнце притягивает к себе Землю.
- в) ... Солнце притягивает планеты.
- г) ... все тела в мире притягиваются друг к другу.



а	
б	
в	
г	

6. На кого из альпинистов будет действовать большая сила тяжести: 1) на того, кто начинает восхождение, или 2) на того, кто уже достиг вершины?

- а) 1.
- б) 2.
- в) Различия сил тяжести не будет.
- г) Среди ответов нет верного.



а	
б	
в	
г	

7. В какой момент сила упругости достигает максимального значения?

- а) Когда тело начинает деформироваться.
- б) Когда деформация становится самой большой.
- в) Когда тело восстанавливает свой объем и форму.
- г) Когда деформация исчезает.



а	
б	
в	
г	

8. Согласно закону Гука силу упругости вычисляют по формуле...

- а) $F = gm$.
- б) $s = v_{\text{ф}} t$.
- в) $F_{\text{тяг}} = P$.
- г) $F = k \Delta \ell$.

9. В каком из названных случаев закон Гука применять нельзя?

- а) На резинке прыгает вверх-вниз детский шарик.
- б) Ребенок дергает разноцветную гибкую игрушечную пружину.
- в) После снятия груза витки пружины остались растянутыми.
- г) Такой случай здесь не назван.

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐


10. Почему сила тяжести и вес не уравновешивают друг друга?

- а) Потому что они не равны.
- б) Потому что действуют в одном направлении.
- в) Потому что приложены к разным телам.
- г) Правильного ответа нет.

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

11. На каком рисунке буква $\vec{F}$ обозначает силу упругости?

- а) № 1.
- б) № 2.
- в) № 3.
- г) Нет такого рисунка.



а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

12. В каких единицах измеряют силу?

- а) Килограммах (кг).
- б) Километрах (км).
- в) Метрах (м).
- г) Ньютонах (Н).

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐


13. Определите силу тяжести, действующую на канистру массой 8 кг.

- а) 0,8 Н.
- б) 8 Н.
- в) 80 Н.
- г) 800 Н.

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

14. По показаниям динамометра, изображенного на рисунке, узнайте, какая сила тяжести действует на диск.

- а) 18 Н.
- б) 15,5 Н.
- в) 17 Н.
- г) 17,5 Н.



а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

3. Итоговый тест

☒

а	
б	
в	
г	

15. Каков вес тела?

- а) 40 Н.
- б) 50 Н.
- в) 45 Н.
- г) 41 Н.



☒

а	
б	
в	
г	

16. Кирпич поднимают, приложив силу 15 Н. Сила тяжести, действующая на него, равна 10 Н. Какова равнодействующая этих сил?

- а) 25 Н.
- б) 5 Н.
- в) 50 Н.
- г) 250 Н.

☒

а	
б	
в	
г	

17. На шар действуют две силы, показанные на рисунке: $F_2 = 60$ Н и $F_1 = 20$ Н. Чему равна их равнодействующая сила?



- а) 40 Н.
- б) 60 Н.
- в) 120 Н.
- г) 80 Н.

☒

а	
б	
в	

18. Какая сила останавливает автомобиль, когда двигатель выключен?

- а) Вес.
- б) Сила тяжести.
- в) Сила трения.

☒

а	
б	
в	
г	

19. При каком виде трения возникает наибольшая сила трения?

- а) Трению скольжения.
- б) Трению качения.
- в) Трению покоя.
- г) Эти силы трения примерно одинаковы.

☒

а	
б	
в	
г	

20. По поверхности стола катятся шарики, на которые действуют силы тяжести, равные: 1) 0,1 Н; 2) 0,3 Н; 3) 0,5 Н. На какой из них действует наименьшая сила трения?

- а) 1.
- б) 2.
- в) 3.
- г) Силы трения в этих случаях одинаковы.

Вариант IV

1. Тонкие проволочки свивают в жгут. Какое явление происходит с ними при этом?

- а) Деформация изгиба. в) Деформация сжатия.
б) Деформация растяжения. г) Деформация кручения.

✓

а	
б	
в	
г	

2. Термин «сила» используют для краткого обозначения того, что...

- а) ... на тело действует любое другое тело.
б) ... на него не действуют никакие другие тела.
в) ... при взаимодействии с другими телами оно движется.
г) ... в результате взаимодействия с окружающими телами оно оста-
навливается.

✓

а	
б	
в	
г	

3. Всемирное тяготение – это притяжение тел друг к другу. Оно зависит от...

- а) ... масс тел.
б) ... расстояния между ними.
в) ... скорости тел.
г) ... от расстояния между телами и их масс.

✓

а	
б	
в	
г	

4. В каком случае притяжение тел будет больше: 1) когда мимо друг дру-
га проплывают два корабля с грузом или 2) когда на таком же расстоя-
нии оказываются лодки с гребцами?

- а) 1. в) Оно будет одинаковым.
б) 2.

✓

а	
б	
в	

5. Сила тяжести – это сила, с которой...

- а) ... тело действует на опору.
б) ... Земля притягивает тело.
в) ... другие тела притягивают данное тело.
г) ... тело притягивает другие тела.

✓

а	
б	
в	
г	

6. Где на корабль будет действовать большая сила тяжести – на полюсе
или на экваторе?

- а) На полюсе. в) Эта сила везде одинакова.
б) На экваторе.

✓

а	
б	
в	

3. Итоговый тест




7. При каком условии модули силы тяжести и силы упругости равны?
- а) Когда деформация мала.
 - б) При росте деформации.
 - в) Когда деформация и с ней сила упругости возрастают на столько, что сила упругости уравнивает силу тяжести.
 - г) При уменьшении нагрузки, вызывающей деформацию.



8. Чтобы определить силу упругости, надо воспользоваться законом Гука. Его выражает формула:
- а) $F_{\text{уп}} = F_{\text{тяг}}$
 - б) $P = F_{\text{тяг}}$
 - в) $F = gm$
 - г) $F = k\Delta l$




9. Какие деформации называют упругими?
- а) Такие, при которых тело разрушается.
 - б) Те, после которых тело возвращается к начальным размерам и форме.
 - в) Которые вызывают сохраняющееся изменение формы тела.
 - г) Которые вызывают не исчезающее со временем изменение объема тела.



10. Как вес зависит от массы тела?
- а) Чем больше масса тела, тем больше вес.
 - б) Чем меньше масса тела, тем больше вес.
 - в) Вес не зависит от массы тела.
 - г) Среди ответов нет правильного.



11. На каком рисунке буква $\vec{F}$ обозначает вес?
- а) № 1.
 - б) № 2.
 - в) № 3.
 - г) Нет такого рисунка.



12. В каких единицах измеряют силу?


- а) Килограммах и граммах. в) Ньютонах и килоньютонах.
б) Метрах и километрах. г) Нет верного ответа.

13. Найдите силу тяжести, действующую на вазу с цветами, если ее масса 1,5 кг.

- а) 1,5 Н. в) 150 Н.
б) 15 Н. г) 1500 Н.

14. Определите по изображенному на рисунке динамометру вес бруска.


- а) 1,6 Н.
б) 16 Н.
в) 160 Н.
г) 1600 Н.



15. В мешок досыпали 20 кг сахарного песка. Как изменился вес мешка?

- а) Увеличился на 20 Н. в) Увеличился на 200 Н.
б) Увеличился на 10 Н. г) Не изменился.


16. На ящик действуют силы $F_1 = 45$ Н и $F_2 = 30$ Н, показанные на рисунке. Какова их равнодействующая сила?



- а) 75 Н. в) 25 Н.
б) 50 Н. г) 15 Н.

17. Определите равнодействующую сил $F_1 = 30$ Н и $F_2 = 20$ Н, действующих на тележку.

- а) 50 Н. в) 20 Н.
б) 30 Н. г) 10 Н.



18. Какое явление служит причиной невозможности движения транспорта по инерции?

- а) Всемирное тяготение. в) Трение.
б) Притяжение к Земле. г) Действие сил тяжести и упругости.

☒	а	б	в	г
☒	а	б	в	г
☒	а	б	в	г
☒	а	б	в	г
☒	а	б	в	г
☒	а	б	в	г
☒	а	б	в	г


3. Итоговый тест

✓ ☒

а	
б	
в	

19. Какой вид трения действует при движении вагонетки?

- а) Трение скольжения.
- б) Трение качения.
- в) Трение покоя.



✓ ☒

а	
б	
в	
г	

20. В каком из названных случаев трение увеличивают?

- а) В замочную скважину капают масло.
- б) Заливают катки водой.
- в) На подошве зимней обуви делают бороздки.
- г) Полозья саник изготавливают гладкими.

III. ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (ЧАСТЬ 1)

Давление. Единицы давления




1. На столе находятся три бруска одинаковых размеров и массы. Какой из них давит на стол сильнее всего?

a) № 1.

B) № 3.

6) № 2.

г) Одинаково.




2. Площади опоры брусьев одинаковы. Какой из них давит на стол меньше всего?

a) № 1.

B) № 3.

6) № 2.

г) **Одинаково.**



3. По какой формуле рассчитывают давление твердого тела?

$$a) \quad p = \frac{F}{S}.$$
$$\text{B)} \quad m = \frac{P}{g}.$$
$$6) \quad v = \frac{s}{t}.$$
$$\Gamma) \quad \rho = \frac{m}{V}.$$


4. Какое давление принято за единицу давления?

а) 1 H/cm².

в) 1 кГц/см².

6) 1 кН/м^2 .

г) 1 H/m^2 .



5. Как называют единицу давления?

я) НЬЮТОН (Н).

в) Пескаль (Па).

6) Килограмм (кг).

г) У нее нет специального названия.



6. Выразите в паскалях давления, равные 100 Н/м^2 и 1.5 кПа .

а) 100 Па и 150 Па.

в) 100 Па и 1500 Па.

б) 10 Па и 150 Па.

г) 10 Па и 1500 Па.



7. Мальчика весом 400 Н везут на санках, площадь полозьев которых 0,06 м². Какое давление они оказывают на снег? Вес самих санок 20 Н.

а) 24 Па.

в) 700 Па.

б) 240 Па.

г) 7000 Па.

8. Определите давление, оказываемое на пол шкафом, вес которого 800 Н, а площадь поверхности одной его ножки 25 см².
- а) 32 кПа. в) 8 кПа.
б) 0,8 кПа. г) 80 кПа.
9. Вычислите давление, которое производит автомобиль массой 1,5 т на почву. Площадь соприкосновения с ней одного колеса машины 150 см².
- а) 250 кПа. в) 2,5 кПа
б) 25 кПа. г) 250 Па.
10. Давление тела на опору можно уменьшить, если...
- а) ... сделать его поверхность более гладкой.
б) ... увеличить площадь его опоры.
в) ... уменьшить площадь опоры.
г) ... уменьшить массу тела.

	
а	
б	
в	
г	

☒	☐
2	
5	
8	
Г	

	
я	
б	
в	
г	

Давление газа

1. В одинаковых сосудах находятся разные массы одного и того же газа. В каком из них плотность газа наибольшая, в каком — наибольшее давление?



№ 1



№ 2



№ 3

- а) № 2, № 3. б) № 2, № 1. в) № 2, № 2. г) № 3, № 2.

☒	☐
а	
б	
в	
г	

2. В сосудах разного объема заключен один и тот же газ. Его массы в сосудах одинаковы. В каком из них плотность газа наименьшая, в каком — наименьшее давление?



No 1



№ 2



№ 3

- а) № 2, № 2. б) № 2, № 3. в) № 2, № 1. г) № 3, № 2.

	
а	
б	
в	
г	

3. Давление газа при повышении температуры...
- а) ... не изменяется.
 - б) ... увеличивается.
 - в) ... уменьшается.
 - г) В зависимости от занимаемого газом объема иногда увеличивается, иногда уменьшается.

	
A	
B	
C	


3. Определите добавочные давления, производимые поршнем, на площадки № 1 и № 2. Поршень, поднимаясь, оказывает давление, равное 100 Па.



а	б
в	г

- а) На обе площадки оно одинаково и равно 100 Па.
 б) В этом случае добавочное давление не передается (равно 0).
 в) № 1 – 100 Па, № 2 – 50 Па.
 г) № 1 – 100 Па, № 2 – 0 Па.

4. Какие изображенные здесь опыты свидетельствуют о действии закона Паскаля?



а	б
в	г

- а) № 1 и № 2.
 б) № 1 и № 3.
 в) № 1 и № 4.
 г) № 3 и № 4.


Давление в жидкости и газе

1. Какая сила создает давление внутри жидкости и газа?

а	б
в	г

- а) Сила трения.
 б) Сила взаимодействия между молекулами.
 в) Сила упругости.
 г) Сила тяжести.


2. Нижние отверстия стеклянных трубок, наполненных водой так, как показано на рисунке, затянuty тонкой резиновой пленкой. Какая из пленок должна прогнуться меньше всего?



а	б
в	г

- а) № 1.
 б) № 2.
 в) № 3.

3. В каком из сосудов давление жидкости на уровне АВ наименьшее? (Поверхности жидкостей расположены на одном уровне.)




а	б
в	г

- а) № 1.
 б) № 2.
 в) № 3.
 г) № 4.



4. В два сосуда, показанные на рисунке, налили по 1 л воды. В каком из них резиновое дно прогнется больше?



- а) № 1.
б) № 2.
в) Прогиб будет одинаков.



5. От каких величин зависит давление в жидкости?

- а) Силы трения жидкости о стенки сосуда.
б) Объема жидкости.
в) Плотности жидкости.
г) Глубины, на которой измеряется давление.

Расчет давления жидкости



1. Формула, по которой рассчитывается давление жидкости или газа, — это...

а) $P = gm$.

в) $m = \rho V$.

б) $p = g\rho h$.

г) $P = \frac{F}{S}$.



2. В банку высотой 25 см доверху налито машинное масло. Какое давление оно оказывает на дно банки?

а) 2250 кПа.

в) 22,5 кПа.

б) 225 кПа.

г) 2,25 кПа.



3. Какая жидкость и на сколько больше давит на дно сосуда?

а) Керосин на 180 Па.

б) Керосин на 1,8 кПа.


в) Эфир на 180 Па.

г) Эфир на 1,8 кПа.



4. Каково давление воды на стенку сосуда в точках K и M ?

- а) $P_K = 100 \text{ Па}$, $P_M = 300 \text{ Па}$.
 б) $P_K = 1 \text{ кПа}$, $P_M = 3 \text{ кПа}$.
 в) $P_K = 10 \text{ кПа}$, $P_M = 1 \text{ кПа}$.
 г) $P_K = 1 \text{ кПа}$, $P_M = 10 \text{ кПа}$.



☒
а
б
в
г


5. Найдите давление воды на пластинку K снизу.

- а) 6 кПа.
 б) 0,6 кПа.
 в) 4 кПа.
 г) 0,4 кПа.



☒
а
б
в
г

6. Пластика № 1 находится на глубине 5 см от поверхности воды, а пластика № 2 на расстоянии 5 см от дна сосуда. На какую из них давление воды больше?



- а) № 1.
 б) № 2.
 в) Давления одинаковы.

☒
а
б
в


7. В воду опущен кубик, ребро которого равно 5 см, так, что его верхняя грань находится на глубине 50 см. Какое давление оказывает вода на верхнюю и нижнюю грани кубика?

- а) 5 кПа; 5,05 Па.
 б) 5 кПа; 5,25 кПа.
 в) 5 кПа; 5,1 кПа.
 г) 5 кПа; 5,5 кПа.

☒
а
б
в
г

8. На сколько давление машинного масла на верхнюю грань бруска меньше, чем на нижнюю?

- а) 1,8 кПа.
 б) 2,7 кПа.
 в) 0,9 кПа.
 г) 9 кПа.



☒
а
б
в
г

9. Какая сила действует на дно сосуда площадью 500 см^2 , если налитая в него жидкость производит на дно давление, равное 800 Па ?

- а) 80 Н.
 б) 400 Н.
 в) 40 Н.
 г) 4 Н.

☒
а
б
в
г

6. Резиновая трубка, соединяющая сосуды, перекрыта зажимом. Что произойдет с жидкостями, когда зажим будет снят?



- а) Уровни жидкостей не изменятся.
б) Уровень воды опустится, а эфира поднимется.
в) Уровень эфира опустится, а воды поднимется.
г) Среди ответов нет верного.




7. В какой паре сообщающихся сосудов – № 1 или № 2 – находится разнородная жидкость? В левый или правый сосуд этой пары налита более плотная жидкость?



- а) № 1; в левый. в) № 2; в правый.
б) № 2; в левый. г) № 1; в правый.



8. Известно, что в эти пары сообщающихся сосудов, кроме воды, налиты мед и масло. В какой паре – № 1 или № 2 – находится масло, и в каком именно сосуде – левом или правом?



- а) № 1; в левом. в) № 2; в левом.
б) № 1; в правом. г) № 2; в правом.




4. Итоговый тест

(темы «Давление», «Давление в жидкостях и газах», «Сообщающиеся сосуды»)

Вариант I

1. На полке стоят тела равной массы. Какое из них производит на нее наименьшее давление?



- а) № 1. в) № 3.
б) № 2. г) № 4.



4. Итоговый тест



а	
б	
в	
г	

2. Давление твердых тел рассчитывают по формуле...

а) $m = \frac{P}{g}$

в) $\rho = \frac{m}{V}$

б) $p = gph$

г) $p = \frac{F}{S}$



а	
б	
в	
г	

3. Как называют единицу давления и чему она равна?

а) Ньютон, 1 Н.

в) Паскаль, 1 Н/м².

б) Килограмм, 1 кг.

г) Километр, 1 км.



а	
б	
в	
г	

4. Выразите в паскалях давления 3000 Н/м² и 1,2 кПа.

а) 3000 Па, 1200 Па.

в) 30000 Па, 12000 Па.

б) 300 Па, 120 Па.

г) 3000 Па, 120 Па.



а	
б	
в	
г	

5. Рассчитайте давление, которое производит станок весом 1000 Н, если его опорная часть имеет площадь 0,25 м².

а) 4 кПа.

в) 400 Па.

б) 25 кПа.

г) 2,5 кПа.



а	
б	
в	
г	

6. Определите давление бочонка с медом массой 6 кг, площадь дна которого 300 см².

а) 200 Па.

в) 2 кПа.

б) 20 Па.

г) 20 кПа.



а	
б	
в	
г	

7. Давление воздуха или водяного пара больше при одинаковых условиях?

а) Их давления одинаковы.

б) Водяного пара.

в) Воздуха.

г) Для ответа нужны дополнительные сведения.



а	
б	
в	
г	

8. Одинаковые баллоны с природным газом находятся в разных местах: один (№ 1) в теплом помещении, другой (№ 2) – в холодном, а третий (№ 3) – на снегу на улице. В каком из них давление газа наименьшее?


а) № 1.

в) № 3.

б) № 2.

г) Давления одинаковы.

9. Опусканием поршня создано давление на газ, равное 100 Па. На сколько возросли при этом давления на площадки № 1, № 2, № 3?



- а) № 1 – 100 Па.
б) № 2 – давление не изменилось.
в) № 3 – 200 Па.
г) На все площадки давление увеличилось на 100 Па.

☒	
а	
б	
в	
г	

10. По какой формуле рассчитывают давление жидкости?

- а) $p = g\rho h$.
б) $P = gmt$.
в) $m = \rho V$.
г) $F = k\Delta l$.


☒	
а	
б	
в	
г	

11. Найдите давление воды на глубине 1 м.

- а) 1 кПа.
б) 10 кПа.
в) 100 кПа.
г) 1000 кПа.

☒	
а	
б	
в	
г	


12. Брусоч помещен в сосуд с водой так, как показано на рисунке. Каково давление воды на нижнюю грань?



- а) 5000 Па.
б) 1000 Па.
в) 500 Па.
г) 100 Па.

☒	
а	
б	
в	
г	

13. В каком из этих сосудов давление жидкости на дно наименьшее?



- а) № 1.
б) № 2.
в) № 3.
г) Во всех сосудах одинаково.

☒	
а	
б	
в	
г	

14. В три одинаковых сосуда налиты доверху такие жидкости: в один (№ 1) – мед, в другой (№ 2) – вода, в третий (№ 3) – молоко. На дно какого из них будет действовать наибольшее давление?

- а) № 1.
б) № 2.
в) № 3.
г) Давления везде одинаковы.

☒	
а	
б	
в	
г	

4. Итоговый тест




15. Главное свойство сообщающихся сосудов заключается в том, что...

- а) ... при соединении широкого и узкого сосудов жидкость устанавливается в них на разных уровнях.
- б) ... во всех таких сосудах поверхности однородной жидкости устанавливаются на одном уровне.
- в) ... поверхности разных жидкостей устанавливаются в них на одном уровне.

Вариант II



1. На земле лежит: доска (№ 1), обрубок бревна (№ 2), ведро с водой (№ 3), ящик с песком (№ 4), имеющие одинаковые массы. Какое из этих тел оказывает наибольшее давление на землю?



- а) № 1.
- б) № 2.
- в) № 3.
- г) № 4.



2. По какой формуле рассчитывают давление твердого тела?

- а) $p = gph$.
- б) $P = gm$.
- в) $p = \frac{F}{S}$.
- г) $p = \frac{m}{V}$.



3. Какая единица служит для измерения давления и чему она равна?

- а) Специальной единицы давления нет.
- б) Ньютон, 1 Н.
- в) Килограмм, 1 кг.
- г) Паскаль, 1 Н/м².



4. Выразите давления, равные 200 Н/м² и 8 кПа, в паскалях.

- а) 20 Па, 800 Па.
- б) 200 Па, 8000 Па.
- в) 2000 Па, 8000 Па.
- г) 2000 Па, 80000 Па.



5. У бидона с молоком, вес которого 480 Н, дно имеет площадь 0,12 м². Какое давление оказывает он на землю?

- а) 4000 Па.
- б) 400 Па.
- в) 40 Па.
- г) 0,4 кПа.

6. Определите давление на стол стопки книг общей массой 1,5 кг, площадь соприкосновения которых с ним 300 см².

а) 5 клас

в) 50 ГПа.

б) 500 Па.

г) 5 Па.

7. В одинаковых условиях и при одной и той же температуре находятся кислород и углекислый газ. Одинаковы ли давления этих газов?

а) **Одинаковы.**

6) Давление кислорода больше.

в) Давление углекислого газа больше.

8. Как следует поступить с баллоном, наполненным газом, чтобы его давление не изменилось?


а) Убрать в холодное помещение.

Б) ОСТАВИТЬ В ТЕНИ.

в) Положить на солнце.

г) Давление изменится в любом случае.

9. Жидкость, находящуюся в сосуде, сжимают поршнем, который создает давление 5 кПа. Какое добавочное давление будет действовать при этом на площадки № 1, № 2, № 3?



а) № 1 — 5 кПа.

6) № 2 - 0 Па.

в) № 3 – 10 кПа.

г) Добавочное давление на все площадки будет одинаковым и равным 5 кПа.

10. Давление жидкости вычисляют по формуле...

$$a) \rho = \frac{m}{V}$$
B) $p = \rho gh$.

6) $F = kM$.

$$\Gamma) \quad p = \frac{F}{S}.$$

11. Каково давление воды на глубине 2 м?

в) 20 кПа.

в) 200 кПа.


б) 10 кПа.

г) 100 кПа.

4. Итоговый тест

	☒
а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

12. На расстоянии 10 см от дна сосуда с водой находится площадка. Найдите давление воды на нее.



- а) 100 Па.**
- б) 1000 Па.**
- в) 300 Па.**
- г) 3000 Па.**

	
а	
б	
в	
г	

13. Сколько воды надо налить в сосуды № 2 и № 3, чтобы давление на дно в каждом из них было таким же, как давление воды в сосуде № 1?



No 1

No 2

No 3

- а) Нельзя определить из-за недостатка данных.
- б) Доверху.
- в) До уровня, на котором находится поверхность воды в сосуде № 1.
- г) Давление в любом случае будет разным, поскольку размеры дна в сосудах не одинаковы.


☒	☐
A	
B	
C	

14. В сосуды налиты до одной и той же высоты разные жидкости: ацетон (№ 1), бензин (№ 2), керосин (№ 3). В каком из сосудов давление на дно наименьшее?

- а) № 1.
- б) № 2.
- в) № 3.
- г) Во всех одинаково.

	
A	
B	
C	
D	

15. В каком из сообщающихся сосудов находится однородная жидкость?



No 1

No 2

No 3

- а) № 1. в) № 3.
б) № 2. г) Ни в каком.

Вариант III

	☒
A	
C	
E	
F	

1. Как можно уменьшить давление на опору ведра с медом?

- а) Отлить часть меда.
- б) Подложить под ведро широкий лист фанеры.
- в) Передвинуть ведро.
- г) Изменить давление нельзя.

2. Давление твердого тела рассчитывается по формуле...

а) $\rho = \frac{m}{V}$.

в) $p = gph$.

б) $p = \frac{F}{S}$.

г) $m = \frac{P}{g}$.

3. Паскаль — это единица...

а) ... силы.

в) ... давления.

б) ... плотности вещества.

г) ... массы.

4. Переведите давления, равные 500 Па и 7000 Н/м² в килопаскали.

а) 50 кПа и 700 кПа.

в) 0,5 кПа и 7 кПа.

б) 5 Па и 70 кПа.

г) 0,05 кПа и 0,7 кПа.

5. Какое давление на пол производит ящик, вес которого 600 Н, а площадь основания 0,3 м²?

а) 2000 Па.

в) 20 Па.

б) 200 Па.

г) 2 Па.

6. На двухколесной тележке массой 5 кг перевозят груз массой 40 кг. Площадь соприкосновения с землей одного ее колеса 1,5 см². Каково давление тележки на землю?

а) 1,5 кПа.

в) 150 кПа.

б) 15 кПа.

г) 1500 кПа.

7. В сосуде под поршнем находится газ. Несколько опустив поршень, его сжали. Как изменилась его плотность и его давление?

а) Плотность увеличилась, давление уменьшилось.

б) Увеличились и плотность и давление.

в) Увеличилось только давление, плотность не изменилась.

г) Увеличилась только плотность, давление не изменилось.

8. Куда лучше всего поместить баллон со сжатым газом, чтобы избежать опасности его взрыва: в холодное место (№ 1), на солнце (№ 2), в тень (№ 3)?

а) № 1.

в) № 3.

б) № 2.

г) Безразлично.



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	

4. Итоговый тест



9. Газ в сосуде сжимают поршнем. Как он передает оказываемое на него давление?

- а) Без изменения в направлении действия поршня.
- б) Без изменения только в направлении дна сосуда.
- в) Без изменения во всех направлениях.
- г) Во всех направлениях с уменьшением по мере удаления от поршня.



10. Чтобы рассчитать давление жидкости, надо воспользоваться формулой...

- а) $P = mg$.
- б) $p = \rho gh$.
- в) $F = k\Delta l$.
- г) $m = \rho V$.




11. Вычислите давление воды на стенку бассейна на глубине 5 м.

- а) 50 Па.
- б) 500 Па.
- в) 5 кПа.
- г) 50 кПа.




12. В центре объема воды в сосуде помещена вертикально пластинка. Определите давление воды в ее середине.

- а) 3000 Па.
- б) 300 Па.
- в) 30 кПа.
- г) 300 кПа.



13. В каких из этих сосудов давление на дно одинаково?

- а) № 1 и № 2.
- б) № 1 и № 3.
- в) № 2 и № 3.
- г) Давление одинаково во всех сосудах.




14. Какой жидкостью – маслом (№ 1), нефтью (№ 2) или эфиром (№ 3) – надо полностью заполнить сосуд, чтобы давление на его дно было наибольшим?

- а) № 1.
- б) № 2.
- в) № 3.
- г) Любой.




15. В каком из сообщающихся сосудов находится неоднородная жидкость?

- а) № 1.
- б) № 2.
- в) № 3.
- г) Ни в каком.



Вариант IV



- Бруски имеют равные массы. Какой из них оказывает на опору наименьшее давление?
 - № 1.
 - № 2.
 - № 3.
 - Их давление одинаково.
- Чтобы найти давление твердого тела, надо воспользоваться формулой...
 - $p = \frac{F}{S}$.
 - $p = g\rho h$.
 - $\rho = \frac{m}{V}$.
 - $m = \rho V$.
- В каких единицах измеряют давление?
 - Квадратных метрах.
 - Килограммах.
 - Ньютонах.
 - Паскалях.
- Выразите давления, равные 270 Н/м^2 и $0,04 \text{ кПа}$ в паскалях.
 - 27 Па и 40 Па .
 - 270 Па и 40 Па .
 - 270 Па и 400 Па .
 - 2700 Па и 4000 Па .
- Определите давление на землю мешка картофеля весом 350 Н , который опирается на нее поверхностью, имеющей площадь $0,28 \text{ м}^2$.
 - 12500 Па .
 - 1250 Па .
 - 125 Па .
 - $12,5 \text{ Па}$.
- Вычислите давление четырехколесной тележки массой 12 кг на пол, если площадь опоры одного ее колеса $1,2 \text{ см}^2$.
 - 25 кПа .
 - 2500 Па .
 - 250 кПа .
 - 250 Па .
- Поршень в сосуде, где находится газ, приподняли. Как изменились при этом плотность и давление газа?
 - Плотность уменьшилась, давление не изменилось.
 - Уменьшились и плотность и давление.
 - Давление не изменилось, плотность увеличилась.
 - И плотность, и давление возросли.



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	

4. Итоговый тест




8. Чтобы давление газа в баллоне уменьшить, куда его следует поставить: к батарее отопления (№ 1), в холодный коридор (№ 2), оставить на прежнем месте (№ 3)?

а) № 1. б) № 2. в) № 3. г) В любое место.



9. Газы и жидкости передают оказываемое на них давление по всем направлениям без изменения. Кто открыл этот закон?

а) Ньютон. в) Паскаль.
б) Галилей. г) Неизвестно.



10. Какая из этих формул позволяет вычислить давление жидкости?

а) $m = \rho V$. в) $s = vt$.
б) $F = k\Delta l$. г) $p = g\rho h$.




11. Определите давление воды на дно бассейна, если его глубина 3 м.

а) 300 Па. в) 30 кПа.
б) 3 кПа. г) 300 кПа.



12. Каково давление воды снизу на тонкую пластину, расположенную так, как показано на рисунке?

а) 1 кПа. в) 5 кПа.
б) 100 Па. г) 500 Па.



13. В каком из сосудов, показанных на рисунке, давление жидкости на дно наибольшее?

а) № 1. в) № 3.
б) № 2. г) Во всех одинаково.



14. Какой жидкостью – водой (№ 1), маслом – (№ 2) или нефтью (№ 3) – следует заполнить сосуд, чтобы давление на его дно оказалось наименьшим?

а) № 1. в) № 3.
б) № 2. г) Любой.



15. В каком сосуде – левом или правом – находится жидкость с меньшей плотностью?

а) Левом. в) Плотности одинаковы.
б) Правом.



III. ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (ЧАСТЬ 2)

Атмосферное давление



а	
б	
в	
г	

1. Известно, что масса 1 м^3 воздуха на уровне моря при 0°C равна $1,29 \text{ кг}$. Каковы вес этого объема воздуха и его плотность?

а) $0,129 \text{ Н}$; $1,29 \text{ кг/м}^3$. в) $12,9 \text{ Н}$; $1,29 \text{ кг/м}^3$.
 б) $1,29 \text{ Н}$; $1,29 \text{ кг/м}^3$. г) $12,9 \text{ Н}$; $0,129 \text{ кг/м}^3$.



а	
б	
в	
г	

2. Вычислите вес воздуха в помещении, объем которого 60 м^3 .

а) $77,4 \text{ Н}$. в) $7,74 \text{ кН}$.
 б) 774 Н . г) $77,4 \text{ кН}$.



а	
б	
в	
г	

3. Какова причина существования атмосферного давления?

а) Подвижность молекул.
 б) Их взаимодействие.
 в) Вес воздуха.
 г) Его трение о землю.



а	
б	
в	

4. Как изменяется плотность воздуха с изменением высоты над поверхностью Земли?

а) Увеличивается при подъеме.
 б) Не изменяется.
 в) Уменьшается с возрастанием высоты.



а	
б	
в	

5. Почему атмосферное давление нельзя рассчитать, как давление жидкости, по формуле $p = \rho gh$?

а) Потому что плотность воздуха очень мала.
 б) Из-за того, что h — слишком большая величина: несколько тысяч километров.
 в) Из-за размытости границы воздушной оболочки (неопределенности значения h) и изменения плотности воздуха.



а	
б	
в	
г	

6. Кто и как впервые измерил атмосферное давление?

а) Галилео Галилей при наблюдениях в телескоп.
 б) Исаак Ньютон, когда изучал движение тел.
 в) Блез Паскаль при выяснении условий равновесия жидкостей.
 г) Эванджелиста Торричелли в опытах с трубкой, в которой ртуть устанавливается на определенном уровне.

7. Как изменяется уровень ртути в трубке Торричелли при изменении атмосферного давления?



а	
б	
в	
г	

а) Не изменяется.

б) Повышается при увеличении атмосферного давления и понижается при его уменьшении.

в) Понижается в случае увеличения атмосферного давления и повышается, когда оно уменьшается.

г) Среди ответов нет правильного.

8. Атмосферное давление измеряют в паскалях и в...



а	
б	
в	
г	

а) ... миллиметрах.

б) ... сантиметрах.


в) ... миллиметрах и сантиметрах ртутного столба.

г) ... ньютонах на квадратный метр.

9. Атмосферное давление сегодня выше нормального атмосферного давления на 10 мм. рт. ст. Какой высоты столбик ртути в трубке Торричелли будет при этом давлении?



а	
б	
в	
г	



а) 770 мм.

в) 760 мм.


б) 750 мм.

г) 780 мм.


10. Столбик ртути в трубке Торричелли (рис. а) опустился (рис. б). Как изменилось атмосферное давление? На сколько оно изменилось?



а	
б	
в	



а)



б)

а) Уменьшилось на 10 мм рт. ст.

б) Увеличилось на 5 мм рт. ст.

в) Уменьшилось на 5 мм рт. ст.

Измерение атмосферного давления

1. Атмосферное давление измеряют прибором, название которого...



а	
б	
в	
г	

а) ... динамометр.

в) ... линейка.

б) ... барометр.

г) ... термометр.

III. Давление твердых тел, жидкостей и газов (часть 2)



а	
б	
в	
г	

2. Ртутный барометр представляет собой...

- а) ... трубку Торричелли.
- б) ... стеклянную трубку с жидкостью.
- в) ... трубку Торричелли с линейкой.
- г) ... трубку Торричелли со шкалой, проградуированной в единицах атмосферного давления.



а	
б	
в	

3. Почему в барометрах, основанных на трубке Торричелли, используется ртуть – ядовитое вещество, а не вода?


- а) Потому что ртуть не прозрачна и ее столбик хорошо виден в стеклянной трубке.
- б) Потому что Торричелли проводил опыты со ртутью.
- в) Потому что у ртути наибольшая среди жидкостей плотность и для барометра нужна стеклянная трубка длиной порядка 1 м, а если использовать воду, то понадобится трубка более 10 м.



а	
б	
в	

4. Каковы показания барометра-анероида, снимаемые по верхней шкале?

- а) 1000 гПа.
- б) 1000 Па.
- в) 1000 кПа.



а	
б	
в	
г	

5. Чему равно атмосферное давление, определенное по нижней шкале барометра-анероида (см. зад. 4)?

- а) 780 мм рт. ст.
- б) 750 мм рт. ст.
- в) 760 мм рт. ст.
- г) 740 мм рт. ст.



а	
б	
в	
г	

6. Каким станет атмосферное давление при подъеме на высоту 1200 м, если на земле оно равно 780 мм рт. ст.?

- а) 660 мм рт. ст.
- б) 680 мм рт. ст.
- в) 700 мм рт. ст.
- г) 720 мм рт. ст.



а	
б	
в	
г	

7. На какой высоте атмосферное давление равно 725 мм рт. ст., если на земле оно равно 755 мм рт. ст.?

- а) 300 м.
- б) 340 м.
- в) 360 м.
- г) 380 м.

8. На поверхности Земли атмосферное давление равно 750 мм рт. ст., а на вершине радиомачты 745 мм рт. ст. Определите ее высоту.
- а) 45 м.
б) 50 м.
- в) 55 м.
г) 60 м.
9. Сила, с которой нормальное атмосферное давление действует на поверхность стола площадью 2 м², равна...
- а) 50,65 кН.
б) 202,6 кН.
- в) 20,26 кН.
г) 2026 кН.
10. С какой силой давит атмосфера на пол в классе площадью 40 м² в тот день, когда давление воздуха равно 750 мм рт. ст.?
- а) $\approx 4 \cdot 10^3$ кН.
б) $\approx 4 \cdot 10^4$ кН.
- в) $\approx 10^3$ кН.
г) $\approx 10^4$ кН.

☒	☐
а	
б	
в	
г	

☒	☐
В	
С	
Д	
Г	

☒	☐
A	
6	
B	
I	


Манометры.
Поршневые насосы.
Гидравлические машины

1. Манометр – это прибор для измерения...
- а) ...давления.
 - б) ...сил, с которыми атмосфера действует на тела.
 - в) ...изменений атмосферного давления.
 - г) ...давлений газов и жидкостей, больших или меньших атмосферного давления.
2. Какой из изображенных здесь приборов – манометр?
- а) № 1.

б) № 2.

в) № 3.

г) Манометра нет.





No 1



№ 2



43

	
D	
B	
B	
T	

☒	☐
А	
Б	
В	
Г	

☒
а
б
в
г

3. Накачав шар, его соединили с ртутным манометром. На сколько давление воздуха в шаре превышает атмосферное давление? (В качестве шкалы манометра использована линейка.)


а) На 40 мм рт. ст. в) На 10 мм рт. ст.
б) На 20 мм рт. ст. г) На 0 мм рт. ст.



☒
а
б
в

4. Что заставляет воду подниматься вслед за поршнем?

а) Образование пустоты под ним.
б) Давление воздуха на поверхность воды в широком сосуде.
в) Изменение атмосферного давления при подъеме поршня.



☒
а
б
в
г

5. Вычислите максимальную высоту, на которую можно поднять воду поршневым насосом при нормальном атмосферном давлении.

а) 101,3 м. в) 10,13 м.
б) 101,3 см. г) 10,13 см.

☒
а
б
в
г

6. На какую максимальную высоту можно поднять поршневым насосом машинное масло, если атмосферное давление нормальное?

а) 1,12 м. в) 112 м.
б) 11,2 м. г) 112 см.

☒
а
б
в

7. Как зависит максимальная высота подъема жидкости поршневым насосом от ее плотности?

а) Увеличивается с ростом плотности.
б) Увеличивается при уменьшении плотности.
в) Не зависит.

☒
а
б
в

8. Атмосферное давление возросло. На большую или меньшую высоту сможет поднять теперь воду поршневой насос?

а) На большую.
б) На меньшую.
в) На ту же высоту.

9. Каково соотношение действующих на поршни гидравлической машины сил и площадей этих поршней. Из каких закономерностей следует это соотношение?

- а) $\frac{F_2}{F_1} = \frac{S_2}{S_1}$; из закона сообщающихся сосудов.
- б) $\frac{F_2}{F_1} = \frac{S_2}{S_1}$; из закона Паскаля и равновесия жидкости.
- в) $\frac{F_2}{F_1} = \frac{S_2}{S_1}$; из закона Паскаля и равенства давлений ($p_1 = p_2$) в жидкости, находящейся в равновесии.

10. Гидравлический пресс применяется, например, для...

- а) ... обжима металлических заготовок деталей;
- б) ... подъема воды из затопленной шахты.
- в) ... накачивания шин тяжелых самосвалов.
- г) ... выжимания масла из семян подсолнечника.

11. Какой выигрыш в силе дает гидравлический пресс? Вычислите его, если $F_1 = 500 \text{ Н}$, $S_1 = 100 \text{ см}^2$, $F_2 = 5 \text{ кН}$, $S_2 = 1000 \text{ см}^2$.


- а) $\frac{S_1}{S_2}; 0,1$. б) $\frac{S_2}{S_1}; 10$. в) $\frac{S_2}{S_1}; 0,1$. г) $\frac{S_1}{S_2}; 10$.

12. На большой поршень гидравлического пресса с площадью 400 см^2 поставлена гиря массой 5 кг . Какой массы гирю надо поставить на малый поршень (его площадь равна 80 см^2), чтобы жидкость в прессе была в равновесии?

- а) 0,5 кг.** **в) 2,5 кг.**
б) 2 кг. **г) 1 кг.**

13. Площади поршней гидравлического пресса 200 см^2 и $0,5 \text{ см}^2$. На большой поршень действует сила 4 кН . Какая ее уравновесит сила, прилагаемая к малому поршню?

- а) 1000 Н.** **в) 10 Н.**
б) 100 Н. **г) 1 Н.**



14. Гидравлический пресс обеспечивает выигрыш в силе в 7 раз. Его малый поршень имеет площадь, равную 300 см^2 . Какова площадь большого поршня?
- а) 2100 см^2 . в) $0,4 \text{ м}^2$.
- б) $42,8 \text{ см}^2$. г) 210 см^2 .

Давление жидкостей и газов на погруженные в них тела



1. Выталкивающая сила, действующая на погруженное в жидкость тело, равна...
- ...весу этого тела.
 - ...разности давлений жидкости на нижнюю и верхнюю поверхности тела.
 - ...весу жидкости в объеме этого тела.
 - ...разности высот, на которых находятся в жидкости нижняя и верхняя поверхности тела.



- а) $F = gm$. в) $F = pS$.
- б) $p = \rho g h$. г) $F = \rho g V_m$.




3. Выталкивающая сила зависит от...
- а) ...объёма тела.
 - б) ...плотности тела.
 - в) ...плотности жидкости.
 - г) ...глубины погружения тела.



4. Выталкивающая сила не зависит от...
- а) ...формы тела.
 - б) ...глубины его нахождения в жидкости.
 - в) ...его плотности.
 - г) ...верны все три ответа.

5. На какие шары в сосуде с водой действуют равные выталкивающие силы?


- а) № 1 и № 2. в) № 2 и № 3.
б) № 3 и № 4. г) № 1 и № 3.



☒
а
б
в
г

6. В какой сосуд надо опустить тело, чтобы жидкость выталкивала его с наибольшей силой?

- а) № 1.
б) № 2.
в) № 3.




☒
а
б
в

7. На какой брусок – из свинца (№ 1), алюминия (№ 2), железа (№ 3) – жидкость действует с наименьшей выталкивающей силой, если массы брусков равны?

- а) № 1. в) № 3.
б) № 2.

☒
а
б
в


8. В каких случаях нарушится равновесие весов при погружении уравновешенных в воздухе тел в сосуды с жидкостями?



№ 1



№ 2



№ 3

- а) № 1 и № 2. в) № 1 и № 3.
б) № 2 и № 3. г) Во всех случаях.

☒
а
б
в
г

Архимедова сила

1. Архимедову силу рассчитывают по формуле...

- а) $p = gph$. в) $F = g\rho_x V_T$.
б) $F = pS$. г) $F = k\Delta l$.

☒
а
б
в
г

III. Давление твердых тел, жидкостей и газов (часть 2)



а	
б	
в	
г	

2. От каких величин зависит архимедова сила?

- а) Плотности вещества, из которого состоит тело.
- б) Плотности жидкости.
- в) Объема жидкости.
- г) Толщины слоя жидкости над телом.



а	
б	
в	
г	

3. Архимедова сила зависит от...

- а) ...глубины погружения тела в жидкость.
- б) ...расстояния тела до дна сосуда.
- в) ...веса тела.
- г) ...объема тела.



а	
б	
в	
г	

4. Объемы трех деталей относятся, как 1:2:3. При погружении их в воду на первую деталь подействовала архимедова сила, равная 90 Н. Чему равны архимедовы силы, действовавшие на вторую и третью детали?

- а) 45 Н и 30 Н.
- б) 120 Н и 240 Н.
- в) 45 Н и 90 Н.
- г) 180 Н и 270 Н.



а	
б	
в	
г	

5. Плотности двух жидкостей относятся как 1:2. При опускании во вторую из них шара на него подействовала архимедова сила, равная 6 Н. Какая выталкивающая сила должна действовать на шар в первой жидкости?

- а) 12 Н.
- б) 3 Н.
- в) 2 Н.
- г) 4 Н.



а	
б	
в	
г	

6. Погруженное в воду тело массой 4,5 кг потеряло в весе 15 Н. Чему равна действующая на него в воде архимедова сила? Каков был вес тела в воздухе?

- а) 15 Н; 45 Н.
- б) 15 Н; 4,5 Н.
- в) 30 Н; 45 Н.
- г) 30 Н; 4,5 Н.



а	
б	
в	
г	

7. Деталь объемом 75 см³ весит 6 Н. Сколько она потеряет в весе, если ее погрузить в машинное масло? Сколько она будет весить в этой жидкости?

- а) $\approx 0,7$ Н; 5,3 Н.
- б) $\approx 0,7$ Н; 6,7 Н.
- в) 0,5 Н; 5,5 Н.
- г) 1,4 Н; 4,6 Н.



5. Условие, при котором тело тонет в жидкости...

- а) $F_A < F_{\text{max}}$.
 б) $F_A = F_{\text{max}}$.
 в) $F_A > F_{\text{max}}$.
 г) Среди ответов нет верного.



6. Условие всплытия тела в жидкости...

- а) $F_A = F_{\max}$. б) $F_A = 0$.
в) $F_A < F_{\max}$. г) $F_A > F_{\max}$.



7. Если плотность сплошного тела больше плотности жидкости, то...

- а) ...телo всплывает.
- б) ...телo находится внутри жидкости в равновесии.
- в) ...телo тонет.
- г) ...телo плавает на поверхности жидкости, погрузившись в нее частично.




8. Если плотность предмета меньше плотности жидкости, то...

- а) ...предмет плавает внутри жидкости.
б) ...он тонет.
в) ...он плавает на поверхности жидкости так, что некоторая его часть находится под водой.




9. В сосудах с водой, машинным маслом и ртутью плавают одинаковые деревянные брусочки. В каком из этих сосудов ртуть, в каком — вода?



- а) Ртуть – № 1, вода – № 3. в) Ртуть – № 3, вода – № 2.
б) Ртуть – № 2, вода – № 1. г) Ртуть – № 1, вода – № 2.



10. Пробирка с песком № 1 всплывает, № 3 – тонет, № 2 – плавает внутри жидкости. На какую из них действует архимедова сила, превышающая силу тяжести? Действует ли выталкивающая сила



- а) № 3; да.**
- б) № 2; нет.**
- в) № 1; да.**
- г) № 2; да.**

III. Давление твердых тел, жидкостей и газов (часть 2)

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

4. Грузоподъемностью судна называют...

- а) ...вес воды, вытесняемой судном.
- б) ...вес воды, вытесняемой судном при погружении до ватерлинии.
- в) ...водоизмещение судна + вес груза.
- г) ...разность между водоизмещением груза и его собственным весом.

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

5. Водоизмещение корабля, перевозящего при осадке до ватерлинии 4000 т груза, равно $6 \cdot 10^4$ кН. Какова масса самого корабля?

- а) 10000 т.
- б) 2000 т.
- в) 3000 т.
- г) 4000 т.

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

6. Сила тяжести, действующая на теплоход, плывущий с пассажирами, составляет 500 000 кН. Какой массы воду вытесняет этот теплоход?

- а) 500 000 т.
- б) $5 \cdot 10^6$ т.
- в) $5 \cdot 10^3$ т.
- г) $5 \cdot 10^4$ т.

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

7. Рассчитайте грузоподъемность корабля, если его водоизмещение 75000 кН, а вес $15 \cdot 10^3$ кН.

- а) 60000 кН.
- б) 90000 кН.
- в) $5 \cdot 10^4$ кН.
- г) $25 \cdot 10^4$ кН.

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

8. После частичной разгрузки судна, площадь дна которого 10^4 м², его осадка уменьшилась на 10 см. Каков вес снятого с корабля груза?

- а) 10^5 Н.
- б) 10^6 кН.
- в) 10^4 кН.
- г) 10^5 кН.

а	☒
б	☐
в	☐

9. При каком условии шар поднимется в атмосферу?

- а) Если $F_A = F_{\text{тяг}}$.
- б) Если $F_A > F_{\text{тяг}}$.
- в) Если $F_A < F_{\text{тяг}}$.

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

10. Подъемная сила летательного аппарата (шара, аэростата) равна...


- а) ...архимедовой силе.
- б) ...весу газа в оболочке аппарата.
- в) ...разности выталкивающей силы и веса газа.
- г) ...сумме архимедовой силы и веса газа.



а	
б	
в	
г	

3. Определите атмосферное давление по изображенной здесь шкале барометра.

- а) 756 мм рт. ст. в) 755 мм рт. ст.
б) 762 мм рт. ст. г) 758 мм рт. ст.



а	
б	
в	
г	

4. На этаже высотного дома атмосферное давление равно 750 мм рт. ст., когда на земле оно равно 757 мм рт. ст. На какой высоте находится этот этаж?

- а) 70 м. б) 74 м. в) 80 м. г) 84 м.



а	
б	
в	
г	

5. С какой силой давит атмосфера на крышу дома площадью 40 м² при нормальном атмосферном давлении?


- а) ≈ 4500 кН. в) ≈ 4052 кН.
б) ≈ 4200 кН. г) ≈ 4252 кН.



а	
б	
в	
г	

6. Больше или меньше атмосферного давление в шаре? На сколько?

- а) Меньше на 20 мм рт. ст.
б) Больше на 20 мм рт. ст.
в) Меньше на 40 мм рт. ст.
г) Больше на 40 мм рт. ст.



а	
б	
в	
г	

7. На малый поршень гидравлического пресса с площадью 100 см² поставлена гиля массой 2 кг. Какой массы гилю надо поставить на большой поршень площадью 500 см², чтобы уравновесить их действие на жидкость в корпусе пресса?

- а) 200 кг. б) 100 кг. в) 10 кг. г) 20 кг.



а	
б	
в	
г	

8. Площади поршней гидравлического пресса 600 см² и 3000 см². Какой выигрыш в силе обеспечивает этот пресс? Что это значит?

- а) Равный 5, т. е. большой поршень удержит в 5 раз большую нагрузку, чем малый поршень.
б) Равный 20; на большой поршень будет действовать в 20 раз меньшая сила, чем на малый.
в) Равный 2; большой поршень сможет сжимать прессуемое тело с силой в 2 раза большей, чем действуют на малый поршень.
г) Равный 5; малый поршень может действовать на жидкость силой, в 5 раз большей, чем большой поршень.

5. Итоговый тест



а	
б	
в	

16. В сосуд со ртутью опускают тела одинакового объема, изготовленные из меди (№ 1), стали (№ 2) и чугуна (№ 3). Какое из них погрузится в жидкость больше других?

- а) № 1. б) № 2. в) № 3.



а	
б	
в	
г	

17. В сосуд налиты несмешивающиеся жидкости: подсолнечное масло (№ 1), вода (№ 2), керосин (№ 3). В какой последовательности (снизу) они расположатся?

- а) № 1, № 2, № 3. в) № 2, № 3, № 1.
б) № 3, № 2, № 1. г) № 2, № 1, № 3.



а	
б	
в	
г	

18. Вес катера с пассажирами 400 кН. Сколько воды он будет вытеснять, плывя по реке?

- а) 4000 т. в) 40 т.
б) 400 т. г) 4 т.



а	
б	
в	
г	

19. В порту разгружают судно. Как при этом меняется его осадка?

- а) Она не меняется пока судно разгружается и полностью не разгружено.
б) Уменьшается.
в) Увеличивается.
г) Разгрузка судна на его осадку не влияет.



а	
б	
в	

20. Какое должно быть выполнено условие, чтобы летательный аппарат мог взлететь?

- а) $F_{\text{тяг}} = F_A$. в) $F_{\text{тяг}} < F_A$.
б) $F_{\text{тяг}} > F_A$.

Вариант II



а	
б	
в	

1. Высота столбика ртути в трубке Торричелли увеличилась. Как изменилось атмосферное давление?


- а) Уменьшилось. в) Увеличилось.
б) Не изменилось.

2. Единицы измерения атмосферного давления – это...

- а) ...паскаль. в) ...миллиметр.
б) ...ньютон. г) ...миллиметр и сантиметр ртутного столба.

3. Определите атмосферное давление по показаниям барометра, шкала которого изображена на рисунке.

- а) 749 мм рт. ст. в) 748 мм рт. ст.
б) 744 мм рт. ст. г) 746 мм рт. ст.



4. В шахте глубиной 0,6 км атмосферное давление равно 790 мм рт. ст. Чему оно равно в это время на земле?


- а) 840 мм рт. ст. в) 740 мм рт. ст.
б) 800 мм рт. ст. г) 760 мм рт. ст.

5. С какой силой давит воздух на пол комнаты, площадь которой 20 м², при нормальном атмосферном давлении?

- а) 2026 кН. в) 2026 Н.
б) 202,6 кН. г) 202,6 Н.

6. Вычислите давление газа в сосуде по показаниям манометра, представленного на рисунке, если атмосферное давление равно 770 мм рт. ст.

- а) 800 мм рт. ст.
б) 785 мм рт. ст.
в) 755 мм рт. ст.
г) 740 мм рт. ст.



7. Можно ли выкачать поршневым насосом воду с глубины 20 м при нормальном атмосферном давлении?

- а) Можно, так как поршневой насос предназначен для подъема жидкости.
б) Можно, поскольку вода легче ртути.
в) Нельзя, так как максимальная высота, на которую может подняться вода под действием атмосферного давления, равна примерно 10 м.



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	
г	



а	
б	
в	



8. На большой поршень гидравлического пресса площадью 1250 см^2 действуют силой 250 Н . Какая сила, приложенная к малому поршню площадью 250 см^2 , сможет удержать его от перемещения?

в) 50 Н.

B) 25 H.

6) 5 H.

г) 75 Н.



9. Гидравлический пресс дает выигрыш в силе, равный 10. Какую силу надо приложить к его малому поршню, чтобы уравновесить действующий на большой поршень груз массой 65 кг?

a) 6.5 H.

В) 650 H.

6) 65 H.

г) 6.5 кН.



10. Формула, по которой можно вычислить выталкивающую силу, – это...

$$\text{a) } F = pS.$$
B) $F = k\lambda$.

6) $p = \rho gh$.

$$\Gamma) F = g\rho V.$$


11. Выталкивающая сила тем меньше, чем...

а) ...ближе тело к поверхности жидкости.

б) ...меньше плотность тела.

в) ...меньше плотность жидкости.

г) ...менее сложна форма тела.




12. На какой из этих шаров действует наибольшая выталкивающая сила?

a) № 1.

6) № 2.

B) № 3.



13. Какое название получила выталкивающая сила, действующая на тело, погруженное в жидкость?

я) Сила Паскаля.

в) НЬЮТОНОВСКАЯ сила.

б) Архимедова сила,



14. Найдите архимедову силу, действующую на погрузившуюся в воду бочку объемом $0,2 \text{ м}^3$.

в) 20 Н.

в) 2 кН.

6) 200 H.

г) 20 кГц.


15. Тело массой 6 кг погрузили в воду. При этом его вес уменьшился на 10 Н. Каков стал его вес в воде? Чему равна действующая на него архимедова сила?

☒	
а	
б	
в	
г	

- а) 10 Н; 50 Н.
б) 10 Н; 70 Н.
в) 6 Н; 54 Н.
г) 6 Н; 66 Н.

16. Какое из этих тел всплывет?

- а) № 1.
б) № 2.
в) № 3.



☒	
а	
б	
в	

17. В сосуде находятся несмешивающиеся жидкости: вода (№ 1), масло (№ 2) и жидкий (расплавленный) парафин (№ 3). В какой последовательности (сверху вниз) они расположены?

- а) № 1, № 2, № 3.
б) № 2, № 3, № 1.
в) № 3, № 1, № 2.
г) № 3, № 2, № 1.

☒	
а	
б	
в	
г	

18. Водоизмещение судна 3000 кН, его собственный вес 600 кН. Какой максимальный груз оно может перевезти?

- а) 240 кН.
б) 120 кН.
в) 2400 кН.
г) 1200 кН.

☒	
а	
б	
в	
г	

19. Когда с судна сняли груз, его осадка уменьшилась на 40 см. Какова масса снятого груза? Дно судна считать плоским, а его площадь равной 300 м².

- а) 12000 т.
б) 1200 т.
в) 120 т.
г) 12 т.

☒	
а	
б	
в	
г	

20. Для наполнения шара, который нужно поднять в атмосферу, есть возможность использовать углекислый газ (№ 1), природный газ (№ 2) и хлор (№ 3). Какой газ сможет поднять шар?

- а) № 1.
б) № 2.
в) № 3.
г) Никакой.

☒	
а	
б	
в	
г	

Вариант III



а	☐
б	☐
в	☐

1. О каком изменении атмосферного давления свидетельствует понижение уровня ртути в трубке Торричелли?

а) Ни о каком – между ними нет связи.
 б) Об увеличении атмосферного давления.
 в) Об его уменьшении.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

2. Причина существования атмосферного давления ...

а) ...взаимодействие молекул воздуха.
 б) ...их хаотическое движение с большой скоростью.
 в) ...изменение плотности воздуха с высотой.
 г) ...вес воздуха.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

3. Каково атмосферное давление, зафиксированное барометром, шкала которого здесь показана?

а) 720 мм рт. ст. в) 736 мм рт. ст.
 б) 734 мм рт. ст. г) 760 мм рт. ст.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

4. На высоте 1,2 км над землей атмосферное давление оказалось равным 645 мм рт. ст. Чему оно равно в это время на земле?

а) 745 мм рт. ст. в) 695 мм рт. ст.
 б) 545 мм рт. ст. г) 657 мм рт. ст.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

5. Площадь рабочей поверхности стола 1 м². С какой силой давит на него воздух при нормальном атмосферном давлении?


а) 1013 Н. в) 101,3 Н.
 б) 101,3 кН. г) 10,13 кН.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

6. Больше или меньше атмосферного давления показывает давление газа в сосуде манометр, изображенный на рисунке? На сколько?

а) Меньше на 15 мм рт. ст.
 б) Больше на 15 мм рт. ст.
 в) Меньше на 10 мм рт. ст.
 г) Больше на 10 мм рт. ст.



7. С какой максимальной глубины можно при нормальном атмосферном давлении поднять поршневым насосом со дна расщелины машинное масло, пролитое и просочившееся сквозь почву?

 $\Delta) \approx 11,7 \text{ м.}$

B) ≈ 117 cm.

6) ≈ 117 м.

г) $\approx 11,7$ см.

☒	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

8. Какой выигрыш в силе дает гидравлический пресс, у которого площадь малого поршня составляет 800 см^2 , большего – 2400 см^2 . Какая сила будет действовать на его большой поршень, если на малый поставить гирию массой 9 кг ?

а) В 3 раза: 27 Н.

в) В 6 раз: 54 II.

6) В 4 раза; 36 Н.

г) В 3 раза; 270 Н.,

☒	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

9. Выигрыш в силе, который обеспечивает гидравлический пресс, равен 5. Какую силу надо приложить к его малому поршню, чтобы спрессовать силой 8 кН помещенный на большой поршень продукт в брикет?

в) 40 кН.

в) 0,16 кГц.

б) 1,6 кН.

г) 4 кН.

	☒
Я	
Б	
В	
Г	

10. Выталкивающую силу определяют по формуле...

a) $F = P$

$$\mathbf{B}) \cdot p \doteq g\rho h.$$
6) $F = g\rho_{\text{ж}}V_{\text{ж}}$.
$$\text{г) } F = pS.$$

☒	☐
A	
B	
C	
D	

11. Выталкивающая сила не изменяется при...

в) ...увеличении плотности жидкости:

б) ...уменьшении плотности жидкости.

в) ...разных положениях тела в жидкости.

г) ...изменении объема тела.

☒	☐
8	
6	
3	
1	


12. Есть ли среди шаров, погруженных в воду, такие, на которые действуют равные выталкивающие силы?

а) Нет.


б) Есть, это № 2 и № 3.

в) ЕСТЬ: это № 1 и № 2.

г) Есть, это № 1 и № 5.



	☒
а	
б	
в	
г	



13. Почему архимедова сила вычисляется по той же формуле ($F = g\rho_{ж}V_m$), что и выталкивающая сила, действующая на тело, погруженное в жидкость?

- а) Потому что они равны.
 б) Потому что обе эти силы открыты Архимедом.
 в) Потому что архимедова сила – это название открытой Архимедом выталкивающей силы, данное позднее в его честь.



14. Определите архимедову силу, действующую на опущенную в машинное масло деталь объемом 4000 см^3 .

- а) 3600 Н .
 б) 360 Н .
 в) 36 Н .
 г) $3,6 \text{ Н}$.




15. Металлический шар объемом $0,005 \text{ м}^3$ весит 390 Н . Сколько он потеряет в весе, если его погрузить в керосин? Каков будет его вес в этой жидкости?

- а) 20 Н ; 370 Н .
 б) 40 Н ; 350 Н .
 в) 50 Н ; 34 Н .
 г) 40 Н ; 430 .




16. Какое из этих тел будет плавать внутри жидкости?

- а) № 1.
 б) № 2.
 в) № 3.
 г) Такого тела нет.



17. В сосуд со ртутью опущены тела, состоящие из цинка (№ 1), свинца (№ 2), латуни (№ 3). Какое из них меньше всех погрузилось в жидкость?

- а) № 1.
 б) № 2.
 в) № 3.



18. На судно погрузили контейнеры весом 750 кН . На сколько больше воды стало вытеснять после этого судно?

- а) 750 т .
 б) 7500 т .
 в) 150 т .
 г) 75 т .

19. Собственный вес корабля 7000 кН. Вес максимального груза, при котором осадка достигает ватерлинии, равен 53000 кН. Каково водоизмещение этого корабля?



а	
б	
в	
г	

а) 46000 кН.

в) 6000 кН.

б) 60000 кН.

г) 4600 кН.

20. Какой из газов – азот (№ 1), кислород (№ 2), гелий (№ 3), хлор (№ 4), – если им заполнить воздушный шар, создаст наибольшую подъемную силу?



а	
б	
в	
г	

а) № 1.

в) № 3.

б) № 2.

г) № 4.

Вариант IV

1. Какую высоту столбика ртути в трубке Торричелли – h_1 , h_2 , h_3 – надо измерить, чтобы определить атмосферное давление?




а	
б	
в	

а) h_1 .

б) h_2 .

в) h_3 .



2. На основе какого прибора создан высотомер?



а	
б	
в	
г	

а) Манометра.

б) Динамометра.

в) Ртутного барометра.

г) Барометра-анероида.

3. По шкале барометра, показанной на рисунке, определите атмосферное давление в гектопаскалях.




а	
б	
в	
г	

а) 744 гПа.

б) 992 гПа.

в) 990 гПа.

г) 740 гПа.



☒

а	
б	
в	
г	

4. Каково атмосферное давление в подземной пещере, находящейся на глубине 120 м, когда на земле оно равно 755 мм рт. ст.?
- а) 745 мм рт. ст. в) 750 мм рт. ст.
б) 765 мм рт. ст. г) 740 мм рт. ст.

☒


а	
б	
в	
г	

5. Рассчитайте силу, с которой атмосфера давит на щит размером 2 м × 1,5 м при нормальном атмосферном давлении.
- а) 30,36 кН. в) 303,6 кН.
б) 36,50 кН. г) 607,2 кН.

☒

а	
б	
в	
г	

6. Чему равно давление газа в этом сосуде? Атмосферное давление 740 мм рт.ст.
- а) 40 мм рт. ст.
в) 700 мм рт. ст.
б) 0 мм рт. ст.
г) 740 мм рт. ст.


☒

а	
б	
в	
г	

7. На большую или на меньшую высоту сможет поднять поршневой насос жидкость более тяжелую, чем вода?
- а) На ту же высоту. в) На меньшую.
б) На большую. г) На любую высоту.

☒

а	
б	
в	

8. Площади поршней гидравлического пресса 300 см² и 1500 см². Какой массы гирю надо поставить на малый поршень, чтобы уравновесить силу 750 Н, действующую на большой поршень?
- а) 150 кг. в) 1,5 кг.
б) 15 кг.

☒

а	
б	
в	
г	


9. Для расчета выталкивающей силы пользуются формулой...
- а) $F = g\rho_{ж}V_m$. в) $F = k\Delta l$.
б) $F = pS$. г) $p = gph$.

☒

а	
б	
в	
г	

10. Выталкивающая сила, действующая на погруженное в жидкость тело, зависит от...
- а) ...объема тела. в) ...плотности жидкости.
б) ...плотности тела. г) ...формы тела.


11. Одинаковые шары опускают в емкости с разными жидкостями. Какой из них выталкивается жидкостью с наибольшей силой?



- а) № 1.
б) № 2.
в) № 3.

а	☒
б	
в	

12. В каком случае равновесие нарушится, если опустить одинаковые шары в жидкости? Какой шар перестанет?



- а) а; № 1. в) б; № 3.
б) а; № 2. г) б; № 4.

а	☒
б	
в	
г	

13. Определите выталкивающую силу, действующую на полностью погруженное в речку бревно объемом $0,6 \text{ м}^3$.

- а) 600 Н. в) 60 кН.
б) 6 кН. г) 60 Н.

а	☒
б	
в	
г	

14. Тело объемом 80 см^3 , будучи погружено в воду, весит 20 Н. Каков его вес в воздухе?

- а) 20,8 Н. в) 28 Н.
б) 19,2 Н. г) 12 Н.

а	☒
б	
в	
г	

15. Выталкивающая сила, действующая в жидкости на находящееся в ней тело, рассчитывается по формуле $F = g \rho_{\text{ж}} V_{\text{м}}$. А по какой формуле вычисляют архимедову силу?

- а) По той же формуле.
б) По другой формуле: $p = g \rho h$.
в) По формуле, которую еще не изучали.

а	☒
б	
в	

16. В какой жидкости – масле (№ 1), ацетоне (№ 2), бензине (№ 3) – будет тонуть пробковый шар?

- а) № 1. в) № 3.
б) № 2. г) Ни в какой.

а	☒
б	
в	
г	

5. Итоговый тест

☒

а	
б	
в	
г	

17. Что произойдет с телом под действием сил, указанных на рисунке?



- а) Будет плавать внутри жидкости.
- б) Утонет.
- в) Всплывет.
- г) Будет плавать на поверхности жидкости, частично в нее погрузившись.

☒

а	
б	
в	

18. Лодка с гребцом и веслами весит 2000 Н. Чему будет равна действующая на неё выталкивающая сила, когда лодка поплывет по реке?

- а) 200 Н.
- б) 2000 Н.
- в) 20 кН.

☒

а	
б	
в	
г	

19. Речной плот, площадь которого 60 м^2 , погружен в воду на 0,2 м. Какая сила тяжести действует на него?

- а) 120 кН.
- б) 12 кН.
- в) 6000 Н.
- г) 60000 Н.

☒

а	
б	
в	

20. В распоряжение воздухоплателя предоставлены: кислород (№ 1), азот (№ 2), гелий (№ 3). Какой из этих газов пригоден для наполнения воздушного шара?

- а) № 1
- б) № 2.
- в) № 3.

IV. РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ

Механическая работа. Единицы работы



а	
б	
в	
г	

1. Тело совершает механическую работу только тогда, когда...

- а) ...оно движется.
 б) ...на него действует сила.
 в) ...оно движется по инерции.
 г) ...на него действует сила и оно движется.



а	
б	
в	
г	

2. В каких примерах совершается работа: электровоз перемещает вагоны на запасной путь (№ 1), человек в тренажерном зале прицеливается для выстрела в мишень (№ 2), ребенок читает книгу на диване (3), ручеек выносит в реку бумажный кораблик (№ 4)?

- а) № 1. б) № 2. в) № 3. г) № 4.



а	
б	
в	
г	

3. Тело производит тем большую работу, чем...

- а) ...оно больше.
 б) ...большая действует на него сила и длиннее его путь.
 в) ...длительнее воздействие на него силы.
 г) ...оно дольше преодолевает свой путь.



а	
б	
в	
г	

4. Механическую работу вычисляют по формуле...

- а) $F = pS$. в) $A = Fs$.
 б) $P = gt$. г) $F = g\rho V$.



а	
б	
в	
г	

5. Работу измеряют в...

- а) Джоулях. в) Метрах.
 б) Ньютонах. г) Паскалях.



а	
б	
в	
г	

6. Выразите в джоулях работу, равную 0,85 кДж и 20 Н · м.

- а) 85 Дж и 20 Дж. в) 850 Дж и 20 Дж.
 б) 850 Дж и 200 Дж. г) 85 Дж и 200 Дж.



а	
б	
в	
г	

7. Выразите в килоджоулях работу, равную 7500 Дж и 48000 Н · м.

- а) 75 кДж и 48 кДж. в) 7,5 кДж и 4,8 кДж.
 б) 75 кДж и 4, кДж. г) 7,5 кДж и 48 кДж.

8. Вычислите работу, которую производит садовод, прикладывая к тачке с землей силу 25 Н и перемещая ее на 20 м.
- а) 45 Дж.
б) 50 кДж.
в) 0,5 кДж.
г) 50 Дж.
9. Вес банки с краской 100 Н. Ее поднимают на 5-й этаж дома, у которого расстояние между этажами 3,5 м. Какую совершают при этом работу?
- а) 1,75 кДж.
б) 17,5 кДж.
в) 14 кДж.
г) 1,4 кДж.
10. Упаковка сахара-рафинада объемом $60 \times 40 \times 10$ см³ поднята с пола на высоту 1,5 м. Определите работу, совершенную при этом.
- а) 57,6 кДж.
б) 576 кДж.
в) 5,76 кДж.
г) 576 Дж.
11. К ящику, заполненному деталями, массой 160 кг привязан канат, за который его тянут по горизонтальному настилу. Какую совершают работу при перемещении ящика на 5 м, если сила трения составляет 0,2 от его веса?
- а) 9600 Дж.
б) 8000 Дж.
в) 1600 Дж.
г) 4000 Дж.



2	
6	
8	
Г	



а	
б	
в	
г	




Б	
6	
В	
Г	

2	
6	
8	
7	

Мощность. Единицы мощности

1. Быстроту выполнения работы характеризует величина...
а) ...время. в) ...сила.
б) ...скорость движения. г) ...мощность.
2. Мощность можно вычислить по формуле...
а) $N = \frac{A}{t}$. в) $A = Fs$.
б) $P = \frac{F}{S}$. г) $P = gm$.



а	
б	
в	
г	



Я	
Б	
В	
Г	



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

3. Мощность измеряют в...

- а) ...ньютонах (Н). в) ...ваттах (Вт).
б) ...паскалях (Па). г) ...джоулях (Дж).



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

4. Чему равна мощность, если за 1 с совершается работа, равная 1 Дж?
120 Дж?

- а) 1 Вт; 120 кВт. в) 1 Вт; 120 Вт.
б) 10 Вт; 120 Вт. г) 1 Вт; 12 Вт.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

5. Выразите мощность, равную 500000 Вт и 2 МВт, в киловаттах.

- а) 50 кВт и 200 кВт. в) 500 кВт и 200 кВт.
б) 50 кВт и 2000 кВт. г) 500 кВт и 2000 кВт.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

6. Переведите мощность, равную 350 Дж/с и 0,75 МВт, в ватты.

- а) 350 Вт и 750 Вт. в) 350 Вт и 7500 Вт.
б) 350 Вт и 750000 Вт. г) 35 Вт и 750 Вт.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

7. Какова мощность человека, тянущего нагруженные санки и совершающего при этом работу 42 кДж за 10 мин?

- а) 4,2 кВт. в) 70 Вт.
б) 420 кВт. г) 700 Вт.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

8. Определите мощность автомобиля, проезжающего под действием силы тяги, равной 2,4 кН, путь 30 км за 20 мин.

- а) 40 кВт. в) 72 кВт.
б) 36 кВт. г) 60 кВт.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

9. Чему равна работа, произведенная миксером мощностью 150 Вт за 4 мин?

- а) 36 кДж. в) 600 кДж.
б) 600 Дж. г) 3,6 кДж.




а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

10. Вычислите работу, производимую двигателем мощностью 100 Вт при включении его на 0,5 ч.

- а) 180 кДж. в) 500 Дж.
б) 50 Дж. г) 18 кДж.



4. На каких рисунках изображены рычаги?



№ 1



№ 2



№ 3



№ 4

а) № 1 и № 4.

в) № 1 и № 2.

б) № 3 и № 4.

г) № 2 и № 4.



5. Плечо силы – это...

а) ...длина рычага.


б) ...расстояние от оси рычага до его конца.

в) ...кратчайшее расстояние от точки опоры рычага до линии, вдоль которой действует на него сила.

г) ...кратчайшее расстояние между линиями, вдоль которых направлены силы, действующие на рычаг.



6. На рисунке представлена схема рычага, на который действуют силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$. Каково плечо силы $\vec{F}_1$? $\vec{F}_2$?



а) OA ; OD .

в) BD ; CA .

б) AB ; CD .

г) OB ; OC .




7. Каковы плечи сил $\vec{P}$ и $\vec{F}$, действующих на этот рычаг?

а) OC , OE .

в) CD , EK .

б) OD , DK .

г) OD , OK .



8. В каком случае рычаг находится в равновесии?

а) Если его плечи равны.

б) Если на него действуют равные силы.

в) Если действующие на него силы обратно пропорциональны своим плечам.

г) Если действующие на рычаг силы прямо пропорциональны плечам.

9. Какая формула выражает правило равновесия рычага?

а) $\frac{F_2}{F_1} = \frac{S_2}{S_1}$

б) $\frac{F_2}{F_1} = \frac{l_1}{l_2}$

в) $\frac{h_2}{h_1} = \frac{\rho_1}{\rho_2}$

10. Груз весом $P = 100$ Н надо уравновесить с помощью рычага силой $F = 20$ Н. Какой выигрыш в силе необходимо получить? К короткому или длинному плечу следует приложить силу F ?


а) В 5 раз; к длинному.

в) В 10 раз; к длинному.

б) В 5 раз; к короткому.

г) В 10 раз; к короткому.

11. Как с помощью этого рычага-линейки с крючками для подвешивания груза (внизу) и удерживания его рукой (вверху) получить максимальный выигрыш в силе? Чему он будет равен?




а) Подвесить груз к крючку № 1 и держать рычаг за крючок № 6; 2.

б) Груз – к крючку № 3, держать за крючок № 6; 5.

в) Груз – к крючку № 1, держать крючок № 4; 2.

г) Груз – к крючку № 2, держать крючок № 6; 2,5.

12. Будет ли какой либо из рычагов, схемы которых изображены на рисунке, находиться в равновесии?



а) Будет № 2.

в) Будет № 3.

б) Будет № 1.

г) Среди ответов нет верного.

13. С помощью стержня длиной 1,5 м приподнимали шкаф весом 450 Н, который опирался на него так, что плечо этой силы было равно 0,5 м. Какой силой пришлось действовать на другой конец стержня?

а) 1350 Н.

в) 225 Н.

б) 150 Н.

г) 300 Н.

14. На одно плечо рычага, равное 25 см, действует сила 80 Н, на другое – сила 400 Н. На каком расстоянии от оси рычага должна находиться точка приложения второй силы, чтобы он находился в равновесии?

а) 125 см.


б) 100 см.

в) 10 см.

г) 5 см.



15. На рисунке изображен рычаг, на концы которого действуют две силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$. На каком расстоянии от силы $\vec{F}_2$ должна находиться точка опоры этого рычага, чтобы он был в равновесии? Чему будут равны плечи этих сил?



- а) 1 м; 1 м и 2 м.
 б) 1 м; 2 м и 3 м.
 в) 2 м; 1 м и 2 м.
 г) 1 м; 1 м и 3 м.

Момент силы. Применение рычагов



1. Моментом силы называют...

- а) ...произведение модуля силы, действующей на тело, на пройденное ее точкой приложения расстояние.
 б) ...произведение модуля силы, поворачивающей тело, на ее плечо.
 в) ...произведение модуля силы, вращающей тело, на время ее действия.
 г) ...произведение веса тела, под действием которого поворачивается рычаг, на его плечо.




2. Момент силы равен...

- а) Fs .
 б) Pl .
 в) Fl .
 г) FL .



3. Каковы моменты сил, действующих на рычаг № 1? На рычаг № 2?




- а) № 1: $M_1 = F_1 \cdot OC$, $M_2 = F_2 \cdot OD$;
 № 2: $M_3 = F_3 \cdot OK$, $M_4 = F_4 \cdot OL$.
 б) № 1: $M_1 = F_1 \cdot OD$, $M_2 = F_2 \cdot OC$;
 № 2: $M_3 = F_3 \cdot OL$, $M_4 = F_4 \cdot OK$.



- в) № 1: $M_1 = F_1 \cdot OC$, $M_2 = F_2 \cdot OD$; № 2: $M_3 = F_3 \cdot OL$, $M_4 = F_4 \cdot OK$.
 г) № 1: $M_1 = F_1 \cdot OD$, $M_2 = F_2 \cdot OC$; № 2: $M_3 = F_3 \cdot OK$, $M_4 = F_4 \cdot OL$.

4. От каких величин зависит момент силы?
- а) Только от модуля силы: чем он больше, тем больше момент силы.
 б) От модуля силы и ее плеча, чем они больше, тем больше момент силы.
 в) Только от плеча силы: чем он длиннее, тем больше момент силы.
5. В каких единицах измеряют момент силы?
- а) В ньютонах-метрах (Н·м). в) В ваттах (Вт).
 б) В джоулях (Дж). г) В джоулях в секунду (Дж/с).
6. Какие формулы моментов сил соответствуют условию равновесия вращающегося тела?
- а) $M = Fl$. в) $F_1 l_1 = F_2 l_2$.
 б) $M_1 = M_2$. г) $M = Pl$.
7. Вычислите моменты сил $F_1 = 35$ Н и $F_2 = 70$ Н, если плечо первой силы $l_1 = 1$ м. Рычаг под действием этих сил находится в равновесии.
- а) Задачу решить нельзя: не указано плечо силы F_2 .
 б) $M_1 = 35$ Н·м, $M_2 = 0$ Н·м.
 в) $M_1 = 35$ Н·м, $M_2 = 35$ Н·м
 г) $M_1 = 35$ Н·м, $M_2 = 70$ Н·м.
8. Силы, модули которых $F_1 = 8$ Н и $F_2 = 40$ Н, уравновешены на рычаге. При этом их моменты равны 20 Н·м. Каковы плечи этих сил?
- а) $l_1 = 12$ м, $l_2 = 20$ м.
 б) $l_1 = 2,5$ м, $l_2 = 5$ м.
 в) $l_1 = 0,4$ м, $l_2 = 0,5$ м.
 г) $l_1 = 2,5$ м, $l_2 = 0,5$ м.

9. На рисунке изображены блоки разного типа. Какие из них неподвижные?



- а) № 1 и № 2.
 б) № 1 и № 3.
 в) № 1, № 2 и № 3.
 г) № 3 и № 4.

☒

а	☐
б	☐
в	☐

☒

а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

☒

а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

☒


а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

☒

а	☐
б	☐
в	☐
г	☐


☒

а	☐
б	☐
в	☐
г	☐



10. Какие из изображенных здесь блоков подвижные?

- а) № 1 и № 2.
- б) № 3 и № 4.
- в) № 1 и № 4.
- г) № 2 и № 3.



11. Какой выигрыш в силе дает подвижный блок? неподвижный блок?

- а) Подвижный в 4 раза, неподвижный в 2 раза.
- б) Подвижный и неподвижный в 2 раза.
- в) Подвижный в 2 раза, неподвижный не дает выигрыша в силе.
- г) Подвижный не дает выигрыша в силе, неподвижный в 2 раза.




12. Ящик весом 300 Н поднимают с помощью подвижного и неподвижного блоков. Какую силу прикладывают к свободному концу веревки?

- а) 300 Н.
- б) 150 Н.
- в) 75 Н.
- г) 100 Н.



13. На каких из этих рисунков изображены устройства, действие которых основано на применении рычагов?



- а) № 1 и № 2.
- б) № 1 и № 3.
- в) № 2 и № 4.
- г) № 1 и № 4.

«Золотое правило» механики



1. Применение простого механизма позволяет выиграть в силе, но при этом происходит проигрыш в...

- а) ...пути, который проходит точка приложения малой силы.
- б) ...времени, которое необходимо для поворота механизма малой силой.
- в) ...скорости поворота механизма малой силой.

2. Соотношение между действующими на простой механизм силами и путями, которые проходят точки их приложения, таково: ...

а) $\frac{h_2}{h_1} = \frac{\rho_1}{\rho_2}$ в) $\frac{F_2}{F_1} = \frac{s_1}{s_2}$
 б) $\frac{F_2}{F_1} = \frac{l_1}{l_2}$ г) $\frac{F_2}{F_1} = \frac{S_2}{S_1}$

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

3. При использовании простого механизма работы, произведенные действующими на него силами, равны, так как пути, проходимые точками приложения этих сил...

- а) ...прямо пропорциональны силам.
 б) ...обратно пропорциональны силам.
 в) ...равны силам.

а	☒
б	☐
в	☐

4. «Золотое правило» механики свидетельствует о том, что...

- а) ...пользуясь простым механизмом, нельзя выиграть в работе.
 б) ...выигрывая в силе, можно произвести большую работу.
 в) ...прилагая меньшую силу, можно быстрее выполнить работу.

а	☒
б	☐
в	☐

5. На рычаг действуют уравновешивающие его силы $F_1 = 10$ Н и $F_2 = 25$ Н. При повороте рычага точка приложения силы $\vec{F}_1$ прошла путь 30 см. Какой путь прошла точка приложения силы $\vec{F}_2$?

- а) 2,5 см. б) 3 см. в) 12 см. г) 1,2 см.

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

6. Подвижным блоком поднят бак с краской весом 600 Н на высоту 8 м. С какой силой рабочему пришлось вытягивать свободный конец каната и какую работу он при этом совершил?

- а) $F = 300$ Н; $A = 2,4$ кДж. в) $F = 150$ Н; $A = 4,8$ кДж.
 б) $F = 300$ Н; $A = 4,8$ кДж. г) $F = 150$ Н; $A = 2,4$ кДж.

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

7. При подъеме груза по настилу длиной 5 м на высоту 2 м совершена работа, равная 500 Дж. Какого веса груз был поднят? Какая потребовалась для этого сила?

- а) $P = 250$ Н; $F = 100$ Н. в) $P = 250$ Н; $F = 200$ Н.
 б) $P = 100$ Н; $F = 250$ Н. г) $P = 100$ Н; $F = 200$ Н.

а	☒
б	☐
в	☐
г	☐

Коэффициент полезного действия механизма



1. Почему полезная работа, которую должен выполнить механизм, всегда меньше полной – той, которую он совершает на практике?
- Потому что действует «золотое правило» механики.
 - Потому что придают к механизму силу, большую, чем надо.
 - Потому что при расчете полезной работы механизма не учитывается трение, а также его собственный вес.



2. Коэффициентом полезного действия механизма называют...
- ...отношение сил, уравнивающих простой механизм.
 - ...отношение полезной работы к полной.
 - ...разность полной работы и полезной.
 - ...отношение путей, пройденных точками приложения сил, действующих на механизм.



3. Поднимая с помощью подвижного и неподвижного блоков ящик массой 18 кг на высоту 5 м, вытянули часть каната длиной 10 м. При этом действовали силой $F = 100$ Н. Каков КПД этой системы блоков?
- 90%.
 - 91%.
 - 95%.
 - 96%.



4. По наклонной плоскости (ее $h = 3$ м и $l = 12$ м) подняли груз массой 40 кг, действуя на него силой $F = 120$ Н. Найдите КПД наклонной плоскости.
- 89%.
 - 85%.
 - 83%.
 - 80%.



5. Валун массой 120 кг приподняли рычагом, плечи которого относятся, как 1:2, на 10 см. Модуль приложенной силы $F = 650$ Н. Каков КПД рычага в этом случае?
- 91,5%.
 - 90%.
 - 92,3%.
 - 95%.



6. Определяя КПД одного и того же механизма, ученики получили разные его значения: 85% (№ 1), 95% (№ 2), 102% (№ 3), 98% (№ 4). О каком из этих значений можно сразу же сказать, что оно ошибочно?
- № 1.
 - № 2.
 - № 3.
 - № 4.

Энергия

1. Энергия – это физическая величина, показывающая...



а	
б	
в	
г	

- а) ...как велика совершенная работа.
- б) ...как мала совершенная работа.
- в) ...каким образом совершается работа.
- г) ...какую работу может совершить тело.

2. Энергия измеряется в...



а	
б	
в	
г	

- а) ваттах.
- б) джоулях.
- в) ньютонах.
- г) киловаттах.

3. Энергия тела тем больше, чем...



а	
б	
в	

- а) ...большее давление оно производит.
- б) ...больше его размеры.
- в) ...большую работу оно может произвести.

4. Чему равно изменение энергии тела?



а	
б	
в	
г	

- а) Совершенной им работе.
- б) Изменению действующей на него силы.
- в) Развиваемой им мощности.
- г) Среди ответов нет верного.

5. Какие тела обладают потенциальной энергией?



а	
б	
в	
г	

- а) Все тела, которые могут совершать работу.
- б) Тела, которые движутся.
- в) Поднятые над какой-либо поверхностью тела.
- г) Упругие деформированные тела.

6. Какие из названных здесь тел обладают потенциальной энергией: комнатная люстра (№ 1), трамвай (№ 2), сосулька на крыше (№ 3)?



а	
б	
в	

- а) № 1 и № 2.
- б) № 1 и № 3.
- в) № 3 и № 2.



а	
б	
в	
г	

7. По какой формуле можно рассчитать потенциальную энергию поднятого над землей тела?

а) $M = Fl$.

в) $E_n = gmh$.

б) $A = Nt$.

г) $p = g\rho h$.




а	
б	
в	

8. Какой из одинаковых шаров имеет наименьшую потенциальную энергию относительно поверхности пола?

а) № 1.

в) № 3.

б) № 2.




а	
б	
в	

9. Шары разной массы подвешены на одной высоте. Какой из них обладает наибольшей потенциальной энергией?

а) № 1.

в) № 3.

б) № 2.



а	
б	
в	
г	

10. Какова потенциальная энергия мяча, брошенного на крышу сарая? Масса мяча 350 г, высота сарая 3 м.

а) 105 кДж.

в) 10,5 Дж.

б) 105 Дж.

г) 10,5 кДж.



а	
б	
в	

11. Какие тела обладают кинетической энергией?

а) Все движущиеся тела.

б) Те, которые движутся быстро.

в) Медленно движущиеся тела.



а	
б	
в	
г	

12. От каких величин зависит кинетическая энергия тел?

а) От времени движения.

в) От пройденного им пути.

б) От объема тела.

г) От массы и скорости тела.



а	
б	
в	
г	

13. По какой формуле вычисляют кинетическую энергию тел?

а) $E_n = gmh$.

в) $A = Nt$.

б) $E_k = \frac{mv^2}{2}$.

г) $E_k = 2mv^2$.

- 14.** Какое из названных тел обладают кинетической энергией: уличный фонарь (№ 1), ракета на старте (№ 2), дрейфующая льдина (№ 3), автомобили на стоянке такси (№ 4).

а) № 1.

В) № 3.

6) № 2.

г) № 4.

	☒
а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

15. Определите кинетическую энергию шара массой 0,5 кг, катящегося по траве со скоростью 10 м/с.

а) 5 Дж.

в) 25 Дж.

б) 50 Дж.

г) 1000 Дж.

	☒
а	
б	
в	
г	

16. Какую максимальную работу может совершить тело, обладающее энергией, равной 20 Дж? 400 кДж?

а) 20 Дж; 400 кДж.

в) 10 Дж; 400 кДж.

б) 20 Дж; 200 кДж.

г) 10 Дж; 200 кДж.

☒	☐
2	
6	
B	
F	

17. Какими изменениями энергии сопровождаются различные физические явления?

а) Превращениями одного вида энергии в другой.

б) Передачей энергии от одного тела к другому.

в) Изменений энергии не происходит.

г) Среди ответов нет верного.

☒	☐
а	
б	
в	
г	

6. Итоговый тест

(темы «Работа», «Мощность», «Энергия»)

Вариант 1

1. В каком из названных здесь случаев совершается работа?

а) Лифт поднимает человека на верхний этаж.

б) Ребенок смотрит телепередачу.

в) Тяжелоатлет удерживает над головой штангу с предельно большими для него грузами.

г) Птица сидит на ветке дерева.

☒	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

6. Итоговый тест



а	
б	
в	
г	

2. Механическую работу вычисляют по формуле...

а) $P = g m$.

в) $A = F s$.

б) $F = p S$.

г) $F = k \Delta l$.



а	
б	
в	
г	

3. Выразите в джоулях работу, равную $200 \text{ Н} \cdot \text{м}$ и $0,75 \text{ кДж}$.

а) 2000 Дж и 75 Дж .

в) 2000 Дж и 750 Дж .

б) 200 Дж и 75 Дж .

г) 200 Дж и 750 Дж .



а	
б	
в	
г	

4. Землю переносят на грабке, находящуюся в 5 м от того места, где ею наполняют ведро. Какую работу совершают при этом? Вес ведра с землей 120 Н .

а) 24 Дж .

в) 60 Дж .

б) 600 Дж .

г) 240 Дж .



а	
б	
в	
г	

5. Известно, что при передвижении контейнера массой 450 кг произведена работа, равная 90 кДж . На какое расстояние передвинут контейнер?

а) 2 м .

в) 200 м .

б) 20 м .

г) $0,5 \text{ м}$.



а	
б	
в	
г	

6. Мощность можно рассчитать по формуле...

а) $N = \frac{A}{t}$.

в) $m = \frac{P}{g}$.

б) $\rho = \frac{m}{V}$.

г) $p = \frac{F}{S}$.



а	
б	
в	
г	

7. Чему равна мощность двигателя, производящего работу, равную 175 кДж , за 35 с ?

а) 500 Вт .

в) 5 кВт .

б) 50 Вт .

г) 50 кВт .



а	
б	
в	
г	

8. Электродвигатель мощностью 1 кВт работал $0,5 \text{ ч}$. Какую работу он совершил за это время?


а) 180 Дж .

в) 180 кДж .

б) 1800 Дж .

г) 1800 кДж .


9. Каковы плечи сил $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ уравновешивающих рычаг?



- а) OA и OB .
б) AC и DB .
в) OC и OD .
г) CD и AB .

☒	
а	
б	
в	
г	

10. Какой из рычагов, схемы которых изображены на рисунке, будет находиться в равновесии?



- а) № 1
б) № 2
в) № 3.
г) № 1 и № 3.

☒	
а	
б	
в	
г	

11. На одно плечо рычага длиной 30 см действует сила 20 Н, на другое — сила 100 Н. Какой длины должно быть второе плечо, чтобы рычаг находился в равновесии?

- а) 5 см.
б) 6 см.
в) 60 см.
г) 50 см.


☒	
а	
б	
в	
г	

12. К рычагу приложены силы, модули которых $F_1 = 25$ Н и $F_2 = 75$ Н. Под их действием он находится в равновесии. Плечо силы $\vec{F}_1$ равно 12 см. Определите моменты M_1 и M_2 этих сил.

- а) $M_1 = 300$ Н · м, $M_2 = 300$ Н · м.
б) $M_1 = 300$ Н · м, $M_2 = 600$ Н · м.
в) $M_1 = 300$ Н · м, $M_2 = 0$.
г) Ответа дать нельзя: неизвестно плечо силы $\vec{F}_2$.

☒	
а	
б	
в	
г	


13. Какой выигрыш в силе дает эта система блоков? Сколько в ней неподвижных блоков?



- а) В 4 раза; 2.
б) В 2 раза; 3.
в) В 4 раза; 3.
г) В 2 раза; 2.

☒	
а	
б	
в	
г	


13. Какой выигрыш в силе дает эта система блоков? Какие в ней блоки – подвижные?



☒
а
б
в
г

- а) В 2 раза; № 1 и № 3.
б) В 8 раз; № 1 и № 2.
в) В 4 раза; № 3 и № 4.
г) В 4 раза; № 1 и № 3.

14. С помощью блоков поднимают мешок с цементом весом 600 Н на высоту 4 м. Какую работу совершает при этом человек?



☒
а
б
в
г

- а) 1200 Дж.
б) 2400 Дж.
в) 600 Дж.
г) 4800 Дж.

15. Каков КПД подвижного блока, с помощью которого груз массой 90 кг поднят на высоту 4 м? Известно, что работа, совершенная при этом, равна 4000 Дж.

☒
а
б
в
г

- а) 90%.
б) 92%.
в) 95%.
г) 96%.

16. При вычислении КПД механизма ученики получили разные ответы. О каком из них можно сразу сказать, что он неправильный?

☒
а
б
в
г

- а) 95,5%.
б) 97,5%.
в) 99,5%.
г) 101,5%.

17. Какое из названных здесь тел не обладает кинетической энергией?

☒
а
б
в
г

- а) Тигр, преследующий антилопу.
б) Сжатая пружина.
в) Стартовавшая с космодрома ракета.
г) Мотоциклист, обгоняющий грузовик.

18. Потенциальная энергия тела зависит от...

☒
а
б
в

- а) ...его объема.
б) ... массы.
в) ... высоты подъема.



19. Определите потенциальную энергию воздушного шара массой 0,5 кг, поднявшегося на высоту 80 м.

а) 40 Дж.

в) 200 Дж.

б) 20 Дж.

г) 400 Дж.



20. Шар массой 100 г катится по полу со скоростью 0,2 м/с. Какова его кинетическая энергия?


в) 0,002 Дж.

в) 0,2 Дж.

6) 0.02 Дж.

г) 2 Дж.

Вариант III



1. Кто из названных здесь людей совершил работу?

а) Лыжник на трассе соревнований.

б) Конькобежец, катящийся после финиша по инерции.

в) Пассажир поезда в метро.

г) Домохозяйка, раскладывающая купленные продукты по предназначенным для них местам.

2. Чтобы рассчитать механическую работу, надо воспользоваться формулой...

$$a) M = FL$$
B) $F = pS$.

6) $A = F_S$.

г) $F = k\Delta\ell$.



3. Выразите в килоджоулях работу, равную 800 Дж и 1000 Н · м.

а) 0,8 кДж и 100 кДж.

б) 0,8 кДж и 10 кДж.

в) 8 КДЖ и 1 КДЖ.

г) 0,8 кЛж и 1 кЛж.



4. Ковш экскаватора вынимает грунт массой 750 кг из ямы глубиной 0,5 м на поверхность земли. Какую он производит работу при этом?

а) 0,375 кДж.

в) 37,5 кДж.

б) 3,75 кДж.

г) 375 кДж.

5. Рассчитайте, на какую высоту поднял кран панель весом 5 кН, если совершенная им работа равна 40 кДж.

a) 8 м.

В) 12,5 м.

6) 80 м.

г) 1,25 м.

б. Мощность рассчитывают по формуле...

$$\mathbf{a)} \quad \rho = \frac{m}{V}.$$
$$\text{B)} \quad P = \frac{F}{S}.$$
$$6) \quad N = \frac{A}{f}.$$
$$\Gamma) \quad F = \frac{A}{s},$$

7. Определите мощность кофемолки, если за 30 с она совершает работу 5,4 кДж.

а) 1,8 кВТ.

B) 18 B_T.

6) 1,8 ВТ.

г) 180 Вт.

8. Какую работу может произвести за 15 мин электропила, двигатель которой имеет мощность 1 кВт?


а) 15 кДж.

в) 90 кДж.

б) 9 кДж.

г) 900 кДж.


9. Каковы моменты M_1 и M_2 сил $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$?


$$a) M_1 = F_1 \cdot OC, M_2 = F_2 \cdot OD.$$

6) $M_1 = F_1 \cdot AC, M_2 = F_2 \cdot DB.$

В) $M_1 = F_1 \cdot OA, M_2 = F_2 \cdot OB.$

10. Какой из рычагов, схемы которых изображены на рисунке, должен повернуться под действием сил $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$?



a) № 1.

6) № 2.

н) № 3.

5. Итоговый тест



11. На рычаг действуют силы $F_1 = 30$ Н и $F_2 = 10$ Н. Каково расстояние между точками приложения этих сил, если плечо l_1 силы $\vec{F}_1$ равно 20 см?
- а) 60 см. в) 35 см.
б) 80 см. г) 70 см.



12. Плечо силы $F_1 = 12\text{ Н}$, действующей на рычаг, равно 0,2 м. Найдите момент силы $\vec{F}_2$, уравновешивающей рычаг в этом случае.
- а) 60 Н · м.
б) 30 Н · м.
в) 24 Н · м.
г) 2,4 Н · м.



13. Система блоков дает выигрыш в силе в 6 раз. Сколько должно быть в ней подвижных блоков?
- а) 2. б) 3. в) 6.



14. На какую высоту был поднят груз весом 160 Н по настилу длиной 8 м, если при этом совершена работа 800 Дж? Какую силу пришлось приложить к грузу?
- а) 5 м; 20 Н. в) 10 м; 100 Н.
б) 5 м; 32 Н. г) 5 м; 100 Н.



15. При подъеме рычагом мешка с песком массой 65 кг на 3 см произведена работа 20 Дж. Каков КПД рычага?
- а) 9,75%. в) 97,5%.
- б) 90,25%. г) 98,5%.



16. Вычисляя КПД механизма, ученики получили разные ответы. Какой из них точно не может быть правильным?
- а) 97%. в) 99%.
- б) 98%. г) 101%.



17. Какие тела обладают одновременно потенциальной и кинетической энергией?
- Вода в горной реке.
 - Приставший к пристани теплоход.
 - Самолет, совершающий очередной рейс.
 - Ракета на старте.



5. Грузовик с прицепом на пути, равном 2 км, произвел работу 10^3 кДж. С какой силой он тянул прицеп?

a) 500 H.

в) 2 кГц.


6) 5 кН.

г) 1 кН.



6. Формула, по которой рассчитывают мощность, – это ...

a) $F = \frac{A}{s}$

$$\text{B) } N = \frac{A}{t}.$$
$$6) \quad p = \frac{F}{S}$$
$$\Gamma) \quad V = \frac{m}{\sigma}.$$


7. Какова мощность автопогрузчика, совершающего работу, равную 9,6 кДж, за 4 с?

a) 2400 ВТ.

в) 4800 ВТ.

6) 240 ВТ.

г) 480 Вт.



8. Рассчитайте производимую теплоходом за 1 мин работу при мощности его двигателей 5000 кВт.

а) 30000 кДж.

в) $3 \cdot 10^5$ кДж.


б) 3000 кДж.

г) $3 \cdot 10^4$ кДж.



9. Каковы моменты сил $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$?

a) $M_1 = F_1 \cdot AC, M_2 = F_2 \cdot BD$


6) $M_1 = F_1 \cdot OA$, $M_2 = F_2 \cdot OB$
$$\text{В) } M_1 = F_1 \cdot OC, M_2 = F_2 \cdot OD$$


10. На рисунке изображены схемы рычагов, на которые действуют силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$. Какой из этих рычагов будет находиться в равновесии?

a) № 1.

6) № 2.

B) № 3.



5. Итоговый тест



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

18. Кинетическая энергия тела зависит от...

- а) ... времени его движения. в) ... высоты подъема над землей.
б) ... его массы. г) ... его скорости.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

19. Вычислите потенциальную энергию груза массой 68 кг, поднятого кра-
ном на высоту 10 м.

- а) 6,8 Дж. в) 680 Дж.
б) 68 Дж. г) 6800 Дж.



а	☐
б	☐
в	☐
г	☐

20. Определите кинетическую энергию 1 м^3 воздушного потока при скоро-
сти ветра 10 м/с. Плотность воздуха $1,3 \text{ кг/м}^3$.

- а) 650 Дж. в) 13 Дж.
б) 65 Дж. г) 130 Дж.

ОТВЕТЫ

Введение

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8
ответ	б	г	а	б	а	в	в	б

№ задания	9	10	11	12	13	14	15
ответ	б	а	б	в	а	г	г

I. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА

Молекулы. Движение молекул

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	г	в	а	б	б	в	г	а, г	а	в

Взаимодействие молекул. Три состояния вещества

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ответ	г	б	б, в	г	в	б	а	в	б	б	г

1. Итоговый тест

(темы «Введение» и «Первоначальные сведения о строении вещества»)

Вариант I

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	в	в, г	а, в	в	б	в	а	а	а	г

№ задания	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ответ	г	б	в	б	в, г	а, г	а	в	в	а

Вариант II

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	б	б, г	б, в	а	г	б	а	в	в	г

№ задания	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ответ	в	б	а	б, г	а, в	б, в	г	б	г	а

Вариант III

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	в	а, г	а, б	в	б	г	в	в	г	а

№ задания	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ответ	а	в	а	в, г	а	б, в	г	г	в	а

Вариант IV

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	б, в	а, б	б	г	в	а	б	а	г	в

№ задания	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ответ	в	б	в	б, в	а, б	а, г	б	в	г	в

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (ЧАСТЬ 1)

Механическое движение

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	б	а, в	а	г	а	в	в	в	б	г

Скорость. Единицы скорости

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ответ	н	в	б	в	а	г	г	б	а	б	в	а	г	г

Инерция. Взаимодействие тел

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8
ответ	в	г	б	а, в	а	г	г	б

Масса тела

№ задания	1	2	3	4	5	6
ответ	б	в	в	б	г	в

Плотность вещества

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	г	в	а	б	г	б	а	г	в	в

Расчет массы и объема тела по плотности его вещества

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ответ	б	г	в	а	в	г	а	в	б

2. Итоговый тест

(темы «Механическое движение», «Масса тела», «Плотность вещества»)

Вариант I

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	в	а, б	б	в	г	а	б	в	б	б

№ задания	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ответ	б	а	а	г	г	б	а	г	а	в

Вариант II

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	б	а	в	б	б	а	г	в	б	а

№ задания	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ответ	а	в	б	в	г	в	а	б	а	г

Вариант III

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	а	в	г	г	б	в	г	г	в	а

№ задания	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ответ	б	в	а	а	в	б	г	г	в	а

Вариант IV

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	в	г	а	в	г	б	а	в	в	б

№ задания	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ответ	а	в	б	б	в	в	г	а	в	а

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (ЧАСТЬ 2)

Сила. Явление тяготения. Сила тяжести

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ответ	г	г	г	в	а	в	а	б	б

Сила упругости. Закон Гука

№ задания	1	2	3	4	5	6	7
ответы	в	б	б	б	а	г	г

Вес тела

№ задания	1	2	3	4
ответ	г	б	б	в

Единицы силы. Динамометр

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ответ	б	в	а	в	б	б	г	б	в	а	а	в

Сложение сил

№ задания	1	2	3	4	5	6
ответ	г	б	в	а	г	в

Сила трения

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	в	г	г	в	б	а	а	г	в	а, в

3. Итоговый тест (тема «Силы»)

Вариант I

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	в	г	а	в	б	б	г	в	в	а

№ задания	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ответ	в	б	в	а	б	г	в	в	б	г

Вариант II

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	г	в	б	б	а	б	а	г	в	б

№ задания	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ответ	в	г	б	г	г	в	а	г	г	а

Вариант III

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	а	в	г	б	а	а	б	г	в	в

№ задания	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ответ	б	г	в	а	в	б	г	в	в	а

Вариант IV

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	г	а	г	а	б	а	в	г	б	а

№ задания	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ответ	а	в	б	б	в	г	а	в	б	в

**III. ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ
(ЧАСТЬ 1)**

Давление. Единицы давления

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	б	б	а	г	в	в	г	г	а	б, г

Давление газа

№ задания	1	2	3	4	5
ответ	в	а	б	б	г

Передача давления жидкостями и газами

№ задания	1	2	3	4
ответ	в	г	а	б

Давление в жидкости и газе

№ задания	1	2	3	4	5
ответ	г	а	в	б	в, г

Расчет давления жидкости

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	б	г	а	б	в	б	г	в	в	в

Сообщающиеся сосуды

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8
ответ	г	г	в	в	г	б	в	а

4. Итоговый тест

(темы «Давление», «Давление в жидкостях и газах», «Сообщающиеся сосуды»)

Вариант I

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8
ответ	б	г	в	а	а	в	в	в

№ задания	9	10	11	12	13	14	15
ответ	г	а	б	а	г	а	б

Вариант II

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8
ответ	в	в	г	б	а	б	в	б

№ задания	9	10	11	12	13	14	15
ответ	г	в	а	г	в	а	б

Вариант III

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8
ответ	а, б	б	в	в	а	г	б	а

№ задания	9	10	11	12	13	14	15
ответ	в	б	г	а	г	а	б

Вариант IV

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8
ответ	в	а	г	б	б	в	б	б

№ задания	9	10	11	12	13	14	15
ответ	в	г	в	а	г	а	б

III. ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (ЧАСТЬ 2)

Атмосферное давление

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	в	б	в	в	г	г	б	в	а	в

Измерение атмосферного давления

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	б	г	в	а	б	б	в	г	б	а

Манометры. Поршневые насосы. Гидравлические машины

№ задания	1	2	3	4	5	6	7
ответ	г	б	а	б	в	б	б

№ задания	8	9	10	11	12	13	14
ответ	а	в	а, г	б	г	в	а

Давление жидкостей и газов на погруженные в них тела

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8
ответ	в	г	а, в	г	б	б	а	в

Архимедова сила

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ответ	в	б	г	г	б	а	а	в	в

Плавание тел

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ответ	б	г	а	в	а	г	в	в	г	в	в	б

Плавание судов. Воздухоплавание

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ответ	в	б	в	г	б	г	а	а	б	в	а	б	а

5. Итоговый тест

(темы «Атмосферное давление»,
«Архимедова сила», «Плавание тел»)

Вариант I

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	б	г	а	г	в	б	в	а	б	в, г

№ задания	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ответ	г	а	в	а	б	а	г	в	б	в

Вариант II

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	в	а, г	б	в	а	г	в	а	б	г

№ задания	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ответ	в	б	б	в	а	б	г	в	в	б

Вариант III

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	в	г	б	а	б	в	а	г	б	б

№ задания	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ответ	в	г	в	в	б	в	а	г	б	в

Вариант IV

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	а	г	б	б	в	г	в	б	а	а, в

№ задания	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ответ	б	в	б	а	а	г	г	б	а	в

IV. РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ

Механическая работа. Единицы работы

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ответ	г	а, г	б	в	а	в	г	в	г	в	а

Мощность. Единицы мощности

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ответ	г	а	в	в	г	б	в	г	а	а	в	б

Простые механизмы. Рычаг

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8
ответ	в	б	г	а	в	г	г	в

№ задания	9	10	11	12	13	14	15
ответ	б	а	б	г	в	г	а

Момент силы. Применение рычагов

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ответ	б	г	а	б	а	б, в	в	г	в	а	в	б	г

«Золотое правило» механики

№ задания	1	2	3	4	5	6	7
ответ	а	в	б	а	в	б	а

Коэффициент полезного действия механизма

№ задания	1	2	3	4	5	6
ответ	в	б	а	в	в	в

Энергия

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ответ	г	б	в	а	в, г	б	в	б	в

№ задания	10	11	12	13	14	15	16	17
ответ	в	а	г	б	в	в	а	а, б

6. Итоговый тест (темы «Работа», «Мощность», «Энергия»)

Вариант I

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	а	в	г	б	б	а	в	г	в	в

№ задания	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ответ	б	а	б	г	в	г	а, г	в	б	в

Вариант II

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	в, г	б	в	а	б	б	в	г	б	б

№ задания	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ответ	а	в	г	б	а	г	б	б, в	г	а

Вариант III

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	а, г	б	г	б	а	б	г	г	а	в

№ задания	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ответ	а	г	б	г	в	г	а, в	б	в	г

Вариант IV

№ задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	а, в	в	б	г	а	в	а	в	б	в

№ задания	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ответ	г	а	б	в	а	в	а, в	б, г	г	б

Учебно-методическое издание
Чеботарева Алла Владимировна

Тесты по физике

К учебнику А.В. Перышкина
«Физика. 7 класс»

7 класс

Издательство **«ЭКЗАМЕН»**

Гигиенический сертификат
№ 77.99.60.953.Д.000454.01.09 от 27.01.2009 г.

Главный редактор *Д.В. Яновский*
Редактор *Г.А. Лонцова*
Технический редактор *Т.В. Фатюхина*
Корректор *Н.В. Егорова*
Дизайн обложки *И.Р. Захаркина*
Компьютерная верстка *М.В. Дерендяева, Е.Ю. Лысова*

105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 1.

www.examen.biz

Е-mail: по общим вопросам: info@examen.biz;
по вопросам реализации: sale@examen.biz
тел./факс 641-00-30 (многоканальный)

Общероссийский классификатор продукции
ОК 005-93, том 2; 953005 — книги, брошюры, литература учебная

Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

По вопросам реализации обращаться по тел.:
641-00-30 (многоканальный).

■ Пособие СОДЕРЖИТ:

- проверочные тесты к каждому параграфу учебника А.В. Перышкина «Физика. 7 класс»,
- контрольные итоговые тесты,
- ответы ко всем заданиям.

■ Настоящая книга ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ оперативно проверить:

- степень усвоения материала,
- правильность и глубину понимания семиклассниками основ физической науки.

■ Пособие ОКАЖЕТ неоценимую ПОМОЩЬ:

- учителю физики,
- родителям, интересующимся уровнем знаний своих детей,
- учащимся в самопроверке.

ISBN 978-5-377-03160-4



9 785377 031604